

C M S

9

إصلاح تمارين
الكتاب المدرسي
مع فروض

كمال سهيل
أستاذ

فتحي عبروق
أستاذ أول



رياضيات

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرنا أن نقدم إلى أبنائنا تلاميذ السنوات التاسعة من التعليم الأساسي و لزملائنا الأساتذة هذه المحاولة البسيطة ضمن سلسلة "SMC" في حلته الجديدة بعد التحسين وهي مختصر العنوان : « corrigés du manuel scolaire » لإصلاح تمارين الكتاب المدرسي ؛ - هذا الكتاب المدرسي الذي أشرف على إعداده ثلة من أهل الخبرة و الاختصاص نستفيد من تجاربهم و خبرتهم في انتقاء التمارين ذات الصلة حتى تكون المنفعة أعم . و لقد حاولنا قدر الإمكان أن يكون هذا الكتيب سندا للتلميذ يلتجئ إليه كلما دعت الحاجة ، لتعميق الصلة بالكتاب المدرسي و تشجيع التلميذ على البحث و العمل لتحقيق نتائج أفضل . - كما لا يفوتني في هذا المجال أن أذكر قراءنا الأفاضل إلى :

- * ضرورة قراءة المعطيات قراءة مركزة و تحديد المطلوب و ربطه بالقواعد العلمية المتاحة و المسموح بها ضمن البرنامج الرسمي .
- * تحليل المعطيات و تحويلها إلى رسوم تقريبية و بيانات كلما دعت الحاجة .
- * إن لم يهتد إلى الحل فلا ييأس و لا يؤثر ذلك على معنوياته و ليستنجد بهذا الكتيب و ليحاول مرة أخرى في الحال أو بعد استراحة .
- * عند تحرير الإجابة ينبغي صياغتها بوضوح و في لغة سليمة و بأسلوب يعتمد التمشي المنطقي البسيط .

- و في الختام تجدون باقة من الفروض العادية و التأليفية مع الإصلاح عساها تساعد التلميذ على التقييم الذاتي و تمهد له الطريق إلى الرياضيات و تضمن له أوفر حظوظ التألق و الامتياز بكل ثقة و اقتدار ؛ كما تساعد الأستاذ على تحضير الفروض العادية و التأليفية على مدار السنة الدراسية .

المؤلف

الدرس عدد 1 التعداد و الحساب

اصلاح التمرين عد1-د:

960	585	348	234	834	5922	680	762	672	
x		x	x	x	x		x	x	يقبل القسمة على 6
x		x						x	يقبل القسمة على 12
x	x								يقبل القسمة على 15

اصلاح التمرين عد2-د:

الأعداد التي تقبل القسمة على 12 و على 15 :
، 3720 ، 2340

اصلاح التمرين عد3-د:

كل عدد أصغر من 11 يقسم الجداء $5 \times 7 \times 8 \times 9$ لأن $5 \times 7 \times 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$ و هو يقبل القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10

اصلاح التمرين عد4-د:

ليكن العدد $N=74 a b$ ، حيث b رقم أحاده و a رقم عشراتاه.

1. ليكون العدد N قابلا للقسمة على 6 يجب أن يكون قابلا للقسمة على 2 و 3 يعني :

$a \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$ و $b \in \{8,6,4,2,0\}$ و $7+4+a+b=3n$ حيث n عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر

يعني : $11+a+b=3n$ أو $2+a+b=3n$

إذن $\{(7,0), (2,2), (5,2), (8,2), (0,4), (3,4), (6,4), (9,4), (1,6), (4,6), (7,6), (2,8), (5,8), (8,8)\}$

$(a,b) \in \{(1,0), (4,0)\}$.

2 (ليكون العدد N قابلا للقسمة على 15 يجب أن يكون قابلا للقسمة على 5 و 3 يعني : $b \in \{5,0\}$ و

$a \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$ و $7+4+a+b=3n$ حيث n عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر

يعني : $11+a+b=3n$ أو $2+a+b=3n$

$(a,b) \in \{(1,0), (4,0), (7,0), (2,5), (5,5), (8,5)\}$

اصلاح التمرين عد5-د:

ليكن العدد $A=5 a 8 b$ ، حيث a و b رقمان .

1) ليكون العدد A قابلا للقسمة على 12 يجب أن يكون قابلا للقسمة على 4 و 3 يعني :

$a \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$ و $b \in \{4,8,0\}$ و $5+8+a+b=3n$ حيث n عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر

يعني : $13+a+b=3n$ أو $1+a+b=3n$

$(a,b) \in \{(2,0), (5,0), (8,0), (1,4), (4,4), (7,4), (0,8), (3,8), (6,8), (9,8)\}$

ليكون العدد A قابلا للقسمة على 15. يجب أن يكون قابلا للقسمة على 5 و 3 يعني :

$a \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$ و $b \in \{5,0\}$ و $13+a+b=3n$ حيث n عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر

أو : $1 + a + b = 3n$ إذا : $(a,b) \in \{(2,0), (5,0), (8,0), (0,5), (3,5), (6,5), (9,5)\}$.

إصلاح التمرين عد 6-دند:

ليكن العدد $B=4x3y$ ، حيث x و y رقمان .

B يقبل القسمة على 3 يعني : $3n = 3 + 4 + y + x$ حيث n عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر

(1) يعني $3n = 7 + y + x$ أو : $3n = 1 + y + x$ و $x \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$ و $y \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

$(x,y) \in \{(2,0), (5,0), (8,0), (1,1), (4,1), (7,1), (0,2), (3,2), (6,2), (9,2), (2,3), (5,3), (8,3), (1,4), (4,4), (7,4), (0,5), (3,5), (6,5), (9,5), (2,6), (5,6), (8,6), \dots\}$

(2) B يقبل القسمة على 4 يعني $3y$ يقبل القسمة على 4 يعني $y \in \{6,2\}$ و $x \in \{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

B يقبل القسمة على 12 يجب أن يكون قابلاً للقسمة على 4 و 3 يعني : $y \in \{6,2\}$ و

$3n = 3 + 4 + y + x$ حيث n عدد صحيح طبيعي يعني $3n = 7 + y + x$ أو : $3n = 1 + y + x$ و $y \in \{6,2\}$

و بالتالي : $(x,y) \in \{(0,2), (3,2), (6,2), (9,2), (2,6), (5,6), (8,6)\}$

إصلاح التمرين عد 7-دند:

لدينا : $x - 2$ يقبل القسمة على 12 و $x + 13$ يقبل القسمة على 15 حيث x هو عمر الأب حالياً

$x + 13$ يقبل القسمة على 15 إذن : $15 - (x + 13)$ يقبل القسمة على 15 كذلك يعني : $x - 2$ يقبل القسمة على 15

و بالتالي : $x - 2$ يقبل القسمة على 12 و 15 إذن : $x - 2$ يقبل القسمة على 3 و 4 و 5 إذن : $x - 2 = 5 \times 4 \times 3$

يعني : $x - 2 = 60$: $x = 62$

إصلاح التمرين عد 8-دند:

(1) العدد $2 \times 25^{50} - 2^{103}$ قابل للقسمة على 15 لأنه يقبل القسمة على 3 و 5 كما يلي :

$$5^{103} - 2 \times 25^{50} = 5^{103} - 2 \times (5^2)^{50} = 5^{103} - 2 \times 5^{100} = 5^{100} (5^3 - 2) = 5^{100} (125 - 2) = 5^{100} \times 123$$

123 يقبل القسمة على 3 و 5^{100} يقبل القسمة على 5

(2) العدد $3^{5000} \times 243^{1001} - 13$ قابل للقسمة على 6 لأنه يقبل القسمة على 3 و 2 كما يلي :

$$243^{1001} - 13 \times 3^{5000} = (3^5)^{1001} - 13 \times 3^{5000} = 3^{5005} - 13 \times 3^{5000} = 3^{5000} (3^5 - 13) \\ = 3^{5000} (243 - 13) = 3^{5000} \times 230$$

و 230 يقبل القسمة على 2 و 3^{5000} يقبل القسمة على 3


(3) العدد $5 \times 2^{2000} + 8^{666}$ قابل للقسمة على 12 لأنه يقبل القسمة على 3 و 4 كما يلي :

$$8^{666} + 5 \times 2^{2000} = (2^3)^{666} + 5 \times 2^{2000} = 2^{1998} + 5 \times 2^{2000} = 2^{1998} (1 + 5 \times 4) = 2^{1998} \times 21$$

و 21 يقبل القسمة على 3 و 2^{1998} يقبل القسمة على 4

إصلاح التمرين عد 9-دند:

مجموعة الأعداد التي تتكون من رقمين مختلفين من بين الأرقام 7 و 8 و 9 هي :





$$A = \{79, 78, 89, 87, 97, 98\}$$

و كمّ هذه المجموعة يساوي : $3 \times 2 = 6$




إصلاح التمرين ع-10-دد:

يمكن رسم 6 مستقيمات نقر من نقطتين من بين النقاط A و B و C و D بالرسم التالي: $\frac{4 \times 3}{2} = 6$

إصلاح التمرين ع-11-دد:

لنعتبر الشكل التالي :

لهذا الشكل 20 قطر

إصلاح التمرين ع-12-دد:

لدينا : $P = 5^{2012} - 5^{2011}$ إذن طول الضلع هو : $\frac{P}{4}$

$$P = 5^{2012} - 5^{2011} = 5 \times 5^{2011} - 5^{2011} = 5^{2011} \times (5 - 1) = 5^{2011} \times 4$$

إذن طول الضلع هو : $\frac{P}{4} = \frac{4 \times 5^{2011}}{4} = 5^{2011}$ وهو عدد صحيح طبيعي

إصلاح التمرين ع-13-دد:

(1 عدد قواسم العدد : $a = 2^3 \times 3^2$ هو : $(1 + \text{دليل قوة العامل الثاني}) \times (1 + \text{دليل قوة العامل الأول})$)

$$= (3 + 1) \times (2 + 1) = 4 \times 3 = 12$$

8	4	2	1	×
				1
				3
				9


(2 عدد قواسم العدد : $5a = 5 \times 2^3 \times 3^2$ هو :

$(1 + \text{دليل قوة العامل الثالث}) \times (1 + \text{دليل قوة العامل الثاني}) \times (1 + \text{دليل قوة العامل الأول})$)

$$= (1 + 1) \times (3 + 1) \times (2 + 1) = 2 \times 4 \times 3 = 24$$

ملاحظة:

هذه النتائج حسب برنامج السابعة أساسي ، كما يمكن استعمال شجرة الاختيار للحصول على نفس النتائج .

اصلاح التمرين ع-14-دد:

يمكن اجراء 6 مقابلات

اصلاح التمرين ع-15-دد:

نرمز بـ : P إلى قيس طول المحيط و بـ : L إلى قيس الطول و بـ : l إلى قيس العرض

$$\text{حيث : } P = 64 \times 10^4 \text{ و } L = 20 \times 10^4 \text{ و } ? = \frac{P}{2} - L$$

$$\text{إذن : } ? = \frac{P}{2} - L = 32 \times 10^4 - 20 \times 10^4 = 12 \times 10^4$$

و العدد : 12×10^4 يقبل القسمة على 12 و على 10 و بالتالي فهو يقبل القسمة على 3 و 5
إذن يقبل القسمة على 15 . و بالتالي : ? يقبل القسمة على 12 و 15 في نفس الوقت

اصلاح التمرين ع-16-دد:

لنعتبر العدد 20.....121314.....1234567891011

(1) يحوي هذا العدد 31 رقما

(2) - أ) وهو يقبل القسمة على 12: لأن مجموع أرقامه يساوي 210 من مضاعفات 3 و العدد

المكون من رقمي أحاده و عشراته هو 20 يقبل القسمة على 4 :

ب) و على 15 لأن مجموع أرقامه من مضاعفات 3

و رقم أحاده صفر (يعني يقبل القسمة على 5)

ج) و لكنه لا يقبل القسمة على 9 لأن مجموع أرقامه ليس من مضاعفات 9

اصلاح التمرين ع-17-دد:

(1) تظهر على الشاشة نفس الأرقام، خلال الأربعة والعشرين ساعة 6 مرات وهي 0:00 و

1:11 و 2:22 و 3:33 و 4:44 و 5:55

(2) تظهر على الشاشة أرقاما متتالية خلال الأربعة والعشرين ساعة 5 مرات وهي 0:12 و

1:23 و 2:34 و 3:45 و 4:56

مجموعة الأعداد الحقيقية

الدرس 2

إصلاح التمرين 1:

$$\frac{3}{11} = 0, \underline{27} \quad ; \quad \frac{4}{11} = 0, \underline{36} \quad ; \quad \frac{5}{11} = 0, \underline{45} \quad ; \quad \frac{6}{11} = 0, \underline{54} \quad ; \quad \frac{13}{11} = 1, \underline{18} \quad (1)$$

$$\frac{1}{11} = 0, \underline{09} \quad ; \quad \frac{2}{11} = 0, \underline{18}$$

نلاحظ أن الجزء العشري مضاعف للعدد 9

$$\frac{1}{7} = 0, \underline{142857} \quad ; \quad \frac{2}{7} = 0, \underline{285714} \quad ; \quad \frac{235}{7} = 33, \underline{571428} \quad ; \quad \frac{13}{7} = 1, \underline{857142} \quad (2)$$

نلاحظ أن الجزء العشري مكون من نفس الأرقام ونفس التسلسل

$$\frac{7}{11} = 0, \underline{63} \quad ; \quad \frac{3}{11} = 0, \underline{27} \quad ; \quad \frac{4}{11} = 0, \underline{36} \quad (3)$$

نلاحظ أن الجزء العشري مضاعف للعدد 9 و أن الجزء العشري لـ $\frac{7}{11}$ يساوي مجموع الجزئين العشريين

للعددين $\frac{3}{11}$ و $\frac{4}{11}$

إصلاح التمرين 2:

لنعتبر الأعداد التالية: $c = \frac{629}{200}$ و $b = \pi$; $a = \frac{22}{7}$

$$; \quad c = 3,14 \quad ; \quad b = 3,14 \quad ; \quad a = 3,14 \quad (1)$$

نلاحظ أن القيم التقريبية برقمين بعد الفاصل لكل من a و b و c متساوية

$$c > a > b : \text{ إذن } c = 3,145 \quad ; \quad b = 3,141 \quad ; \quad a = 3,142 \quad (2)$$

إصلاح التمرين 3:

ليكن $a = 3,11411441144411444411$ و $b = -5,1357111317192329\dots$
1. العدد a هو كسري لأن كتابته العشرية منتهية .

$$a = \frac{311411441144411444411}{10^{20}} = 3,11411441144411444411 \quad (ب)$$

$$2. \quad - \quad b = -5,1357111317192329 \quad 3137\dots$$

ب - b لا ينتمي إلى Q لأن كتابته العشرية غير منتهية و غير دورية

إصلاح التمرين 4:

$$A = \left\{ -\frac{2}{7}; \frac{11}{5}; -\pi; \sqrt{8}; \sqrt{\frac{4}{49}}; -\sqrt{2}; \sqrt{0,25} \right\}$$

نعتبر المجموعة

$$A \cap \mathbb{Q} = \left\{ -\frac{2}{7}, \sqrt{\frac{4}{49}}, \frac{11}{5}, \sqrt{0,25} \right\} \quad ; \quad A \cap \mathbb{D} = \left\{ \frac{11}{5}, \sqrt{0,25} \right\} \quad ; \quad A \cap \mathbb{Z} = \{ \}$$

$$A \cap \mathbb{R} = \left\{ -\frac{2}{7}, \sqrt{\frac{4}{49}}, \frac{11}{5}, -\pi, \sqrt{8}, -\sqrt{2}, \sqrt{0,25} \right\} \quad ;$$

الأعداد الصماء من بين أعداد المجموعة A هي : $-\sqrt{2}$; $\sqrt{8}$ و π

التمرين 5:

a	2,357	$\sqrt{8}$	-1,123456789101112...	$\sqrt{0,36}$	$-\pi$	$-\sqrt{\frac{25}{81}}$
$a \in \mathbb{Q}$	×			×		×
$a \notin \mathbb{Q}$		×	×		×	
$a \in \mathbb{R}^+$	×	×		×		
$a \in \mathbb{R}^-$			×		×	×

التمرين 6:

الكتابة العشرية الدورية للعدد الكسري $\frac{2375}{333}$ هي : $\frac{2375}{333} = 7,132$

الرقم الذي رتبته 100 بعد الفاصل هو : 1.

الرقم الذي رتبته 2008 بعد الفاصل هو : 1.

التمرين 7:

(1) الكتابة العشرية الدورية للعدد $\frac{17}{6}$ هي : $\frac{17}{6} = 2,8\bar{3}$


(2) $\frac{17}{6} - 1 = 2,8\bar{3} - 1 = 1,8\bar{3}$ و $\frac{17}{6} + 1 = 2,8\bar{3} + 1 = 3,8\bar{3}$

(3) إذا الكتابة العشرية الدورية لـ : $\frac{23}{6} = 3,8\bar{3}$ لأن $\frac{17}{6} + \frac{6}{6} = \frac{23}{6}$ و $\frac{11}{6} = 1,8\bar{3}$ لأن $\frac{17}{6} - \frac{6}{6} = \frac{11}{6}$

التمرين 8: (وحدة القيس هي الصنمتر)

ليكن ABCD مربعا طول ضلعه n حيث n عدد صحيح طبيعي أكبر من 2 ، والنقاط IJKL بحيث :

$$I \in [AB] ; J \in [BC] ; K \in [CD] ; L \in [DA] ; AI = BJ = CK = DL = 1$$



(1) المثلثات AIL، BIJ، CIK، DKL قائمة حيث $AI = BJ = CK = DL = 1$ إذا $BI = CJ = DK = AL = n - 1$

إذا فهي متقايسة ؛ و ينتج عن تقايسها تقايس العناصر النظرية في كل منها وهي :

$$(2) \text{ إذا الرباعي IJKL مربع مساحته هي : } S = n^2 - 4 \frac{(1 \times (n-1))}{2} \text{ حيث } LI = IJ = JK = KL$$

حيث : $\frac{(1 \times (n-1))}{2}$ هي مساحة كل مثلث من المثلثات القائمة القائمة AIL، BIJ، CIK، DKL

$$S = n^2 - 4 \frac{(1 \times (n-1))}{2} = n^2 - 2n + 2 = (n-1)^2 + 1 \quad \text{بما أن :}$$

إذن طول ضلع المربع IJKL هو : $\sqrt{(n-1)^2 + 1}$

(3) طول ضلع المربع IJKL في حالة $n=3$

$$\sqrt{(n-1)^2 + 1} = \sqrt{(3-1)^2 + 1} = \sqrt{5}$$

طول ضلع المربع IJKL في حالة $n=4$

$$\sqrt{(n-1)^2 + 1} = \sqrt{(4-1)^2 + 1} = \sqrt{10}$$

طول ضلع المربع IJKL في حالة $n=5$

$$\sqrt{(n-1)^2 + 1} = \sqrt{(5-1)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

(4) لرسم قطعة مستقيم طولها $\sqrt{17}$ نرسم مثلثا قائما بعدا ضلعيه القائمين $1mc$ و $5mc$

و يكون طول الضلع الثالث (وتره) $\sqrt{17}cm$

التمرين 9:

(1) $5^2 = 25$ و $4^2 = 16$ إذا 17 محصور بين 25 و 16 يعني $16 < 17 < 25$ إذا $4 < \sqrt{17} < 5$

(2) و بما أن : $(4,1)^2 = 16,81$ و $(4,2)^2 = 17,64$ إذا العدد 17 محصور بين $(4,2)^2$ و $(4,1)^2$

يعني $(4,1)^2 < 17 < (4,2)^2$ و ينتج عن ذلك : $4,1 < \sqrt{17} < 4,2$

(3) و بما أن : $(4,12)^2 = 16,97$ و $(4,13)^2 = 17,06$ إذا العدد 17 محصور بين $(4,12)^2$ و $(4,13)^2$

يعني $(4,12)^2 < 17 < (4,13)^2$ و ينتج عن ذلك : $4,12 < \sqrt{17} < 4,13$

إذا القيمة التقريبية بالزيادة برقمين بعد الفاصل هي : $4,13 > \sqrt{17}$ ؟

التمرين 10:

1. مساحة دائرة شعاعها $R = 3cm$. حيث $\pi = 3.14159265358979 \dots$

$$S = 3 \times 3 \times \pi = 9\pi \text{ cm}^2$$

2. $S = 9\pi = 9 \times 3,14 = 28,26 \text{ cm}^2$ ؛ $S = 9 \times 3,141 = 28,269 \text{ cm}^2$

التمرين 11:

$$\sqrt{\frac{49}{36}} = \frac{7}{6} ; \sqrt{\pi^2} = \pi ; \sqrt{\left(\frac{5}{11}\right)^2} = \frac{5}{11} ; \sqrt{(-8)^2} = 8 ; (\sqrt{20})^2 = 20$$

التمرين 12:

1.

F	E	D	C	B	A	المربع
11	$\sqrt{8}$	2	1	0,5	0,3	طول ضلعه
121	8	4	1	0,25	0,09	مساحته

التمرين 13:

$$\sqrt{20} = 2\sqrt{5} \quad ; \quad \sqrt{\frac{100}{49}} = \frac{10}{7} \quad ; \quad \sqrt{0,25} = 0,5 \quad ; \quad \sqrt{81} = 9 \quad ; \quad \sqrt{0,01} = 0,1 \quad ; \quad \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\sqrt{50} = 7,071 \quad \text{إذا} \quad (7,071)^2 = 49,999 \quad \text{بما أن} \quad (2)$$

$$-\sqrt{48} = -6,928 \quad \text{إذا} \quad (6,928)^2 = 47,997 \quad \text{بما أن}$$

$$\sqrt{\pi} = 1,773 \quad \text{إذا} \quad 1,773^2 = 3,143 \quad \text{بما أن}$$

$$\sqrt{26} = 5,099 \quad \text{إذا} \quad (5,099)^2 = 25,999 \quad \text{بما أن}$$

$$\sqrt{24} = 4,899 \quad \text{إذا} \quad (4,899)^2 = 24,000 \quad \text{بما أن}$$

$$-\sqrt{3} = -1,732 \quad \text{إذا} \quad 1,732^2 = 2,999 \quad \text{بما أن}$$

$$\sqrt{10} = 3,162 \quad \text{إذا} \quad (3,162)^2 = 9,998 \quad \text{بما أن}$$

التمرين 14: المستقيم (xx') مدرج وفق المعين (O,I) إذا : $A(-\sqrt{8})$ و $B(-\frac{7}{5})$ و $C(\sqrt{2})$ و $D(\sqrt{5})$.

CMS

العمليات في مجموعة الأعداد الحقيقية

درس عدد 3

العمليات في مجموعة الأعداد الحقيقية

درس عدد 3

- (1) (1 - 1) كل عدد حقيقي له مقابل . صحيح
- ب) إذا كان b عددا حقيقيا، فإن $(-b)$ عدد سالب . خطأ
- لأن: $b = -5$ إذا $b = 5$ وهو موجب صحيح
- ج) إذا كان a و x عددين حقيقيين، فإن : $(a=0)$ و $(x=0)$ يعني $(x+a=0)$. صحيح
- (2) (1 - 2) (أ) مهما يكن العدد الحقيقي a ، فإن : $a \times \frac{1}{a} = 1$. خطأ
- لأنه إذا كان: $a = 0$ فإن $\frac{1}{a}$ غير موجود
- ب) إذا كان a و b عددين حقيقيين، فإن : $(a^2 = b^2)$ يعني $(a = b)$. خطأ
- لأن: $5^2 = (-5)^2$ و لكن $5 \neq -5$
- ج) العدد $\sqrt{5} - 2$ هو مقلوب $\sqrt{5} + 2$. صحيح

(2)

1 - إذا كان a و b عددين حقيقيين بحيث $a + b = 0$ ، فإن:

a و b عددان مقلوبان.

a و b عددان متقابلان

a و b عددان متساويان

2 - إذا كان $E = (a + \frac{7}{3}) - 2a$ و $a = \frac{2}{3}$ ، فإن E تسوي:

$\frac{5}{3}$ $-\frac{5}{3}$ $\frac{5}{6}$

العدد $4\sqrt{48} - 2\sqrt{108} - 2\sqrt{3}$ يساوي :

$4\sqrt{3}$ $2\sqrt{3}$ $-2\sqrt{3}$

(3)

$$A = \sqrt{3} - [2 - (\sqrt{3} - 1)] - (\sqrt{3} - 2) = \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3} - 1 - \sqrt{3} + 2 = \sqrt{3} - 1$$

$$B = \sqrt{2} - (\frac{1}{2} - \pi) - [\sqrt{2} + (1 + \pi) - \frac{3}{2}] = \sqrt{2} - \frac{1}{2} + \pi - \sqrt{2} - 1 - \pi + \frac{3}{2} = 0$$

$$C = 1 + \sqrt{2} - [2 - (\sqrt{2} - \sqrt{3})] + \sqrt{3} = 1 + \sqrt{2} - 2 + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{2} - 1$$



يمثل الرسم المجاور تصميمًا لملاعب مكون من مستطيل بعدها 100 m و 63,66 m ونصفي قرص دائري

لتكن S مساحة هذا الملعب وهي مكونة من مجموع مساحة المستطيل S_1 ومساحة دائرة S_2

$$S_1 = 63,66 \times 100 = 6366 \text{ m}^2$$

$$S_2 = 31,83^2 \times 3,14 = 3181,287 \text{ m}^2$$

$$S = S_1 + S_2 = 9547,287 \text{ m}^2$$

$$x = (\sqrt{3} - \frac{1}{2}) - (\frac{7}{4} - \frac{1}{2}) = \sqrt{3} - \frac{1}{2} - \frac{7}{4} + \frac{1}{2} = \sqrt{3} - \frac{7}{4} \quad (1) \quad (5)$$

$$y = 1 - (\frac{5}{2} - \sqrt{2}) = 1 - \frac{5}{2} + \sqrt{2} = -\frac{3}{2} + \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} & \text{سالِب } (-\frac{7}{4} + \sqrt{3}) \text{ لأن } |x| = |-\frac{7}{4} + \sqrt{3}| = \frac{7}{4} - \sqrt{3} \quad (2) \\ & \text{سالِب } (-\frac{3}{2} + \sqrt{2}) \text{ لأن } |y| = |\sqrt{2} - \frac{3}{2}| = \frac{3}{2} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$a - b = 2 \text{ حيث } a \text{ و } b \text{ عددين حقيقيين} \quad (6)$$

$$A = (a-2) - (b-\sqrt{2}) = a-2-b+\sqrt{2} = a-b-2+\sqrt{2} = 2-2+\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$B = (b-\pi) - (a-2\pi) = b-\pi-a+2\pi = b-a+\pi = -2+\pi$$

$$C = (a-1) - (b+1) = a-1-b-1 = a-b-2 = 2-2 = 0$$

$$A = 1 - (\frac{5}{2} - \pi) - (\frac{1}{2} - \pi) + (2 - \pi) = 1 - \frac{5}{2} + \pi - \frac{1}{2} + \pi + 2 - \pi = 3 - 3 + \pi = \pi \quad (7)$$

$$\begin{aligned} B &= (\frac{1}{2} - \sqrt{3}) - [1 - (\sqrt{3} + \pi)] + \sqrt{3} - \pi = \frac{1}{2} - \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} + \pi + \sqrt{3} - \pi \\ &= \frac{1}{2} - 1 + \sqrt{3} = -\frac{1}{2} + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{2} - \sqrt{3} + [\sqrt{2} - (\sqrt{3} - 1)] - (\sqrt{2} + \sqrt{3}) \\ &= \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{3} + 1 - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 1 + \sqrt{2} - 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$A = 1 - (\frac{3}{2} - 4) - (\frac{3}{2} + \sqrt{2}) = 1 - \frac{3}{2} + 4 - \frac{3}{2} - \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2} \quad (8)$$

$$B = \sqrt{3} + 2 - [\sqrt{3} - (\sqrt{2} - 4)] = \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 4 = \sqrt{2} - 2$$

$$A + B = 2 - \sqrt{2} + \sqrt{2} - 2 = 0 \quad (2)$$

$$|B| = |\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2} \quad (3)$$

$$|a| = |-3 - \sqrt{3}| = 3 + \sqrt{3} \text{ إذن } a = -3 - \sqrt{3} \quad (9)$$

$$|b| = |\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2} \text{ إذن } b = \sqrt{2} - 2$$

$$|c| = |\pi - 3| = \pi - 3 \text{ إذن } c = \pi - 3$$

$$|d| = |1 + \sqrt{5}| = 1 + \sqrt{5} \text{ إذن } d = 1 + \sqrt{5}$$

$$A = (1 - \sqrt{2})(2 - \sqrt{2}) - \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) = 2 - \sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 2 - 3 + \sqrt{3} = 1 - 3\sqrt{2} + \sqrt{3} \quad (10)$$

$$B = (\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - 2(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 2 - 3 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = -1 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

$$C = (1 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) - (1 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})$$

$$= 2 - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 3 - 2 + \sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 2 = -1 - \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

$$b = \sqrt{12} - \sqrt{11} \text{ و } a = \sqrt{12} + \sqrt{11} \quad (1) \quad (11)$$

$$a \times b = (\sqrt{12} + \sqrt{11})(\sqrt{12} - \sqrt{11}) = (\sqrt{12})^2 - (\sqrt{11})^2 = 12 - 11 = 1$$

إذن a هو مقلوب b يعني $b = \frac{1}{a}$ و $a = \frac{1}{b}$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = b + a = \sqrt{12} - \sqrt{11} + \sqrt{12} + \sqrt{11} = 2\sqrt{12} \quad (2)$$

$$x = \sqrt{12} - \sqrt{27} + 2 \text{ و } y = 2 + \sqrt{3} \quad (12)$$

$$x = \sqrt{12} - \sqrt{27} + 2 = \sqrt{4 \times 3} - \sqrt{9 \times 3} + 2 = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 2 = -\sqrt{3} + 2 \quad (1)$$

$$x = 2 - \sqrt{3} \quad \text{يعني}$$

$$x \times y = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = (2)^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1 \quad (2)$$

يعني x و y مقلوبان .

$$x^2 = (2 - \sqrt{3})^2 = 4 + 3 - 4\sqrt{3} = 7 - 4\sqrt{3} \quad (3)$$

$$y^2 = (2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 3 + 4\sqrt{3} = 7 + 4\sqrt{3}$$

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2}{xy} + \frac{y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{7 - 4\sqrt{3} + 7 + 4\sqrt{3}}{(7 - 4\sqrt{3}) + (7 + 4\sqrt{3})} = \frac{14}{49 - 48} = 14$$

$$a = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = \sqrt{2}(3 + 5) = 8\sqrt{2} \quad (13)$$

$$b = 2\sqrt{3} - 4\sqrt{2} = 2(\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

$$c = 2 - \sqrt{2} = \sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)$$

$$d = \sqrt{5} - \sqrt{20} = \sqrt{5} - \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}(1 - 2) = -\sqrt{5}$$

$$\sqrt{20} \times \sqrt{10} = \sqrt{200} = \sqrt{100} \sqrt{2} = 10\sqrt{2} \quad (14)$$

$$\sqrt{3} \times \sqrt{27} = \sqrt{81} = 9$$

$$\sqrt{11} \times \sqrt{2} \times \sqrt{11} = \sqrt{11 \times 11} \sqrt{2} = 11\sqrt{2}$$

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{48} = \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{9 \times 3} - \sqrt{16 \times 3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

$$A = \sqrt{32} - 2\sqrt{50} + \sqrt{128} = \sqrt{16 \times 2} - 2\sqrt{25 \times 2} + \sqrt{64 \times 2} = 4\sqrt{2} - 10\sqrt{2} + 8\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \quad (15)$$

$$B = \sqrt{48} + 2\sqrt{75} - 3\sqrt{27} = \sqrt{16 \times 3} + 2\sqrt{25 \times 3} - 3\sqrt{9 \times 3} = 4\sqrt{3} + 10\sqrt{3} - 9\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$C = 2\sqrt{44} + \sqrt{275} - 2\sqrt{11} = 2\sqrt{11 \times 4} + \sqrt{25 \times 11} - 2\sqrt{11} = 4\sqrt{11} + 5\sqrt{11} - 2\sqrt{11} = 7\sqrt{11}$$

$$a = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3}{4} \quad (16)$$

$$b = \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{27}} = 5\sqrt{3} \times \frac{5}{2\sqrt{27}} = \frac{25\sqrt{3}}{2\sqrt{27}} = \frac{25\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{25}{6}$$

$$C = \frac{\frac{1-\sqrt{2}}{(1+\sqrt{2})} - \frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}}{2\sqrt{2}} = \frac{(1-\sqrt{2})^2 - (1+\sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \frac{1+\sqrt{2}^2 - 2\sqrt{2} - (1+\sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2})}{2\sqrt{2}(1-2)}$$

$$= \frac{1+\sqrt{2}^2 - 2\sqrt{2} - 1 - \sqrt{2}^2 - 2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}(-1)} = \frac{-4\sqrt{2}}{-2\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 2$$

$$a = \frac{2}{\sqrt{2}+1} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{2}{\sqrt{2}+1} - \frac{1}{1} = \frac{2}{\sqrt{2}+1} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \frac{2-\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} = \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} = \frac{(1-\sqrt{2})(1-\sqrt{2})}{(1-\sqrt{2})(\sqrt{2}+1)} = \frac{3-2\sqrt{2}}{-1} = 2\sqrt{2} - 3$$

(17)

$$b = \frac{3}{\sqrt{3}+2} - \frac{4}{\sqrt{3}-2} = \frac{3(\sqrt{3}-2)}{(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)} - \frac{4(\sqrt{3}+2)}{(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)} = \frac{3\sqrt{3}-6-4\sqrt{3}-8}{3-4} = \frac{-\sqrt{3}-14}{-1} = \sqrt{3} + 14$$

$$c = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} - \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7}(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+\sqrt{5})(\sqrt{7}-\sqrt{5})} - \frac{\sqrt{5}(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{(\sqrt{7}+\sqrt{5})(\sqrt{7}-\sqrt{5})} = \frac{7-\sqrt{35}-\sqrt{35}-5}{7-5} = \frac{2-2\sqrt{35}}{-2} = 1 - \sqrt{35}$$

$$\sqrt{\frac{40}{25}} = \sqrt{\frac{8}{5}}$$

(18)

$$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{24}} = \sqrt{\frac{12}{24}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\sqrt{28}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{4 \times 7}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{4}\sqrt{7}}{2\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{2\sqrt{7}} = 1$$


$$\sqrt{27} \times \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{6}} = \sqrt{27} \times \frac{\sqrt{6 \times 12}}{\sqrt{6}} = \sqrt{27} \times \frac{\sqrt{6}\sqrt{12}}{\sqrt{6}} = \sqrt{27} \times \sqrt{12} = \sqrt{9}\sqrt{3} \times \sqrt{4}\sqrt{3} = 18$$

$$\sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{\frac{12}{10}} = \sqrt{\frac{2}{5} \times \frac{12}{10}} = \sqrt{\frac{24}{50}} = \sqrt{\frac{24}{50}} = \sqrt{\frac{12}{25}} = \frac{2}{5}\sqrt{3}$$

(1) بما أن $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ إذن العددين $\sqrt{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2}$ متناسبان مع العددين 4 و $\sqrt{6}$.

(19)

(2) $\sqrt{3}$ و x متناسبان مع 2 و $\frac{2}{\sqrt{3}}$ يعني $\frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ إذن $2x = \sqrt{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}}$ إذن $x = 1$



(1 - مساحة الحافة المحيطة بالمسبح.

20

$$s = (16,5 \times 10) + 3,14 \times (5^2) - [(15 \times 7) + 3,14 \times (3,5^2)]$$

$$= 165 + 78,5 - [105 + 38,465] = 243,5 - 143,465 = 100,035\text{m}^2$$

(2) إذن كان ارتفاع الماء في المسبح هو $h = 90 \text{ cm}$ فإن حجمه : $V = S \times h$.

$$V = 143,465 \times 0,9 = 129,1185 \text{ m}^3 = 129118,5 \text{ d m}^3 = 129118,5 \text{ l}$$

القوى في مجموعة الأعداد الحقيقية

درس عدد 4

تمرين 1

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)^4 = \left(\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{1}\right)^4 = 2^4 = 16$$

$$\left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\frac{1}{\sqrt{18}}}\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{18}}{1}\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{1}\right)^3 = 2^3 = 8$$

$$\left(\frac{\frac{2}{\sqrt{11}}}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}}\right)^6 = \left(\frac{2}{\sqrt{11}} \times \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{2}}\right)^6 = \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^6 = (\sqrt{2})^6 = 2^3 = 8$$

$$2^8 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^8 = \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)^8 = (\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$$

$$\left(-\frac{\sqrt{6}}{5}\right)^3 \times \left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^3 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{5} \times \frac{5}{\sqrt{3}}\right)^3 = (-\sqrt{2})^3 = -2\sqrt{2}$$

$$10000 \times \left(\frac{1}{10}\right)^4 = 10^4 \times \left(\frac{1}{10}\right)^4 = \left(\frac{10}{10}\right)^4 = 1$$

تمرين 2

$$a = (-\sqrt{7})^5 \times (-\sqrt{7})^3 = (-\sqrt{7})^8 = \sqrt{7}^8 = 7^4$$

$$b = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^5 \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^4 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^9$$

$$c = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^6 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{11}$$

$$d = [(-5)^3]^5 \times [(-5)^4]^3 = (-5)^{15} \times (-5)^{12} = (-5)^{27}$$

$$e = \left(\frac{16}{25}\right)^3 \times \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^7 = \left(\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^4\right)^3 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{17}$$

تمرين 3

$3^4 = 4 \times 4 \times 4$	$3(\sqrt{2})^5 = 3^5 \times (\sqrt{2})^5$	$(\sqrt{2})^5 = \sqrt{2} \times 5$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4$
$(\sqrt{7})^5 = \sqrt{7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7}$	$\left[\left(\sqrt{2}\right)^{-4}\right]^2 = -(\sqrt{2})^8$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^5 = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3$	$\frac{(\sqrt{2})^{15}}{(\sqrt{2})^5} = (\sqrt{2})^3$
	$\left[\left(-\frac{2}{\sqrt{7}}\right)^3\right]^4 = \left[\left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right)^4\right]^3$		$(5\sqrt{17})^{-4} \times (25\sqrt{17})^5 = 5^6 \times \sqrt{17}$

إصلاح الأخطاء

(1) أخطاء ألواد الأول :

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 ; 3(\sqrt{2})^5 = 3 \times 4\sqrt{2} = 12\sqrt{2} ; (\sqrt{2})^5 = (\sqrt{2})^4 \times \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

(2) أخطاء ألواد الثاني :

$$[(\sqrt{2})^{-4}]^2 = (\sqrt{2})^{-8} ; \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^5 = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3 ; \frac{(\sqrt{2})^{15}}{(\sqrt{2})^5} = (\sqrt{2})^{10}$$

تمرين 4

نعتبر الأعداد الحقيقية a و b و c حيث $a = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^5$ و $b = \left(\frac{3}{2}\right)^3$ و $c = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^6$

$$ba = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^5 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}^5}{3^2} \times \frac{1}{2^3} = \frac{\sqrt{2}^5}{3^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}^6} = \frac{\sqrt{2}^{5-6}}{3^2} = \frac{\sqrt{2}^{-1}}{3^2} = \frac{1}{9\sqrt{2}}$$

$$ca = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^5 \times \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^6 = \frac{\sqrt{2}^{5-6}}{3^{5-6}} = \frac{\sqrt{2}^{-1}}{3^{-1}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$cb = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \times \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^6 = \frac{3^9}{2^6}$$

تمرين 5

$$a = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3}{\left(\frac{\sqrt{2}}{7}\right)^3} = \left(\frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{7}{\sqrt{2}}\right)^3 = \left(\frac{7}{3}\right)^3$$

$$b = \frac{\left(\frac{-\sqrt{3}}{\pi}\right)^5}{\left(\frac{2}{\pi}\right)^5} = \left(\frac{-\sqrt{3}}{\pi} \times \frac{\pi}{2}\right)^5 = \left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)^5$$

$$c = \frac{(-2)^7}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^7} = (-2)^7 \times (\sqrt{2})^7 = -\sqrt{2}^{14} \times (\sqrt{2})^7 = -\sqrt{2}^{21}$$

$$d = \frac{(1,3)^4}{\left(\frac{\sqrt{13}}{5}\right)^4} = \left(\frac{13}{10}\right)^4 \times \left(\frac{5^4}{13^2}\right) = \frac{13^4}{2^4 \times 5^4} \times \left(\frac{5^4}{13^2}\right) = \frac{13^2}{4^2} = \left(\frac{13}{2}\right)^2$$

$$e = \frac{4\pi^3}{81} = \left(\frac{2\pi}{9}\right)^2$$

تمرين 6

$$A = \frac{2,5 \times 10^{14}}{5 \times 10^{12}} = \frac{25 \times 10^{-1} \times 10^{14}}{5 \times 10^{12}} = 5 \times 10 = 50$$

$$B = \frac{36 \times 10^{-5}}{9 \times 10^4} = 4 \times 10^{-9}$$

$$C = \frac{0,28 \times 10^{-3}}{\sqrt{7} \times 10^{-5}} = \frac{28 \times 10^{-5}}{\sqrt{7} \times 10^{-5}} = 4 \sqrt{7}$$

$$D = \frac{0,0003 \times 10^7}{\sqrt{3} \times 10^{-3}} = \frac{3 \times 10^{-4} \times 10^7}{\sqrt{3} \times 10^{-3}} = \frac{3 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 10^{-3}} = \sqrt{3} \times 10^6$$

تمرين 7

نعتبر a و b و c ثلاثة أعداد حقيقية حيث $ab = c$

$$a = \frac{c}{b} \text{ يعني } ba = c \quad (1)$$

$$a = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}\sqrt{2}^5} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}\sqrt{2}\sqrt{2}^4} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}\sqrt{2}^4} = \frac{1}{\sqrt{2}^4} = \sqrt{2}^{-4} = 4^{-2} \text{ إذن } c = \sqrt{6} \text{ و } b = \sqrt{3} \times (\sqrt{2})^5$$

$$a = \frac{\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^{-3}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^4} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3}{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^{3-4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ إذن } c = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^{-3} \text{ و } b = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^4$$

(ب) لدينا: $ba = c$ نضرب طرفي المساواة في ba و نتحصل على $ba = ba \times ba \times c$

$$\text{إذن } abc = (ab)^2$$

$$\text{بما أن } a = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^3 \text{ و } b = \left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)^{-3} \text{ إذن :}$$

$$ba = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^3 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^3 \times \left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right)^3 = \left(\frac{2 \times 5}{\sqrt{5} \times \sqrt{2}}\right)^3 = \left(\frac{10}{\sqrt{10}}\right)^3 = (\sqrt{10})^3 = 10\sqrt{10}$$

$$cba = (ba)^2 = (10\sqrt{10})^2 = 1000$$

تمرين 8

$$(-6^3)^{20}, \left[(\sqrt{6})^{20}\right]^6, (3 \times 2^{15})^4, \left[(\sqrt{6})^{12}\right]^{10}, \left[(\sqrt{3})^{60} \times 2^{30}\right]^2, \left[(-36)^5\right]^6, \left(\sqrt{3^{30} \times 2^{30}}\right)^4$$

العدد الدخيل هو : $(3 \times 2^{15})^4$ لأن كل الأعداد الأخرى تساوي 6^{60}

الترتيب و المقارنة

درس عدد 5

التمرين (1):

$$\frac{-9}{2} < \frac{-120}{35} < \frac{-1}{2} < \frac{22}{7} < \frac{315}{100} < \frac{72}{21} \quad (أ)$$

$$\sqrt{2} > 1,4 > \frac{13}{100} > -\frac{8}{7} > -1,7 > -\sqrt{3} \quad (ب)$$

التمرين (2):

$$أ- \quad -\sqrt{11} < -\sqrt{7} \text{ لأن } b < a \text{ إذن } b = -\sqrt{11} + 9 \text{ و } a = -\sqrt{7} + 9$$

$$ب- \quad \frac{1}{4} < \frac{2}{3} \text{ و } -\sqrt{5} < \sqrt{5} \text{ لأن } b < a \text{ إذن } b = \frac{1}{4} - \sqrt{5} \text{ و } a = \frac{2}{3} + \sqrt{5}$$

$$ج- \quad b = 2\sqrt{2} - 9\sqrt{7} \text{ و } a = -5\sqrt{7} + \sqrt{2}$$

المقارنة باستعمال الفرق :

$$a - b = -5\sqrt{7} + \sqrt{2} - (2\sqrt{2} - 9\sqrt{7}) = -5\sqrt{7} + \sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 9\sqrt{7} = 4\sqrt{7} - \sqrt{2} > 0$$

إذن : $a > b$

التمرين (3):

$$أ- \quad y = 2\sqrt{13} - \sqrt{17} \text{ و } x = 3\sqrt{13} - \sqrt{19}$$

المقارنة باستعمال الفرق :

$$x > y \text{ : إذن } x - y = 3\sqrt{13} - \sqrt{19} - 2\sqrt{13} + \sqrt{17} = \sqrt{13} - \sqrt{19} + \sqrt{17} > 0$$

$$ب- \quad y = \frac{10}{43} + \frac{5\sqrt{3}}{4} \text{ و } x = \frac{100}{415} + \frac{5\sqrt{3}}{4}$$

$$x > y \text{ : إذن } x - y = \frac{100}{415} + \frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{10}{43} - \frac{5\sqrt{3}}{4} = \frac{100}{415} - \frac{10}{43} = \frac{100}{415} - \frac{100}{430} > 0$$

$$ج- \quad y = \frac{\sqrt{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}}{4} \text{ و } x = \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{12}$$

$$\text{بما أن : } y = \frac{\sqrt{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}}{4} \text{ إذن } x = \frac{3\sqrt{3} + \sqrt{2}}{12} \text{ إذن } x < y$$

التمرين (4):

نرمز ب: h_1 إلى ارتفاع الزيت في الحوض الأول و ب: h_2 إلى ارتفاع الزيت في الحوض الثاني

$$\text{إذن : } h_2 = \frac{20 \times 10^4}{4,5 \times 1,5} = \frac{20 \times 10^4}{6,75} = 2,96 \times 10^4 \text{ و } h_1 = \frac{28 \times 10^4}{3,5 \times 2,5} = \frac{28 \times 10^4}{8,75} = 3,2 \times 10^4$$

إذن : $h_2 < h_1$

التمرين (5):

$$1- \text{ لمقارنة العددين } 2\sqrt{13} \text{ و } 3\sqrt{7} \text{ نقارن مربعيهما : } (2\sqrt{13})^2 = 52 \text{ و } (3\sqrt{7})^2 = 63$$

$$\text{إذن : } (2\sqrt{13})^2 < (3\sqrt{7})^2 \text{ وبالتالي : } 2\sqrt{13} < 3\sqrt{7}$$

$$(2) \quad \frac{-1}{5+2\sqrt{13}} < \frac{-1}{5+3\sqrt{7}} \text{ : إذن } 5+2\sqrt{13} < 5+3\sqrt{7} \text{ إذن } 2\sqrt{13} < 3\sqrt{7}$$

(3) ليكن a و b عددين حقيقيين حيث $a \leq b$

$$\begin{aligned} \text{أ) } a \leq b \text{ و } \frac{-4}{5}b \leq \frac{-4}{5}a \text{ : سالب إذن} \\ \text{ب-} \left\{ \begin{array}{l} 2\sqrt{13} < 3\sqrt{7} \\ \frac{-4}{5}b \leq \frac{-4}{5}a \end{array} \right. \text{ إذن : } \frac{-4}{5}b + 2\sqrt{13} < \frac{-4}{5}a + 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

التمرين (6):

$$\begin{aligned} \text{أ-} |3 - \sqrt{19}| > |3 - \sqrt{17}| \text{ لأن } 3 - \sqrt{19} \text{ و } 3 - \sqrt{17} \text{ سالبان حيث } 3 - \sqrt{19} < 3 - \sqrt{17} \\ \text{ب-} (7 - \sqrt{5})^2 = 54 - 14\sqrt{5} \text{ و } (5 - \sqrt{7})^2 = 32 - 10\sqrt{7} \text{ و بما أن } 10\sqrt{7} < 14\sqrt{5} \text{ و } 32 < 54 \\ \text{إذن } (5 - \sqrt{7})^2 < (7 - \sqrt{5})^2 \end{aligned}$$

$$\text{ج- بما أن } 18 - \sqrt{17} < 18 - \sqrt{13} \text{ إذن } \sqrt{18 - \sqrt{17}} < \sqrt{18 - \sqrt{13}}$$

التمرين (7):

$$\begin{aligned} \text{1) بما أن : } \frac{-\sqrt{7}}{2} < \frac{-\sqrt{5}}{2} \text{ إذن } \frac{-\sqrt{7}}{2} + \frac{-\sqrt{7}}{2} < \frac{-\sqrt{5}}{2} + \frac{-\sqrt{7}}{2} \text{ يعني } \frac{-\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2} > -\sqrt{7} \\ \text{ب-} -\sqrt{5} \text{ و } \frac{-\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{بما أن : } \frac{-\sqrt{7}}{2} < \frac{-\sqrt{5}}{2} \text{ إذن } \frac{-\sqrt{7}}{2} + \frac{-\sqrt{5}}{2} < \frac{-\sqrt{5}}{2} + \frac{-\sqrt{5}}{2} \text{ يعني } \frac{-\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2} < -\sqrt{5} \\ \text{2) و بالتالي : } -\sqrt{7} < \frac{-\sqrt{7} - \sqrt{5}}{2} < -\sqrt{5} \end{aligned}$$

التمرين (8):

$$\begin{aligned} \text{1) ليكن } a \text{ و } b \text{ عددين حقيقيين موجبين حيث } a < b \\ \text{أ-} a < b \text{ نضرب طرفي المقارنة في } a \text{ ثم في } b \text{ ونحصل على : } a^2 < ab \text{ ثم على : } ab < b^2 \\ \text{إذن } a^2 < ab < b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ب- و نمر إلى الجذور التربيعية ونحصل على : } a < \sqrt{ab} < b \\ \text{2) بما أن : } \frac{195}{43} \times \frac{903}{195} = 21 \text{ و } \frac{903}{195} = 4,630 \text{ و } \frac{195}{43} = 4,534 \end{aligned}$$

$$\text{إذا حسب المساواة السابقة نحصل على : } \sqrt{21} < \frac{903}{195} < \frac{195}{43} \text{ و } \sqrt{21} \approx 4,6$$

التمرين (9):

$$\begin{aligned} \text{لتكن } x \text{ و } y \text{ و } z \text{ ثلاثة أعداد حقيقية موجبة قطعاً حيث } x < z < y \\ \text{أ) لدينا : } \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}z \text{ نضيف } \frac{1}{2}x \text{ إلى طرفي المقارنة ونحصل على:} \end{aligned}$$

$$x < \frac{1}{2}(x+z) \text{ يعني : } \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}x$$

$$\text{لدينا : } \frac{1}{2}z < \frac{1}{2}y \text{ نضيف } \frac{1}{2}z \text{ إلى طرفي المقارنة ونحصل على:}$$

$$z < \frac{1}{2}(y+z) \text{ يعني : } \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}z < \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z$$

$$\text{لدينا : } \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}y \text{ نضيف } \frac{1}{2}x \text{ إلى طرفي المقارنة ونحصل على:}$$

$$x < \frac{1}{2}(x+y) \text{ يعني : } \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}x$$

$$\begin{aligned} \text{ب) لدينا : } 2x < z+y \text{ و } 2x < x+y \text{ و } 2x < z+x \text{ إذن نضرب الحد الأيمن في الحد الأيمن و الحد الأيسر في الحد الأيسر و نحصل على: } 8x^3 < (y+z)(x+y)(x+z) \end{aligned}$$

التمرين (10):

$x > 3$, $y > 3$, $x > y$: و عدنان حقيقيان حيث :

مقارنة: $\frac{x-3}{y-3}$ و $\frac{x}{y}$ باستعمال الفرق:

$$\frac{x-3}{y-3} - \frac{x}{y} = \frac{y(x-3)-x(y-3)}{y(y-3)} = \frac{xy-3y-xy+3x}{y(y-3)} = \frac{-3y+3x}{y(y-3)} = \frac{3(x-y)}{y(y-3)} > 0$$

$$\frac{x-3}{y-3} > \frac{x}{y} \text{ إذن}$$

مقارنة: $\frac{x+1}{y+1}$ و $\frac{x}{y}$ باستعمال الفرق:

$$\frac{x+1}{y+1} < \frac{x}{y} \text{ إذن } \frac{x+1}{y+1} - \frac{x}{y} = \frac{y(x+1)-x(y+1)}{y(y+1)} = \frac{xy+y-xy-x}{y(y+1)} = \frac{y-x}{y(y+1)} < 0$$

مقارنة: $\frac{x+1}{y+1}$ و $\frac{x+2}{y+2}$ باستعمال الفرق:

$$\frac{x+1}{y+1} - \frac{x+2}{y+2} = \frac{(x+1)(y+2)-(x+2)(y+1)}{(y+2)(y+1)} = \frac{xy+y+2x+2-xy-x-2y-2}{(y+2)(y+1)} = \frac{x-y}{(y+2)(y+1)} > 0$$

$$\frac{x-3}{y-3} > \frac{x}{y} > \frac{x+1}{y+1} > \frac{x+2}{y+2} \text{ : وبالتالي } \frac{x+1}{y+1} > \frac{x+2}{y+2} \text{ إذن}$$

التمرين (11):

نعبر العددين الحقيقيين : $a = \sqrt{45} + \sqrt{28}$ و $b = \sqrt{80} + \sqrt{3}$

$$a = \sqrt{45} + \sqrt{28} = \sqrt{9 \times 5} + \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} + \sqrt{4} \times \sqrt{7} = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{7} \quad (1)$$

$$b = \sqrt{80} + \sqrt{3} = \sqrt{16 \times 5} + \sqrt{3} = \sqrt{16} \times \sqrt{5} + \sqrt{3} = 4\sqrt{5} + \sqrt{3}$$

(2) - (أ) لمقارنة $2\sqrt{5}$ و $2\sqrt{7}$ نقارن مربعيهما :

$$2\sqrt{5} < 2\sqrt{7} \text{ إذن } (2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20 \text{ و } (2\sqrt{7})^2 = 4 \times 7 = 28$$

(ب) مقارنة $2\sqrt{5} + \sqrt{3}$ و $3\sqrt{5}$:

لدينا : $\sqrt{3} < \sqrt{5}$ و نضيف $2\sqrt{5}$ إلى حدي المقارنة و نحصل على: $2\sqrt{5} + \sqrt{3} < 3\sqrt{5}$

(3) مقارنة a و b : لدينا :

$$+ \quad 2\sqrt{5} + \sqrt{3} < 3\sqrt{5}$$

$$b < a \text{ يعني } 4\sqrt{5} + \sqrt{3} < 3\sqrt{5} + 2\sqrt{7}$$

التمرين (12):

نعبر المجموعة : $A = \{ -\frac{4}{3}, 3\sqrt{3}, -\sqrt{5}, 6, -2, \frac{\sqrt{7}}{2}, 2\sqrt{11} \}$

(أ) المجموعة B التي عناصرها أصغر أو مساوية من $\frac{3}{2}$ هي: $B = \{ -\frac{4}{3}, -\sqrt{5}, -2, \frac{\sqrt{7}}{2} \}$

(ب) المجموعة C التي عناصرها أكبر من 1.

$$C = \{ 3\sqrt{3}, 6, \frac{\sqrt{7}}{2}, 2\sqrt{11} \}$$

$$A \cap C = C = \{ 3\sqrt{3}, 6, \frac{\sqrt{7}}{2}, 2\sqrt{11} \} \quad (ج)$$

$$A \cup C = A = \{ -\frac{4}{3}, 3\sqrt{3}, -\sqrt{5}, 6, -2, \frac{\sqrt{7}}{2}, 2\sqrt{11} \} \text{ و}$$

التمرين (13):

a و b عددا حقيقيان،

$$B = -(3b - \sqrt{2}a) + 2\sqrt{7} \quad \text{و} \quad A = 2\sqrt{3} + \sqrt{2}a - 3b \quad (1)$$

$$A < B : \text{ إذا } A - B = 2\sqrt{3} + \sqrt{2}a - 3b + (3b - \sqrt{2}a) - 2\sqrt{7} = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{7} < 0$$

$$B = -2(2a - \frac{\sqrt{5}}{4}b) + \frac{9}{4} \quad \text{و} \quad A = \frac{\sqrt{5}}{2}b + \frac{7}{11} - 4a \quad (ب)$$

$$A - B = \frac{\sqrt{5}}{2}b + \frac{7}{11} - 4a + 2(2a - \frac{\sqrt{5}}{4}b) - \frac{9}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}b + \frac{7}{11} - 4a + 4a - \frac{\sqrt{5}}{2}b - \frac{9}{4}$$

$$A < B : \text{ إذن } A - B = \frac{7}{11} - \frac{9}{4} < 0$$

التمرين (14):

$$\sqrt{7} + 1 < a < 3\sqrt{7} - 1 \quad \text{و} \quad \sqrt{7} - 1 < b < \sqrt{7} + 1 \quad \text{و} \quad BC = b \quad \text{و} \quad AB = a$$

$$2\sqrt{7} + 2 < 2a < 6\sqrt{7} - 2 \quad \text{إذن} \quad \sqrt{7} + 1 < a < 3\sqrt{7} - 1 \quad (1)$$

$$2\sqrt{7} - 2 < 2b < 2\sqrt{7} + 2 \quad \text{إذن} \quad \sqrt{7} - 1 < b < \sqrt{7} + 1$$

$$4\sqrt{7} < 2(a + b) < 8\sqrt{7} \quad \text{إذن}$$

$$(2) \text{ حصر المساحة : } \sqrt{7} + 1 < a < 3\sqrt{7} - 1$$

$$* \quad \sqrt{7} - 1 < b < \sqrt{7} + 1$$

$$(\sqrt{7} + 1)(\sqrt{7} - 1) < ab < (3\sqrt{7} - 1)(\sqrt{7} + 1)$$

$$6 < ab < 20 + 2\sqrt{7} \quad \text{إذا} \quad 7 - 1 < ab < 3 \times 7 + 3\sqrt{7} - \sqrt{7} - 1$$

$$(3) \text{ حصر مساحة الجزء الملون و نرسم لها ب : } S_c \text{ حيث } S_c = ab - \frac{\pi}{4}b^2$$

$$\text{لدينا : } \sqrt{7} - 1 < b < \sqrt{7} + 1 \quad \text{و} \quad 6 < ab < 20 + 2\sqrt{7}$$

$$8 - 2\sqrt{7} < b^2 < 8 + 2\sqrt{7} \quad \text{يعني} \quad (\sqrt{7} - 1)^2 < b^2 < (\sqrt{7} + 1)^2$$

$$\pi(2 - \frac{\sqrt{7}}{2}) < \frac{\pi}{4}b^2 < \pi(2 + \frac{\sqrt{7}}{2}) \quad \text{يعني} \quad \frac{\pi}{4}(8 - 2\sqrt{7}) < \frac{\pi}{4}b^2 < \frac{\pi}{4}(8 + 2\sqrt{7})$$

$$\text{إذن : } -\pi(2 + \frac{\sqrt{7}}{2}) < -\frac{\pi}{4}b^2 < -\pi(2 - \frac{\sqrt{7}}{2})$$

+

$$6 < ab < 20 + 2\sqrt{7}$$

$$\text{إذن : } 6 - \pi(2 + \frac{\sqrt{7}}{2}) < ab - \frac{\pi}{4}b^2 < 20 + 2\sqrt{7} - \pi(2 - \frac{\sqrt{7}}{2})$$

$$\text{يعني : } 6 - \pi(2 + \frac{\sqrt{7}}{2}) < S_c < 20 + 2\sqrt{7} - \pi(2 - \frac{\sqrt{7}}{2})$$

التمرين (15):

a عدد حقيقي حيث $-\frac{1}{2} < 2a - 1 < \sqrt{2}$

$$-\frac{1}{2} < 2a < \sqrt{2} + 1 \text{ يعني } -\frac{1}{2} + 1 < 2a - 1 + 1 < \sqrt{2} + 1 \text{ إذا } -\frac{1}{2} < 2a - 1 < \sqrt{2} - 1$$

$$\text{و } \frac{1}{4} < a < \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

$$\text{حصر } a^2 : \frac{1}{4} < a < \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \text{ إذا } \frac{1}{16} < a^2 < \frac{3 + 2\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{حصر } a^2 - 10 : \frac{1}{16} - 10 < a^2 - 10 < \frac{3 + 2\sqrt{2}}{4} - 10 : \frac{-159}{16} < a^2 - 10 < \frac{-37 + 2\sqrt{2}}{4} \text{ إذا}$$

$$\text{ب- حصر } |a - 2| : \frac{1}{4} - 2 < a - 2 < \frac{1 + \sqrt{2}}{2} - 2 : \frac{-7}{4} < a - 2 < \frac{-3 + \sqrt{2}}{2} \text{ يعني}$$

$$a - 2 \text{ سالب إذا } \frac{7}{4} > |a - 2| > \frac{3 - \sqrt{2}}{2}$$

$$\text{حصر } \sqrt{3}|a + 1| : \frac{1}{4} + 1 < a + 1 < \frac{1 + \sqrt{2}}{2} + 1 : \frac{5}{4} < a + 1 < \frac{3 + \sqrt{2}}{2} \text{ يعني}$$

$$\text{إذا } \frac{5}{4} < |a + 1| < \frac{3 + \sqrt{2}}{2} \text{ و } a + 1 \text{ موجب و } \frac{\sqrt{35}}{4} < \sqrt{3}|a + 1| < \frac{3\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2} \text{ إذا}$$

التمرين (16):

x و y و z أعداد حقيقية حيث $1 \leq x \leq 2$ و $\sqrt{2} \leq y \leq 3$ و $-3 \leq z \leq -2$

(1) مدى حصر y هو: $3 - \sqrt{2}$

مدى حصر z هو: $1 = -2 + 3 = -3 - (-2)$

(2) حصر $x + y$: بجمع طرفي الحصر نتحصل على: $\sqrt{2} + 1 \leq x + y \leq 2 + 3$ أي $\sqrt{2} + 1 \leq x + y \leq 5$

حصر xy : بضرب طرفي الحصر نتحصل على: $\sqrt{2} \times 1 \leq xy \leq 2 \times 3$ أي $\sqrt{2} \leq xy \leq 6$

حصر xz : بضرب طرفي الحصر نتحصل على: $-3 \geq xz \geq -4$

حصر $-2x + 5$: لدينا $1 \leq x \leq 2$ إذا $-4 \leq -2x \leq -2$ ونضيف 5 الى كل عناصر الحصر:

$$1 \leq -2x + 5 \leq 3$$

حصر $y^2 - 1$: لدينا $\sqrt{2} \leq y \leq 3$ إذا $2 \leq y^2 \leq 9$ وبالتالي $1 \leq y^2 - 1 \leq 8$

(3) ونستنتج أن:

أ. حصر $x(y + z)$: $\sqrt{2} - 3 \leq y + z \leq 1$ إذا $\sqrt{2} - 3 \leq x(y + z) \leq 2$

$$\sqrt{2} - 6 \leq x(y + z) \leq 4$$

$$\text{ب. حصر } \frac{y^2 - 1}{-2x + 5} : \text{لدينا } 1 \leq -2x + 5 \leq 3 \text{ إذا } \frac{1}{3} \leq \frac{y^2 - 1}{-2x + 5} \leq 1$$

$$\text{وبالتالي } : \frac{1}{3} \leq \frac{y^2 - 1}{-2x + 5} \leq 8$$

حصر $x + z$: $-2 \leq x + z \leq 0$ إذا $x + z$ سالب وبالتالي: $0 \leq (x + z)^2 \leq 4$

التمرين (17):

$$1 + \frac{1}{3 \times 10^{-5}} - \left(1 - \frac{5}{2 \times 10^{-5}}\right) = \frac{1}{3 \times 10^{-5}} + \frac{5}{2 \times 10^{-5}} \geq 0$$

أ- باستعمال الفرق : $1 + \frac{1}{3 \times 10^{-5}} \geq 1 - \frac{5}{2 \times 10^{-5}}$ إذا

ب- تصاعديا : بما أن $2 + 10^{-8} > 1$ إذا $2 + 10^{-8} > \sqrt{2 + 10^{-8}}$

ج- تنازليا : بما أن $1 - 10^{-20} > 1$ إذا $1 - 10^{-20} < \sqrt{1 - 10^{-20}}$

التمرين (18):

باستعمال الآلة الحاسبة قارن العددين A و B في كل حالة من الحالات التالية :

أ- $B = \frac{(5.3 \times 10^{-3})^3}{5} = 2.97 \times 10^{-8} > A = \frac{(3.2 \times 10^{-4})^2}{7} = 1.46 \times 10^{-8}$

ب- $B = \frac{(11 \times 10^{-3})^3}{8} = 16.63 \times 10^{-8} < A = \frac{(6.8 \times 10^{-2})^4}{21} = 1.018 \times 10^{-6}$

التمرين (19):

(1) نوجد المقامات ونحصل على : $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)}$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5} ; \frac{1}{12} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} ; \frac{1}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} ; \frac{1}{2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$$

(2) ليكن a و b عددين حقيقيين حيث $a = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{2006 \times 2007}$ و

$$b = \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \dots + \frac{1}{2007 \times 2008}$$

طريقة أولى :

$$a - b = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} \dots + \frac{1}{2006 \times 2007} - \frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5} \dots - \frac{1}{2007 \times 2008}$$

$$a > b \text{ إذا } a - b = \frac{1}{2 \times 2007 \times 2008} > 0$$

طريقة ثانية : نقارن كل عنصر من a بعنصر من b : $\frac{1}{2 \times 3} > \frac{1}{3 \times 4}$ و $\frac{1}{1 \times 2} > \frac{1}{2 \times 3}$ و ...

$$\frac{1}{2006 \times 2007} > \frac{1}{2007 \times 2008}$$

التمرين (20):

(1) نعتبر العددين الحقيقيين a و b حيث $a \geq b$ إذا $(b-a) \leq 0$

مقارنة $3a+8b$ و $8a+3b$ باستعمال الفرق نحصل على :

$$3a+8b \leq 8a+3b \text{ إذا } 3a+8b-8a-3b = -5a+5b = 5(b-a) \leq 0$$

مقارنة $-3b+2$ و $-3a+\sqrt{2}$:

$$-3b+2 - (-3a+\sqrt{2}) = -3b+2+3a-\sqrt{2} = 3(a-b) + 2-\sqrt{2} \geq 0$$

(لأن $2-\sqrt{2} \geq 0$ و $a-b \geq 0$) وبالتالي : $-3b+2 \geq -3a+\sqrt{2}$

(2) نعتبر العددين x و y حيث $x = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$ و $y = 2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}$

أ. بما لأن : $(3\sqrt{2})^2 = 18$ و $(2\sqrt{5})^2 = 20$ إذا $2\sqrt{5} \geq 3\sqrt{2}$

و بالتالي $2\sqrt{5} - 3\sqrt{2} \geq 0$ يعني y عدد موجب

ب. نلاحظ أن : $y < x$ إذا $\frac{1}{y} > \frac{1}{x}$

الجزءات المعتبرة

درس عدد 6

تمرين 1

a و b عدنان حقيقيان حيث $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $b = \frac{1}{2}$

$$a^2 + b^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \quad . \text{أ}$$

$$(a + b)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad . \text{ب}$$

$$(a - b)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \quad . \text{ج}$$

تمرين 2

$$a = (\sqrt{2} + 3)^2 = \sqrt{2}^2 + 3^2 + 2 \sqrt{2} \times 3 = 2 + 9 + 6 \sqrt{2} = 11 + 6 \sqrt{2}$$

$$b = (\sqrt{3} - 2)^2 = \sqrt{3}^2 + 2^2 - 2 \sqrt{3} \times 2 = 3 + 4 - 4 \sqrt{3} = 7 - 4 \sqrt{3}$$

$$c = (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = \sqrt{3}^2 + \sqrt{5}^2 + 2 \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 3 + 5 + 2 \sqrt{15} = 8 + 2 \sqrt{15}$$

$$d = (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = \sqrt{3}^2 - \sqrt{3} \times \sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{2} - \sqrt{2}^2 = 3 - 2 = 1$$

$$e = (2\sqrt{7} + 1)^2 = 4\sqrt{7}^2 + 1 + 2 \times 2 \sqrt{7} \times 1 = 28 + 1 + 4 \sqrt{7} = 29 + 4 \sqrt{7}$$

$$f = (2\sqrt{3} - 1)(2\sqrt{3} + 1) = 4\sqrt{3}^2 - 1 = 12 - 1 = 11$$

$$g = (\pi + 4)^2 - (\pi - 4)^2 = (\pi + 4 + \pi - 4)(\pi + 4 - \pi + 4) = 2\pi \times 8 = 16\pi$$

تمرين 3

ليكن x عددا حقيقيا :

$$(2 - x\sqrt{3})^2 = 4 + 3x^2 - 4x\sqrt{3}$$

$$(3x - 1)(3x + 1) = 9x^2 - 1$$

$$(\sqrt{2}x - 3)(\sqrt{2}x + 3) = 2x^2 - 9$$

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4 + 4x$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 + 1 - 4x$$

$$(\sqrt{2}x + 3)^2 = 2x^2 + 9 + 6\sqrt{2}x$$

تمرين 4

$$P = (x + 1)^2 - (x - 1)^2 = x^2 + 1 + 2x - x^2 - 1 + 2x = 4x \quad (أ)$$

$$Q = (x + 5)^2 - (x - 5)^2 = x^2 + 25 + 10x - x^2 - 25 + 10x = 20x$$

$$12345^2 - 12343^2 = 4 \times 12344 \quad \text{لأن} \quad a = \frac{12345^2 - 12343^2}{12344} = 4$$

$$389452^2 - 389442^2 = 20 \times 398447 \quad \text{لأن} \quad b = \frac{389452^2 - 389442^2}{389447} = 20 \quad \text{و}$$

تمرين 5

$$(\sqrt{3} + 2)^2 = 3 + 4 + 2 \times 2\sqrt{3} = 7 + 4\sqrt{3} \quad (أ)$$

$$(\sqrt{7} - 1)^2 = 7 + 1 - 2\sqrt{7} = 8 - 2\sqrt{7}$$

$$A = \frac{(\sqrt{3}-2)(7+4\sqrt{3})}{\sqrt{3}+2} = \frac{7\sqrt{3}+12-14-8\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2} = \frac{-2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}+2} = -1 \quad (ب)$$

$$B = \frac{2(\sqrt{7}+1)(4-\sqrt{7})}{\sqrt{7}-1} = \frac{8\sqrt{7}-14+8-2\sqrt{7}}{\sqrt{7}-1} = \frac{6\sqrt{7}-6}{\sqrt{7}-1} = 6$$

تمرين 6

$$\frac{9}{4}u^2 - 3u + 1 = \left(\frac{3}{2}u - 1\right)^2 \quad ; \quad 25t^2 + 20t + 4 = (5t + 2)^2$$

$$4y^2 + 2y + \frac{1}{4} = \left(2y + \frac{1}{2}\right)^2 \quad ; \quad \frac{1}{81} - \frac{1}{25}x^2 = \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{5}x\right)\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{5}x\right)$$

$$y^2 - 7 = (y + \sqrt{7})(y - \sqrt{7}) \quad ; \quad 2t^2 + 2\sqrt{6}t + 3 = (\sqrt{2}t + \sqrt{3})^2$$

$$x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2 \quad ; \quad 64u^2 - 36 = (8u + 6)(8u - 6)$$

تمرين 7

$$P + Q = -5x + 3 + 3x^2 - x + 5 = 3x^2 - 6x + 8$$

$$P + Q = -2x^2 + x - 7 - x^2 - 7x + 2 = -3x^2 - 6x - 5$$

$$P + Q = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x + 1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{9}{2}x + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}x^2 - \frac{15}{4}x + \frac{7}{6}$$

$$P + Q = -\frac{1}{5}x^2 + x - 2 + x^2 + \frac{3}{10}x - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{5}x^2 + \frac{13}{10}x - 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

تمرين 8

$$5(x - 3) + 2(x + 3) = 5x - 15 + 2x + 6 = 7x - 9$$

$$x(1 - 2x) + (x^2 - 1) = x - 2x^2 + x^2 - 1 = -x^2 + x - 1$$

$$\frac{1}{2}x(3 - 4x) - x\left(\frac{5}{2} - x\right) = \frac{3}{2}x - 2x^2 - \frac{5}{2}x + x^2 = x^2 - 2x + \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{2}\right)x = x^2 - 3x$$

$$\begin{aligned} x(x + \sqrt{2} + \sqrt{3}) - \sqrt{2}(2x + 3) &= x^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{3}x - 2\sqrt{2}x - 3\sqrt{2} \\ &= x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{3}x - 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{2}x(x + 3) - \sqrt{2}(x^2 + x - 1) &= \sqrt{2}x^2 + 3\sqrt{2}x - \sqrt{2}x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2}x + \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$(x - 1)^2 + (x + 1)^2 + x^2 - 2 = x^2 - 2x + 1 + x^2 + 2x + 1 + x^2 - 2 = 3x^2$$

تمرين 9

$$\text{إذن } x = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{أ})$$

$$Q = 3x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\sqrt{2}\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 = \frac{3}{2} - 2 + 1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$R = -x^2 - 2\sqrt{2}x + 3 = -\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\sqrt{2}\frac{1}{\sqrt{2}} + 3 = -\frac{1}{2} - 2 + 3 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$R = Q = \frac{1}{2} \quad \text{إذن}$$

$$P^2 = (\sqrt{2}x - 2)^2 = 2x^2 - 4\sqrt{2}x + 4 \quad (\text{ب})$$

$$R + Q = -x^2 - 2\sqrt{2}x + 3 + 3x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 2x^2 - 2\sqrt{2}x + 4$$

$$R + Q = P^2 \quad \text{إذن}$$

تمرين 10

$$P = (3x - 1)^2 + 9x^2 - 1 \quad (\text{أ})$$

$$P = (3x - 1)^2 + 9x^2 - 1 = \left(3\frac{1}{3} - 1\right)^2 + 9\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = 0 + 1 - 1 = 0 \quad \text{إذن } x = \frac{1}{3}$$

$$\text{إذن } x = \frac{2}{3}$$

$$P = (3x - 1)^2 + 9x^2 - 1 = \left(3\frac{2}{3} - 1\right)^2 + 9\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 1 = (2 - 1)^2 + 9\frac{4}{9} - 1 = 4$$

$$\text{إذن } x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$P = (3x - 1)^2 + 9x^2 - 1 = \left(3\frac{1}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 + 9\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - 1$$

$$= \left(\frac{3}{\sqrt{3}} - 1\right)^2 + 9\frac{1}{3} - 1 = \frac{9}{3} + 1 - 2\frac{3}{\sqrt{3}} + 3 - 1 = 6 - 2\frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$\text{إذن } (3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1 \quad (\text{ب})$$

$$P = (3x - 1)^2 + 9x^2 - 1 = 9x^2 - 6x + 1 + 9x^2 - 1 = 18x^2 - 6x$$

$$P = (3x - 1)^2 + 9x^2 - 1 = (3x - 1)^2 + (3x + 1)(3x - 1) \quad (\text{ج})$$

$$P = (3x - 1)(3x - 1 + 3x + 1) = 6x(3x - 1)$$

تمرين 11

$$(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}^2 - 1 = 2 - 1 = 1 \quad (أ)$$

$$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3}^2 - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5}) = (2\sqrt{3})^2 - \sqrt{5}^2 = 4 \times 3 - 5 = 7$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{1} = 2 - \sqrt{2} \quad (ب)$$

$$\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = \frac{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2} = \frac{4+2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(2\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(2\sqrt{3}+\sqrt{5})(2\sqrt{3}-\sqrt{5})} = \frac{2\sqrt{15}-5+6-\sqrt{15}}{12-5} = \frac{\sqrt{15}+1}{7}$$

تمرين 12**طريقة 1**

$$\begin{aligned} ((a + b) + c)^2 &= (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 = a^2 + b^2 + 2ab + 2ac + 2bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc \end{aligned}$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

: **طريقة 2****تمرين 13**

$$P = (2x - 1)^2 - 4x^2 = 4x^2 - 2x + 1 - 4x^2 = -2x + 1 \quad (أ)$$

$$Q = (2x - 1)^2 - x + 1 = 4x^2 - 2x + 1 - x + 1 = 4x^2 - 3x + 2$$

$$: \text{إذن } x = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \quad (ب)$$

$$P = (2x - 1)^2 - 4x^2 = -2x + 1 = -2 \frac{\sqrt{2}-1}{2} + 1 = -\sqrt{2} + 2$$

$$Q = (2x - 1)^2 - x + 1 = 4x^2 - 3x + 2 = 4 \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2} \right)^2 - 3 \frac{\sqrt{2}-1}{2} + 2$$

$$= (\sqrt{2} - 1)^2 - \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2} + 2 = 2 + 1 - 2\sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{7}{2} = 3 + \frac{7}{2} - \frac{4\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{13}{2} - \frac{7\sqrt{2}}{2}$$

$$P+Q = -2x + 1 + 4x^2 - 3x + 2 = 4x^2 - 5x + 3 \quad (ج)$$

$$P-Q = (2x - 1)^2 - 4x^2 - (2x - 1)^2 - x + 1 = -4x^2 - x + 1$$

$$: \text{إذن } x = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \quad (د)$$

$$P+Q = -\sqrt{2} + 2 + \frac{13}{2} - \frac{7\sqrt{2}}{2} = \frac{17}{2} - \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

طريقة 1

$$P+Q = 4 \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2} \right)^2 - 5 \frac{\sqrt{2}-1}{2} + 3 = (\sqrt{2} - 1)^2 - \frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{5}{2} + 3$$

طريقة 2

$$= 3 - 2\sqrt{2} - \frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{5}{2} + 3 = \frac{17}{2} - \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

تمرين 14

(أ) عدد صحيح طبيعي غير قابل للقسمة على 3 يعني : باقي قسمة a على 3 هو 1 أو 2 إذن :

$$a = 3k + 1 \text{ أو } a = 3k + 2 \text{ حيث } k \text{ عدد صحيح طبيعي}$$

$$a = 3k + 1 \text{ إذن } a^2 = (3k + 1)^2 = 9k^2 + 6k + 1 \text{ إذن باقي قسمة } a^2 \text{ على 3 هو 1}$$

$$a = 3k + 2 \text{ إذن } a^2 = (3k + 2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 \text{ إذن باقي قسمة } a^2 \text{ على 3 هو 1}$$

(ب) a و b و c ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية غير قابلة للقسمة على 3

بما أن باقي قسمة a^2 على 3 هو 1 و باقي قسمة b^2 على 3 هو 1 و باقي قسمة c^2 على 3 هو 1

إذا باقي قسمة $a^2 + b^2 + c^2$ على 3 هو $3 = 1+1+1$ يعني أن العدد الطبيعي $a^2 + b^2 + c^2$ قابل للقسمة على 3

تمرين 15

$$P \times Q = \left(x - \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) \left(x + \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right) = x^2 + x \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right) - x \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right) \quad (أ)$$

$$= x^2 + x \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right) - x \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right) + \frac{x}{2} + \frac{x}{2} - \frac{1}{4} (\sqrt{5}^2 - 1) = x^2 + x - 1$$

$$\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (\sqrt{5} + 1)^2 = \frac{1}{4} (\sqrt{5}^2 + 1 + 2\sqrt{5}) = \frac{1}{4} (6 + 2\sqrt{5}) \quad (ب)$$

$$x^2 = \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} (\sqrt{5}^2 + 1 + 2\sqrt{5}) = \frac{1}{4} (6 + 2\sqrt{5}) = \frac{\sqrt{5}+3}{2} \quad (ج) \text{ بما أن :}$$

إذا كان : $x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ فإن:

$$R = \sqrt{x+1} - x = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2} + 1} - \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+3}{2}} - \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^2} - \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}+1}{2} - \frac{\sqrt{5}+1}{2} = 0$$

تمرين 16

$$X = \left(t - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = t^2 - \sqrt{3}t + \frac{3}{4} \quad (أ)$$

$$Y = t^2 - \sqrt{3}t + 1 = \left(t^2 - \sqrt{3}t + \frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} = \left(t - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} = X + \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$Y \geq \frac{1}{4} \text{ يعني } \left(t - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} \text{ إذن } \left(t - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \geq 0$$

$$X = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \left(\frac{-1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \quad (ج) \text{ إذن } t = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$Y = X + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

مسائلمسألة 1

$$S_1 = x^2 \quad (أ)$$

$$S_1 = (x-1)^2 + 1 + EF \times y = (x-1)^2 + 1 + \sqrt{2} \times y = x^2 - 2x + 1 + 1 + \sqrt{2} \times y$$

$$S_1 = x^2 - 2x + 2 + \sqrt{2} y \quad (ب)$$

إذن: $x^2 = x^2 - 2x + 2 + \sqrt{2} y$ إذن $2x - 2 = \sqrt{2} y$ وبالتالي:

$$y = \frac{2-x}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(x-1)$$

$$S_2 = EF \times y = \sqrt{2} y = \sqrt{2} \sqrt{2} (x-1) = 2(x-1) \quad (ب)$$

$$\frac{S_1}{2} - S_2 = \frac{x^2}{2} - 2(x-1) = \frac{x^2}{2} - 2x + 2 = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 4) = \frac{1}{2}(x-2)^2$$

(ج) مساحة المستطيل EFGH تساوي نصف مساحة المربع ABCD إذا: $\frac{S_1}{2} = S_2$

$$يعني $\frac{S_1}{2} - S_2 = 0$ يعني $\frac{1}{2}(x-2)^2 = 0$ يعني $x-2 = 0$ يعني $x = 2$$$

مسألة 2

$$S_1 = \frac{5(10-x)}{2} \quad (أ) \text{ مساحة المثلث IAM ونرمز لها ب: } S_1 \text{ إذن}$$

$$S_2 = \frac{x(10-x)}{2} \quad (ب) \text{ مساحة المثلث MBN ونرمز لها ب: } S_2 \text{ إذن}$$

$$S_3 = \frac{10(5+x)}{2} \quad (ج) \text{ مساحة شبه المنحرف INCD ونرمز لها ب: } S_3 \text{ إذن}$$

$$S_4 = 100 - S_1 - S_2 - S_3 \quad (د) \text{ مساحة المثلث IMN ونرمز لها ب: } S_4 \text{ إذن}$$

$$S_4 = 100 - \frac{5(10-x)}{2} - \frac{x(10-x)}{2} - \frac{10(5+x)}{2} = 100 - \frac{50-5x+10x-x^2+50+10x}{2} \text{ يعني}$$

$$= 100 - \frac{100-x^2+15x}{2} = \frac{100+x^2-15x}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \left[\left(x - \frac{15}{2}\right)^2 + \frac{175}{4} \right] = \frac{x^2}{2} - \frac{15x}{2} + \frac{225}{8} + \frac{175}{8} = \frac{100+x^2-15x}{2}$$

$$25 \leq S \leq 50 \quad \text{و} \quad S = S_4 \text{ إذن}$$

مسألة 3

(1) نعم يستجيب مكعب قيس طول ضلعه 10cm لشروط الشركة لأن حجمه يساوي: $V = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \ell$

(2) - (أ) نذكر أن المساحة الجملية لاسطوانة دائرية قائمة هي مجموع المساحة الجانبية ومساحة قاعدتيها

محيط القاعدة: $2\pi x = 2\pi x$ إذن المساحة الجانبية ونرمز لها ب: $S_1 = 2\pi x \times 10 = 20\pi x$

مساحة القاعدتين ونرمز لها ب: $S_2 = 2 \times \pi x^2 = 2\pi x^2$ حيث:

المساحة الجملية ونرمز لها ب: $S = 20\pi x + 2\pi x^2 \text{ cm}^2$ حيث:

(ب) حجم الاسطوانة و نرمز له بـ: V' إذن $V' = 10 \times \pi x^2 = 10 \pi x^2$

وبالتالي: $V - V' = 1000 - 10 \pi x^2 \text{ cm}^3$

(ج) $V - V' = 1000 - 10 \pi x^2 \text{ cm}^3 = 10(100 - \pi x^2) \text{ cm}^3$

إذن $10^3 - 10 \pi x^2 = 0$ يعني $10^2 - \pi x^2 = 0$ إذن $x = \frac{10}{\sqrt{\pi}} \approx 1,77 \text{ cm}$

وبما أن $S = 20\pi x + 2\pi x^2 \text{ cm}^2$ إذن

$$S \approx 20 \times 3,14 \times 1,77 + 2 \times 3,14 \times 1,77^2 \text{ cm}^2$$

$$S \approx 307,90 + 19,67 \approx 327,56 \text{ cm}^2$$

(3) الخيار الأقل تكلفة بالنسبة للشركة هو اختيار الاسطوانة لأنه أقل مساحة.

مسألة 4

(أ) مساحة الأرض المخصصة للرعي (التي يمكن أن تطولها البقرة) هي: $S = \pi x^2$

(ب) و المساحة المتبقية هي: $S' = \pi 50^2 - \pi x^2 = \pi (50^2 - x^2) = \pi (50 - x)(50 + x)$

(ج) إذا أراد الفلاح أن ترعى البقرة 50% من العشب الموجود يجب أن يحقق x المساواة التالية:

$$x = \frac{50}{\sqrt{2}} \text{ يعني } x^2 = \frac{50^2}{2} \text{ على } \pi \text{ نحصل على } \pi x^2 = \frac{50^2 \pi}{2}$$

مسألة 5

(1) نرمز بـ: V إلى حجم الجسم (S) إذن $V =$ -

(2) (أ) حجم الجسم (1) هي: $V_1 =$ (-)

حجم الجسم (2) هي: $V_2 = y($ -)

حجم الجسم (3) هي: $V_3 =$ (-)

وبما أن: $V = V_1 + V_2 + V_3$ فإن:

(ب) $V =$ - = (-) + $y($ -) + (-)

يعني: - = (-) (+ y +)

(ج) $P =$ - 1 = (- 1) (+ + 1)

$Q = 8$ - 27 = (2 - = (2 - 3) (4 + 6 + 9)

إصلاح التمارين

تمرين (1)

$$x = \frac{-5}{4} \text{ يعني } -2x = \frac{5}{2} \text{ يعني } x - 3x = 1 + \frac{3}{2} \text{ يعني } x - 1 = 3x + \frac{3}{2}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{-5}{4} \right\} \text{ و بالتالي :}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{7}{2} \text{ يعني } x - \frac{x}{2} = 2 + \frac{3}{2} \text{ يعني } 2 - \frac{x}{2} - \frac{3}{2} = 4 - x \text{ يعني } 2 - \frac{1}{2}(x + 3) = 4 - x$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{7}{4} \right\} \text{ و بالتالي : } x = \frac{7}{4}$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ يعني } \frac{2x}{3} = \sqrt{3} \text{ يعني } \frac{x}{3} - x = -\sqrt{3} \text{ يعني } \frac{x}{3} + \sqrt{3} = x$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{3\sqrt{3}}{2} \right\} \text{ و بالتالي :}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{ \} = \emptyset \text{ إذن ممكن } 1 = \frac{1}{2} \text{ يعني } x + 1 = x + \frac{1}{2} \text{ يعني } \frac{x+1}{3} = \frac{x+\frac{1}{2}}{3}$$

تمرين (2)

نرمز بـ: n إلى عدد الحافلات الكبيرة إذن عدد الحافلات الصغيرة هو $n + 2$ و بما أن كل المقاعد تصبح غير شاغرة فإن : $75n + 150 + 95n = 830$ يعني $75(n + 2) + 95n = 830$
 إذن $170n = 680$

وبالتالي $n = \frac{680}{170} = 4$ يعني عدد الحافلات الكبيرة هو 4 و عدد الحافلات الصغيرة هو 6

تمرين (3)

خطأ	$x = \frac{3}{2} \text{ يعني } x + 1 = -\frac{1}{2}$
صحيح	$2x + 3 = \frac{x}{3} \text{ يعني } x = -\frac{9}{5}$
خطأ	$4x + \sqrt{2} = 4x - \sqrt{2} \text{ يعني } x = 0$
صحيح	$-\frac{x}{5} + 1 = 1 - \frac{x}{5} \text{ يعني } x = 1$

تمرين (4)

نبدأ بتحويل المسألة إلى معادلة حيث نرمز بـ: n إلى عدد الأوراق من فئة 10 دنانير إذن :

$$10n + 20n - 100 + \frac{15}{2}n = 350 \text{ يعني } 10n + 20(n - 5) + 30 \frac{n}{4} = 350$$

$$n = \frac{450}{\frac{75}{2}} = \frac{900}{75} = 12 \text{ و بالتالي : } \frac{75}{2}n = 450$$

إذن عدد الأوراق من فئة 10 دنانير هو 12 و عدد الأوراق من فئة 20 دينار هو 7 و عدد الأوراق من فئة 30 دينار هو 3

تمرين (5)

نبدأ بتحويل المسألة إلى معادلة حيث نرمز بـ: n إلى عدد القطيع إذن :

$$9 = \frac{16n}{16} - \frac{13n}{16} \text{ يعني } \frac{13n}{16} + 9 = \frac{16n}{16} \text{ يعني } \frac{13n}{16} + 9 = n \text{ إذا } \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{16} + 9 = n$$

$$48 \text{ يعني } 9 = \frac{3n}{16} \text{ يعني } 3n = 9 \times 16 \text{ يعني } n = 3 \times 16 = 48 \text{ يعني عدد القطيع هو } 48$$

تمرين (6):

نحول المسألة إلى معادلة حيث نرسم بـ: k إلى هذا العدد : إذن : $\frac{3+k}{5+k} = \sqrt{2}$

$$يعني 3 + k = 5\sqrt{2} + \sqrt{2}k : إذن 3 + k = (5 + k)\sqrt{2}$$

$$يعني k = \frac{3-5\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} : وبالتالي 3 - 5\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)k$$

تمرين (7):

$$S_{\mathbb{R}} = \{ \sqrt{3}, -\sqrt{3} \} يعني x = -\sqrt{3} أو x = \sqrt{3} يعني x^2 = 3 (أ)$$

$$ب) (4x + 1)^2 = 8x + 10 يعني 16x^2 + 8x + 1 = 8x + 10$$

$$يعني 16x^2 = 9 يعني x^2 = \frac{9}{16} يعني x = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4} أو x = -\sqrt{\frac{9}{16}} = -\frac{3}{4}$$

$$إذن : S_{\mathbb{R}} = \{ -\frac{3}{4}, \frac{3}{4} \}$$

$$ج) 5x^2 - 5 = 0 يعني 5x^2 = 5 يعني x^2 = \frac{5}{5} يعني x = \sqrt{\frac{5}{5}} أو x = -\sqrt{\frac{5}{5}}$$

$$إذن S_{\mathbb{R}} = \{ -\sqrt{\frac{5}{5}}, \sqrt{\frac{5}{5}} \}$$

$$د) 11x^2 + 2 = 0 يعني 11x^2 = -2 غير ممكن لأن 11x^2 موجب إذن S_{\mathbb{R}} = \{ \} = \emptyset$$

تمرين (8):

$ABCD$ متوازي أضلاع إذن كل ضلعين متقابلين متقايسان

$$إذن : 7(x - 5) = 4x + 25 يعني 7x - 35 = 4x + 25 يعني 3x = 60 يعني x = 20$$

$$و 8y + 1 = 7y + 6 يعني 8y - 7y = 6 - 1 يعني y = 5 إذن بعدا هذا المتوازي هما :$$

$$AD = 41 و AB = 105$$

تمرين (9):

$$* \frac{x-1}{2} - \frac{x+1}{3} = x إذن \frac{3(x-1)}{6} - \frac{2(x+1)}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$يعني 3x - 3 - 2x - 2 = 6x يعني 5x - 5 = 6x إذن x = -1$$

$$* \sqrt{2} = 2\sqrt{2}x يعني -\sqrt{2}x + 1 = 1 - \sqrt{2} + \sqrt{2}x$$

$$يعني \frac{3}{2}(\frac{2}{5}x - 1) = -\frac{2}{5}(x + \frac{1}{2}) يعني \frac{3}{5}x - \frac{3}{2} = -\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}$$

$$يعني x = \frac{2}{10} + \frac{15}{10} يعني x = \frac{17}{10}$$

$$* \frac{2x-1}{3} = \frac{1-2\sqrt{2}x}{3} إذن 2x - 1 = 1 - 2\sqrt{2}x$$

$$يعني x = \frac{2}{2\sqrt{2}+2} = \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$$

تمرين (10):

لتكون مساحتا الرباعيين $AMNP$ و $NQCR$ متساويتين يجب أن يحققا المساواة التالية ؛
حيث نرسم ب : n إلى البعد AM :

$$n^2 - 2\sqrt{2} + 2 = n(2\sqrt{2} + n) \text{ يعني } n^2 = (3\sqrt{2} - n)(\sqrt{2} - n)$$

$$n = \frac{6}{4\sqrt{2}} = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4} \text{ يعني } 6 = 4n\sqrt{2} \text{ يعني } n^2 = 6 - 3n\sqrt{2} - n\sqrt{2} + n^2$$

إذن لتكون مساحتا الرباعيين $AMNP$ و $NQCR$ متساويتين يجب أن يكون : $AM = \frac{3\sqrt{2}}{4}$

تمرين (11):

لتكون مساحة المثلث BMC أصغر أو تساوي نصف مساحة شبه المنحرف $ABCD$ يجب أن

$$\text{تحقق } x \text{ المتراجحة التالية : } \frac{(4+x) \times h}{4} \geq \frac{(x-2) \times h}{2} \text{ يعني } \frac{4+x}{2} \geq x - 2 \text{ يعني}$$

$$x \in [2, 8] \text{ يكون } 8 \geq x \text{ يعني } 4 + x \geq 2x - 4 \text{ يعني } 4 + x \geq 2(x - 2)$$

تمرين (12):

$$(2x + 3)^2 - 5^2 = 0 \text{ يعني } (2x + 3)^2 = 5^2 \text{ يعني } (2x + 3)^2 = 25 \quad *$$

$$(2x + 8)(2x - 2) = 0 : \text{ يعني } (2x + 3 + 5)(2x + 3 - 5) = 0$$

$$\text{يعني : } (2x + 8) = 0 \text{ أو } (2x - 2) = 0 \text{ يعني : } (x = -4) \text{ أو } (x = 1)$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{-4, 1\} \text{ إذن}$$

$$(3x - 1 + 2)(3x - 1 - 2) = 0 : \text{ يعني } (3x - 1)^2 - 4 = 0 \quad *$$

$$\text{يعني : } (3x + 1)(3x - 3) = 0 \text{ يعني : } 3x - 3 = 0 \text{ أو } 3x + 1 = 0$$

$$\text{يعني : } x = 1 \text{ أو } x = \frac{-1}{3} \text{ إذن } S_{\mathbb{R}} = \{\frac{-1}{3}, 1\}$$

$$(3x + 1)^2 - (2x - 5)^2 = 0 \text{ يعني } (3x + 1)^2 = (2x - 5)^2 \quad *$$

$$\text{يعني : } (3x + 1 + 2x - 5)(3x + 1 - 2x + 5) = 0$$

$$\text{يعني : } (5x - 4)(x + 6) = 0$$

$$\text{يعني : } x + 6 = 0 \text{ أو } 5x - 4 = 0 \text{ يعني : } (x = -6) \text{ أو } (x = \frac{4}{5})$$

$$\text{إذن } S_{\mathbb{R}} = \{-6, \frac{4}{5}\}$$

$$2x + 5 = 0 \text{ يعني } (2x + 5)^2 = 0 \text{ يعني } 4x^2 + 20x + 25 = 0 \quad *$$

$$\text{يعني : } x = \frac{-5}{2} \text{ إذن } S_{\mathbb{R}} = \{\frac{-5}{2}\}$$

تمرين (13):

لتكون مساحة شبه المنحرف مساوية لـ 135 cm^2 يجب أن تحقق y المساواة التالية :

$$\frac{y \times 5y}{2} = 135 \text{ cm}^2 \text{ إذن } 5y^2 = 270 \text{ يعني } 5y^2 = 270 \text{ يعني } y^2 = \frac{270}{5} = 54 = 9 \times 6$$

$$(\text{دون اعتبار } y = -3\sqrt{6} \text{ لأن البعد موجب}) y = 3\sqrt{6}$$

تمرين (14):

(1) نبدأ بتحويل هذه المعطيات إلى معادلة حيث نرمز بـ a_1 إلى نصيب الأول و بـ a_2 إلى نصيب الثاني و بـ a_3 إلى نصيب الثالث: إذن

$$a_1 = \frac{4}{3} a_2$$

$$a_3 = \frac{2}{5} a_1 + 5$$

$$a_3 = a_2 + 2$$

$$a_3 = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} a_2 + 5 = \frac{8}{15} a_2 + 5 \quad \text{إذن} \quad a_3 = \frac{2}{5} a_1 + 5 \quad \text{و} \quad a_1 = \frac{4}{3} a_2$$

$$3 = a_2 - \frac{8}{15} a_2 \quad \text{وبالتالي} \quad \frac{8}{15} a_2 + 5 = a_2 + 2 \quad \text{إذن} \quad a_3 = a_2 + 2$$

$$a_2 = 3 \times \frac{15}{7} = \frac{45}{7} \quad \text{يعني} \quad 3 = \frac{7}{15} a_2 \quad \text{يعني}$$

$$a_1 = \frac{60}{7} \quad \text{يعني} \quad a_1 = \frac{4}{3} a_2 = \frac{4}{3} \frac{45}{7} \quad \text{و}$$

$$a_3 = \frac{45}{7} + 2 = \frac{59}{7} \quad \text{يعني} \quad a_3 = a_2 + 2$$

$$S = \frac{60}{7} + \frac{45}{7} + \frac{59}{7} = \frac{164}{7} = 23,4 \quad \text{(2) المساحة الجمالية للأرض المقسمة بالهكتار هي :}$$

تمرين (15):

$$(x - 6)^2 - 9 = x^2 - 12x + 36 - 9 = x^2 - 12x + 27 \quad \text{(أ - (1)}$$

$$(x - 6)^2 - 9 = 0 \quad \text{يعني} \quad x^2 - 12x + 27 = 0 \quad \text{(ب) طريقة أولى :}$$

$$(x - 9)(x - 3) = 0 \quad \text{يعني} \quad (x - 6 - 3)(x - 6 + 3) = 0$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{9, 3\} \quad \text{إذن} \quad x = 9 \quad \text{أو} \quad x = 3 \quad \text{يعني} \quad (x - 9) = 0 \quad \text{أو} \quad (x - 3) = 0$$

$$\text{طريقة ثانية : } x^2 - 12x + 27 = 0 \quad \text{يعني} \quad (x - 6)^2 - 9 = 0 \quad \text{يعني} \quad (x - 6)^2 = 9$$

$$\text{إذن} \quad x - 6 = 3 \quad \text{أو} \quad x - 6 = -3 \quad \text{يعني} \quad x = 9 \quad \text{أو} \quad x = 3$$

$$(t - 2)(t + 6) = t^2 + 6t - 2t - 12 = t^2 + 4t - 12 \quad \text{(أ - (2)}$$

$$t - 2 = 0 \quad \text{أو} \quad t + 6 = 0 \quad \text{يعني} \quad (t - 2)(t + 6) = 0 \quad \text{يعني} \quad t^2 + 4t - 12 = 0 \quad \text{(ب)}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{-6, 2\} \quad \text{إذا} \quad t = 2 \quad \text{أو} \quad t = -6 \quad \text{يعني}$$

تمرين (16):

ليكون حجم متوازي المستطيلات مساويا لـ 555 cm^3 يجب أن تحقق a المساواة التالية :

$$a = \sqrt{37} \text{ cm} \quad \text{و بالتالي} \quad a^2 = 37 \text{ cm}^2 \quad \text{إذن} \quad 15a^2 = 555 \text{ cm}^3$$

تمرين (17):

$$(x + 1)(2x + 2 - 3x + 1) = 0 \quad \text{إذن} \quad 2(x + 1)^2 - (x + 1)(3x - 1) = 0 \quad \text{(أ -)}$$

$$(x + 1) = 0 \quad \text{أو} \quad (3 - x) = 0 \quad \text{يعني} \quad (x + 1)(3 - x) = 0$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{-1, 3\} \quad \text{إذن} \quad x = -1 \quad \text{أو} \quad 3 = x \quad \text{يعني}$$

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 2x^2 - 2 \quad \text{إذن} \quad (\sqrt{2}x - 1)^2 = 2(x^2 - 1) \quad \text{(ب)}$$

$$x = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4} \quad \text{يعني} \quad -2\sqrt{2}x = -3 \quad \text{يعني} \quad -2\sqrt{2}x + 1 = -2$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{3\sqrt{2}}{4} \right\} \quad \text{إذن}$$

$$(x - \sqrt{3})^2 - \left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \quad \text{يعني} \quad (x - \sqrt{3})^2 = \left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{(ج)}$$

$$(x - \sqrt{3} + 2x - \frac{1}{2})(x - \sqrt{3} - 2x + \frac{1}{2}) = 0 \quad \text{يعني}$$

$$\left(3x - \sqrt{3} - \frac{1}{2}\right)\left(-x - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\right) = 0 \quad \text{يعني}$$

$$x = -\sqrt{3} + \frac{1}{2} \quad \text{أو} \quad 3x = \sqrt{3} + \frac{1}{2} \quad \text{يعني}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ -\sqrt{3} + \frac{1}{2}, \frac{2\sqrt{3}+1}{6} \right\} \quad \text{إذن} \quad x = -\sqrt{3} + \frac{1}{2} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\sqrt{3}+1}{3} = \frac{2\sqrt{3}+1}{6} \quad \text{يعني}$$

$$\sqrt{x} + 1 = 0 \quad \text{إذن} \quad (\sqrt{x} + 1)^2 = 0 \quad \text{يعني} \quad x + 2\sqrt{x} + 1 = 0 \quad \text{(د)}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{ \} \quad \text{يعني} \quad \sqrt{x} = -1 \quad \text{غير ممكن لأن الجذر التربيعي يكون موجبا إذن}$$

$$\sqrt{x-1}^2 - 4\sqrt{x-1} + 4 = 0 \quad \text{إذن} \quad (x-1) - 4\sqrt{x-1} = -4 \quad \text{(ه)}$$

$$\sqrt{x-1} = 2 \quad \text{يعني} \quad \sqrt{x-1} - 2 = 0 \quad \text{إذن} \quad (\sqrt{x-1} - 2)^2 = 0$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{5\} \quad \text{إذن} \quad x = 5 \quad \text{يعني} \quad x - 1 = 4$$

تمرين (18):

$$S_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}_- \quad \text{إذن} \quad x \leq 0 \quad \text{يعني} \quad x \leq 1 - 1: \quad \text{إذن} \quad 2x - 1 \leq x - 1: \quad \text{إذن} \quad 2\left(x - \frac{1}{2}\right) \leq x - 1$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left] \frac{8}{3}, \infty \right] \quad \text{يعني} \quad x > \frac{8}{3} \quad \text{إذن} \quad x > 3 - \frac{1}{3} \quad \text{إذن} \quad 2x - 3 > x - \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{R} \quad \text{وهي علاقة صحيحة مهما يكن العدد} \quad x \quad \text{في} \quad \mathbb{R} \quad \sqrt{2} < \sqrt{3} \quad \text{إذن} \quad 4x + \sqrt{2} < \sqrt{3} + 4x$$

$$S_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \quad \text{إذن}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{ \} \quad \text{إذن} \quad 1 \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \quad \text{وهي علاقة مستحيلة} \quad \text{إذن} \quad -\frac{x}{2} + 1 \leq \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{x}{2}$$

تمرين (19):

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 1 = x^2 - x + \frac{1}{4} - 1 = x^2 - x - \frac{3}{4} \quad \text{(أ)}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \quad \text{يعني} \quad \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 1 = -1 \quad \text{يعني} \quad x^2 - x - \frac{3}{4} = -1 \quad * \quad \text{(ب)}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ \frac{1}{2} \right\} \quad \text{إذن} \quad x = \frac{1}{2} \quad \text{يعني} \quad x - \frac{1}{2} = 0$$

$$(x - \frac{1}{2} + 1)(x - \frac{1}{2} - 1) = 0 \text{ يعني } (x - \frac{1}{2})^2 - 1 = 0 \text{ يعني } x^2 - x - \frac{3}{4} = 0 \text{ **}$$

$$x + \frac{1}{2} = 0 \text{ أو } x - \frac{3}{2} = 0 \text{ يعني } (x + \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2}) = 0 \text{ يعني}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{ -\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \} \text{ : إذن } x = -\frac{1}{2} \text{ أو } x = \frac{3}{2} \text{ يعني}$$

$$(x - \frac{1}{2})^2 - 1 = (x - \frac{1}{2})^2 \text{ يعني } x^2 - x - \frac{3}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 \text{ ***}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{ \} \text{ : إذن } -1 = 0 \text{ غير ممكن مهما يكن } x \text{ في } \mathbb{R}$$

تمرين (20):

(1) حسب نظرية بيتاغور في المثلث JIA القائم في A ، لدينا : $IJ^2 = AJ^2 + 3^2$

$$IJ^2 = x^2 - 6x + 18 \text{ : إذن } IJ^2 = x^2 + 3^2 - 6x + 3^2 \text{ : إذن } IJ^2 = (x - 3)^2 + 3^2$$

$$IJ = \sqrt{x^2 - 6x + 18}$$

(2) لتكون مساحة الرباعي IJKL تفوق $25cm^2$ يجب أن يحقق x المتراجحة التالية :

$$(x - 3)^2 > 4^2 \text{ يعني } x^2 - 6x + 9 > 16 \text{ يعني } x^2 - 6x + 18 > 25 \text{ cm}^2$$

$$x - 3 > 4 \text{ يعني } x > 7 \text{ يعني } x \in]7, \infty]$$

تمرين (21):

طريقة أولى

$$S = (200 - x) \times (\frac{2}{5} \times 200 - x) = (200 - x) \times (80 - x) = 16000 - 200x - 80x + x^2$$

$$S = 16000 - 280x + x^2$$

طريقة ثانية

$$S = 200 \times (\frac{2}{5} \times 200) - (200 \times x) - x(80 - x) = 16000 - 200x - 80x + x^2$$

$$S = 16000 - 280x + x^2$$

تمرين (22)

نبدأ بتحويل هذه المعطيات إلى معادلة حيث نرمز بـ y إلى ثمن اللتر الواحد من الحليب

و بـ t إلى ثمن اللتر الواحد من الزيت إذن :

$$40y + 5t = 95500 \text{ في اليوم الأول :}$$

$$40y + 7t = 104500 \text{ في اليوم الثاني :}$$

$$40y + 7t - (40y + 5t) = 104500 - 95500 \text{ فرق المبيعات في اليومين يعني :}$$

$$2t = 9000 \text{ إذن : } t = 4500$$

$$40y + 5 \times 4500 = 95500 \text{ فإن : } 40y + 5t = 95500$$

$$40y + 22500 = 95500 \text{ يعني}$$

$$40y = 73000 \text{ يعني } y = 1825 \text{ إذن ثمن اللتر الواحد من الزيت هو 4500 مليم}$$

$$\text{و ثمن اللتر الواحد من الحليب هو 1825 مليم}$$

تمرين (23):

نرمز بـ: P_1 إلى وزن الولد و بـ: P_2 إلى وزن البننت و بـ: P_3 إلى وزن الكرة , إذن :

$$P_3 + P_1 = 41,5 \quad \text{و} \quad P_2 + P_3 = 69,5 \quad \text{و} \quad P_2 + P_1 = 97$$

إذن: 97 كلغ $P_2 + P_1 =$ و $69,5$ كلغ $P_2 + P_3 =$ ينتج عنه : $2P_2 + P_1 + P_3 = 69,5 + 97$

$$2P_2 = 125 \quad \text{يعني} \quad 2P_2 + 41,5 = 166,5 \quad \text{يعني} \quad 2P_2 + (P_1 + P_3) = 166,5$$

$$P_2 = 62,5 \quad \text{يعني}$$

$$P_1 = 97 - 62,5 = 34,5 \quad \text{ينتج عنه} \quad P_2 + P_1 = 97 \quad \text{و}$$

$$P_3 = 69,5 - 62,5 = 7 \quad \text{ينتج عنه} \quad P_2 + P_3 = 69,5 \quad \text{و}$$

و بالتالي : وزن الولد هو $34,5$ كغ و وزن البننت هو $62,5$ كغ و وزن الكرة هو 7 كغ

تمرين (24):

نقسم الكجات إلى مجموعات كالتالي : 3 ؛ 3 ؛ 2 ثم نزن 3 \leftrightarrow 3 فإن تساوى الثلاثتان نزن

الاثنتين المتبقيتين ونحصل على أكثرهما وزنا

أما إذا لم يتساوى نأخذ 2 من المجموعة الأكثر وزنا فإن تساوى فالثالثة هي الأكثر وزنا

تمرين (25):

العملية الأولى : $11 \leftarrow 7$ و بقي له 4

العملية الثانية : $14 = 7+7 \leftarrow 6$ و بقي له 8

العملية الثالثة : $12 = 6+6 \leftarrow 4$ و بقي له 8 و أصبح للأول: $8 = 4+4$

تمرين (26):

نرمز بالحرف n إلى أصغرهما ؛ إذن :

$$363 = (n+2) + (n+1) + n \quad \text{إذا} \quad 3n + 3 = 363 \quad \text{يعني}$$

$$3n = 360 \quad \text{يعني} \quad n = 120 \quad \text{و الأعداد هي} \quad 120 ؛ 121 ؛ 122$$

تمرين (26):

نرمز بالحرف V إلى سعة هذا الخزان , و نحول المسألة إلى معادلة من الدرجة الأولى ذات

مجهول واحد كالتالي :

$$V\left(\frac{8}{9} - \frac{1}{3}\right) = 3400 \text{ m}^3 \quad \text{إذن} \quad \frac{8}{9}V - \frac{1}{3}V = 3400 \text{ m}^3$$

$$\frac{5}{9}V = 3400 \text{ m}^3 \quad \text{يعني} \quad V\left(\frac{8}{9} - \frac{3}{9}\right) = 3400 \text{ m}^3$$

$$V = \frac{9}{5} \times 3400 = 6120 \text{ m}^3 \quad \text{يعني}$$

تمرين 1


يمثل الجدول التالي توزيع عدد الحرفاء المرتادين على قاعة سينما على مدى أسبوع علما بأن الراحة الأسبوعية لهذه القاعة هو يوم الإثنين.

اليوم	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
عدد الحرفاء	770	520	660	250	830	970

$$(1) \text{ المعدل اليومي لعدد الحرفاء المرتادين لهذه القاعة هو : } 666,666 = \frac{770+520+660+250+830+970}{6}$$

$$(2) \text{ النسبة المئوية للحرفاء يوم الجمعة هي : } 6,25\% = \frac{250 \times 100}{770+520+660+250+830+970}$$

(3) المخطط الدائري :



$$\frac{770 \times 360^0}{4000} = 69,3^0 \text{ الثلاثاء}$$

$$\frac{520 \times 360^0}{4000} = 46,6^0 \text{ الأربعاء}$$

$$\frac{660 \times 360^0}{4000} = 59,4^0 \text{ الخميس}$$

$$\frac{250 \times 360^0}{4000} = 22,5^0 \text{ الجمعة}$$

$$\frac{250 \times 360^0}{4000} = 87,3^0 \text{ الأحد و } \frac{970 \times 360^0}{4000} = 74,7^0 \text{ السبت}$$

(4) منوال هذه السلسلة الإحصائية هو يوم الأحد.


تمرين 2

الدولة	تونس	الجزائر	المغرب	ليبيا	موريتانيا
المساحة بالكم المربع	164.150	2.381.740	710.850	1.775.500	1.030.700

(1) النسبة المئوية لمساحة تونس بالنسبة للمساحة الجمالية لمنطقة المغرب العربي هي:

$$\frac{164.150 \times 100}{164.150 + 2381.740 + 710.850 + 1775.500 + 1030.700} = \frac{16415.0}{6062.94} = 2,707\%$$

(2) المخطط الدائري :



$$\frac{164.150 \times 360^0}{6062.94} = 9,74^0 \text{ تونس:}$$

$$\frac{2381.740 \times 360^0}{6062.94} = 141,42^0 \text{ الجزائر:}$$

$$\frac{710.850 \times 360^0}{6062.94} = 42,20^0 \text{ المغرب:}$$

$$\frac{1.775.500 \times 360^0}{6062.94} = 105,42^0 \text{ ليبيا:}$$

$$\frac{1.030.700 \times 360^0}{6062.94} = 61,20^0 \text{ موريطانيا}$$

تمرين 3

جدول السلسلة الثانية

400	300	200	100	0	قيمة الميزة
32	24	40	18	10	التكرار

(1) جدول السلسلة الأولى

2,5	2	1,5	1	0,5	قيمة الميزة
120	60	130	170	150	التكرار

مدى السلسلة الثانية هو $400 - 0 = 400$

منوال السلسلة الثانية هو 200

(2) مدى السلسلة الأولى هو $2,5 - 0,5 = 2$

منوال السلسلة الأولى هو 1

المعدل الحسابي للسلسلة الأولى هو:

$$\frac{0,5 \times 150 + 1 \times 170 + 1,5 \times 130 + 2 \times 60 + 2,5 \times 120}{120 + 60 + 130 + 170 + 150} = \frac{75 + 170 + 195 + 120 + 300}{630} = 1,365$$

و متوسطها هو: 1

المعدل الحسابي للسلسلة الثانية هو:

$$\frac{32 \times 400 + 24 \times 300 + 40 \times 200 + 18 \times 100 + 10 \times 0}{32 + 24 + 40 + 18 + 10} = \frac{75 + 170 + 195 + 120 + 300}{124} = 240,322$$

و متوسطها هو: 200

تمرين 4

(1)

[55,60[[50,55[[45,50[[40,45[[35,40[[30,35[[25,30[[20,25[العمر
5	80	120	20	40	95	65	20	التكرار

(2) التكرار الجملي لهذه السلسلة هو: $5 + 80 + 120 + 20 + 40 + 95 + 65 + 20 = 445$

(3) منوال هذه السلسلة هو: $\frac{45 + 50}{2} = 55$ ومداهها هو: $60 - 20 = 40$

(4) معدل الأعمار بالنسبة لعمال هذه الحظيرة هو:

$$\frac{22,5 \times 20 + 27,5 \times 65 + 32,5 \times 95 + 37,5 \times 40 + 42,5 \times 20 + 47,5 \times 120 + 52,5 \times 80 + 57,5 \times 5}{445} = \frac{17862,5}{445} = 40,14$$

تمرين 5

(1)

11,9	10,5	8,4	5,6	4,2	2,1	0,7	قيمة الميزة
30	16	40	22	24	16	18	التكرار

من 15 إلى 20	من 10 إلى أقل من 15	من 5 إلى أقل من 10	من 0 إلى أقل من 5	قيمة الميزة
240	340	280	200	التكرار

(2) مدى السلسلة الأولى هو : $11,9 - 0,7 = 11,2$. و منوالها هو : 8,4

و المعدل الحسابي هو :

$$\frac{11,9 \times 30 + 10,5 \times 16 + 8,4 \times 40 + 5,6 \times 22 + 4,2 \times 24 + 2,1 \times 16 + 0,7 \times 18}{30 + 16 + 40 + 22 + 24 + 16 + 18} = 6,814$$

مدى السلسلة الثانية هو : 20 . و منوالها هو : [10,15]

و المعدل الحسابي هو :


$$\frac{2,5 \times 200 + 7,5 \times 280 + 12,5 \times 340 + 17,5 \times 240}{240 + 340 + 280 + 200} = \frac{500 + 2100 + 4250 + 4200}{1060} = 10,425$$

(3) متوسط السلسلة الموافقة للمخطط 1 هو : 8,4

(4 - أ) جدول التواترات التراكمية الصاعدة الموافقة للمخطط 2

من 15 إلى 20	من 10 إلى أقل من 15	من 5 إلى أقل من 10	من 0 إلى أقل من 5	قيمة الميزة
240	340	280	200	التكرار
$\frac{240}{1060} = 0,226$	$\frac{340}{1060} = 0,320$	$\frac{280}{1060} = 0,264$	$\frac{200}{1060} = 0,188$	التواترات
1	0,773	0,452	0,189	التواترات التراكمية الصاعدة

(ب) القيمة التقريبية للمتوسط هي : 0,500



(1) نوع هذه الميزة هي كمية مسترسلة

التكرار الجملي هو : 500

(2) جدول التواترات بالنسب المائوية

الزمن بالساعة	$[0,2[$	$[2,4[$	$[4,6[$	$[6,8[$
التكرارات	270	120	90	20
التواترات بالنسب المائوية	%54	%24	%18	%4

(3) المخطط الدائري لهذه التواترات .



$$\frac{54 \times 360^0}{100} = 194,4^0$$

$$\frac{24 \times 360^0}{100} = 86,4^0$$


$$\frac{18 \times 360^0}{100} = 64,8^0$$

$$\frac{4 \times 360^0}{100} = 14,4^0$$

(4 - أ) جدول التكرارات التراكمية النازلة لهذه السلسلة الإحصائية .

الزمن بالساعة	$[0,2[$	$[2,4[$	$[4,6[$	$[6,8[$
التكرارات	270	120	90	20
التكرارات التراكمية النازلة	500	230	110	20

ب- مضع التكرارات التراكمية النازلة لهذه السلسلة



ج- (و القيمة التقريبية لموسطها هي : 1,8 و مدلوله كوسيط من وسطاء التشتت يبرز سوء انتشار هذه السلسلة (لأن موسطها متباعد نسبيا عن المعدل الحسابي : 2,44)

تمرين 7

[64,68[[60,64[[56,60[[52,56[[48,52[الفئة (الوقت المسجل بالثواني)
8%	24%	32%	30%	6%	النسبة المئوية

(1) ميزة هذه السلسلة هي : " الوقت المسجل بالثواني" و خاصيتها كمية مسترسله (متصلة)


(2) عدد الرياضيين الذين سجلوا وقتا محصورا بين دقيقة و 48 ثانية هو :

$$\frac{150}{100} \times (32+30+ 6) = \frac{150}{100} \times 68 = 102$$

(3) جدول التكرارات التراكمية الصاعدة و المضلع الموافق لها .

[64,68[[60,64[[56,60[[52,56[[48,52[الفئة (الوقت المسجل بالثواني)
8%	24%	32%	30%	6%	النسبة المئوية
12	36	48	45	$\frac{150}{100} \times 6 = 9$	التكرارات
150	138	102	54	9	التكرارات التراكمية الصاعدة

التكرارات (عدد الرياضيين)



(4) القيمة التقريبية لموسط هذه السلسلة هي : 68 ثانية

تمرين 8

(1) ثمن أكثر المحافظ رواجاً في هذه المكتبة هو : 14د (يعني منوال هذه السلسلة هو 14د .)

(2) جدول هذه السلسلة الإحصائية.

25	20	18	17	15	14	13	12	10	الثنى بالدينار
8	4	5	3	7	9	3	6	4	التكرار

(3) متوسط هذه السلسلة هو : 15

(4) جدول التواترات التراكمية النازلة لهذه السلسلة. التكرار الجملي هو: 48

25	20	18	17	15	14	13	12	10	الثنى بالدينار
8	4	5	3	7	9	3	6	4	التكرار
8	12	17	20	27	36	39	45	49	التكرار التراكمي النازل
0,16	0,24	0,34	0,40	0,55	0,73	0,79	0,91	1	التواترات التراكمية النازلة

تمرين 9

(1) الجدول الإحصائي لهذه السلسلة.


5,6	5,4	5,3	5,2	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	الدرجة (بمقياس رشتري)
1	3	4	3	2	5	2	4	4	2	التكرار

(2) منوال هذه السلسلة هو : 4,6

(3) النسبة المئوية لهذه الرجات الأرضية الأقل من 5 درجات هي : $\frac{19 \times 100}{30} = 63,33$

(4) مخطط التواترات التراكمية الصاعدة لهذه السلسلة

5,6	5,4	5,3	5,2	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	الدرجة (بمقياس رشتري)
1	3	4	3	2	5	2	4	4	2	التكرار
30	29	26	22	19	17	12	10	6	2	التكرار التراكمي الصاعد
1	0,97	0,87	0,73	0,63	0,57	0,4	0,33	0,2	0,07	التواترات التراكمية الصاعدة



(5) معدل الرجات الأرضية في هذه الجزيرة هو :

$$\frac{2 \times 4,1 + 4 \times 4,2 + 4 \times 4,3 + 2 \times 4,5 + 5 \times 4,6 + 2 \times 4,7 + 3 \times 5,2 + 4 \times 5,3 + 3 \times 5,4 + 1 \times 5,6}{30} = 4,74$$

الإحتمالات**التمرين 10:**

إن كنت طرفا في اللعبة، أختار النرد الثاني لأن أرقام أوجهه أكبر من أرقام النرد الأول ، بينما احتمال ظهور كل رقم متساوية .

التمرين 11:

- 1- أ) الإمكانات التي على إثرها، تتحصل على نتيجة تساوي 5 هي : (1,6) .
 ب) الإمكانات التي على إثرها، تتحصل على نتيجة تساوي 0 هي :
 (1,1) و (2,2) و (3,3) و (4,4) و (5,5) و (6,6)
 2- أ) مثالان من الأحداث المستحيلة لهذه التجربة هما : أن تتحصل على فرق يساوي 6 ,
 أو أن تتحصل على فرق يساوي 5.
 ب) مثالان من الأحداث الأكيدة لهذه التجربة هما : أن تتحصل على فرق يساوي عدد صحيح طبيعي ,
 أو أن تتحصل على فرق أكبر أو يساوي 0.
 (-3)

النتيجة	0	1	2	3	4	5
عدد الإمكانات	6	5	4	3	2	1
التواتر	0,28	0,24	0,19	0,14	0,10	0,05

- 4- أ) احتمال أن يكون النتيجة أكبر أو يساوي 4 هو : $0,05 + 0,10 = 0,15 = \frac{15}{100}$
 ب) احتمال أن يكون النتيجة أصغر أو يساوي 3 هو : $1 - 0,15 = 0,85 = \frac{85}{100}$

التمرين 12:

- 1- أ) الحدث الأكثر احتمالا من بين هذه الأحداث هو الحدث 1 لأنه ممثل بالقطاع الأكبر.
 ب) الحدث الأقل احتمالا من بين هذه الأحداث هو الحدث 3 لأنه ممثل بالقطاع الأصغر.
 2- (-) الحدث 2 أكثر احتمالا من الحدث 3 . لأنه ممثل بقطاعين مجموعهما أكبر من قطاع الحدث 2
 3- نعتبر أن وقوع السهم خارج الرقعة حدثا مستحيلا إذن :

$$\begin{aligned} \text{احتمال الحدث 1 هو: } \frac{120}{360} = \frac{1}{3} & ; \text{ احتمال الحدث 2 هو: } \frac{90}{360} = \frac{1}{4} \\ \text{احتمال الحدث 3 هو: } \frac{60}{360} = \frac{1}{6} & ; \text{ احتمال الحدث 4 هو: } \frac{90}{360} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

التمرين 13: (استعمال الحاسوب)

الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
عدد المرات	8	5	18	10	9	7	12	9	10	12
التواتر بالنسبة المئوية	8%	5%	18%	10%	9%	7%	12%	9%	10%	12%

- 3- من خلال هذه التجربة، - احتمال الحصول على الرقم 0 هو : 0,08
 - احتمال الحصول على الرقم 1 هو : 0,05
 - احتمال الحصول على الرقم 2 هو : 0,18
 - احتمال الحصول على الرقم 9 هو : 0,12
 4- نلاحظ أن منوال هذه السلسلة الإحصائية هو : الرقم 2
 (يعني الرقم الأكثر ظهورا على شبكة برنامج الإكسل « Excel » خلال هذه التجربة العشوائية)

(1) $\{(1,1,1), (1,1,2), (1,1,3), (1,1,4), (1,1,5), (1,1,6), (1,2,2), (1,2,3), (1,2,4), (1,2,5), (1,2,6), (1,3,3), (1,3,4), (1,3,5), (1,3,6), (1,4,4), (1,4,5), (1,4,6), (1,5,5), (1,5,6), (1,6,6), (2,2,2), (2,2,3), (2,2,4), (2,2,5), (2,2,6), (3,3,2), (3,3,3), (3,3,4), (3,3,5), (3,3,6), (4,4,2), (4,4,3), (4,4,4), (4,4,5), (4,4,6), (5,5,2), (5,5,3), (5,5,4), (5,5,5), (5,5,6), (6,6,2), (6,6,3), (6,6,4), (6,6,5), (6,6,6)\}$

6	5	4	3	مجموع الأرقام الثلاثة الفوقية
3	2	1	1	عدد إمكانيات المجموع
$\frac{3}{46} = 0,065$	$\frac{2}{46} = 0,043$	$\frac{1}{46} = 0,022$	$\frac{1}{46} = 0,022$	تواتر إمكانيات المجموع

(2) (3) احتمال الحصول على مجموع يساوي 4 هو : 0,022

(4) احتمال الحصول على مجموع أكبر أو مساوي لـ : 5 هو : $0,065 + 0,043 = 0,108$


(5) احتمال الحصول على مجموع مساوي لـ : 2 هو : صفر

(6) احتمال الحصول على مجموع أكبر من 1 هو : 1

التعيين في المستوي

الدرس عدد 9:

التمرين 1:



$$\text{البعد AC هو : } AC = |x_A - x_C| = \left| \frac{-7}{2} - 4 \right| = \left| \frac{-7}{2} - \frac{8}{2} \right| = \left| \frac{-15}{2} \right| = \frac{15}{2}$$

$$x_D = \frac{x_C + x_A}{2} = \frac{4 + \frac{-7}{2}}{2} = \frac{\frac{8}{2} + \frac{-7}{2}}{2} = \frac{1}{4} \text{ يعني [AC] منتصف D (2)}$$


$$x_E = 2x_C - x_B \text{ : يعني } x_E + x_B = 2x_C \text{ : يعني } x_C = \frac{x_E + x_B}{2} \text{ : يعني [EB] منتصف C (3)}$$

$$x_E = 2 \times 4 - (-1) = 9 \text{ : يعني}$$

$$x_M = 4 - 6 = -2 \text{ : يعني } x_M = x_C - 6 \text{ : يعني } x_C - x_M = 6 \text{ : يعني } x_M < 0 \text{ و } CM = 6 \text{ (4)}$$

التمرين 2:

(1) معين في المستوي. (O,I,J)




(2) الرباعي ABCD متوازي الأضلاع لأن (CD)//(AB)//(OI) لأن: و A و B لهما نفس الترتيبة

و C و D لهما نفس الترتيبة

و كذلك: (CB)//(AD)//(OJ) لأن: A و D لهما نفس الفاصلة و C و B لهما نفس الفاصلة

(3) مجموعة النقاط $M(x,y)$ التي فاصلاتها x تساوي 4 و ترتيبتها y تحقق $-2 \leq y \leq 2$ هي قطعة المستقيم [AD] حيث: $\{ M(x,y) : x = 4 \text{ و } -2 \leq y \leq 2 \}$ حيث [AD](4) أ) إحداثيات النقطة E هي: $E(1, -2)$ ب) إحداثيات النقطة I في المعين (C,E,B) هي $I(1, \frac{1}{2})$

التمرين 3:(1) معين متعامد في المستوي حيث $OI=OJ$.

ب- النقطتان $A(-2,3)$ و $B(-2,-3)$ متناظرتان بالنسبة إلى المحور (OI) لأن لهما نفس الفاصلة و ترتيبتان متقابلتان.

ج- بما أن النقطتين $A(-2,3)$ و $B(-2,-3)$ متناظرتان بالنسبة إلى المحور (OI) ، فإن (OI) هو المتوسط العمودي للقطعة $[AB]$ و بالتالي $IB = IA$ يعني أن المثلث IAB متقايس الضلعين في I .
(2) أ- انظر الرسم

ب- لكي يكون الرباعي $A E F G$ متوازي الأضلاع يجب أن يكون:

طريقة 1:

$$y_F - y_E = y_G - y_A \text{ يعني } 3 - 4 = y_G - 3 \text{ يعني } -7 = y_G - 4 \text{ يعني } y_G = -4 \text{ يعني } G(-2,-4).$$

طريقة 2:

G و E متناظرتان بالنسبة إلى O يعني إحداثيات G و E متقابلة يعني $G(-2,-4)$

(3) إحداثيات النقطة D منازرة B بالنسبة إلى النقطة O هي يعني $D(2,3)$.

(4) أ- مجموعة النقاط $M(x,y)$ حيث $-2 \leq x \leq 2$ و $y=3$ هي القطعة $[AD]$

ب- ما هي مجموعة النقاط $N(x,y)$ حيث $x = -2$ و $y \geq -3$ هو نصف المستقيم $[BA]$

التمرين 4:

(1) معين متعامد في المستوي حيث $OI=OJ = 1 \text{ cm}$.

(1) انظر الرسم

(2) أ- G منتصف $[AB]$ إذا إحداثياتها في المعين (O,I,J) هي:

$$G(-1, 0) : \text{يعني } x_G = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-4 + 2}{2} = -1 \text{ و } y_G = 0$$

$$\text{ب- حساب البعد } AB : AB = |x_A - x_B| = |-4 - 2| = |-6| = 6$$


(3- أ-) بما أن النقطتين A و C لهما نفس الفاصلة فإن المستقيم (AC) يوازي (OJ) .

ب) بما أن النقطتين B و D لهما نفس الفاصلة فإن المستقيم (BD) يوازي (OJ) و بالتالي


المستقيم (AC) يوازي (BD) .

ج- إحداثيات النقطة E هي E(2,2) : لأن $x_E = x_D = 2$ و بما أن $ED = AC = 3$ فإن :

$$y_E - y_D = 3 \text{ يعني } y_E = 3 + y_D = 3 + (-1) = 2$$



(O, I, J) معين متعامد في المستوي حيث $OI = OJ = 1 \text{ cm}$.



(1) انظر الرسم

$$AB = |x_A - x_B| = \left| \frac{-7}{2} - 3 \right| = \left| \frac{-13}{2} \right| = \frac{13}{2} = 6,5 \quad (أ)$$

$$IA = |x_A - x_I| = \left| \frac{-7}{2} - 1 \right| = \left| \frac{-9}{2} \right| = \frac{9}{2} = 4,5$$

$$x_E = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{\frac{-7}{2} + 3}{2} = \frac{-1}{2} = \frac{-1}{4} \quad \text{إذن : } E \text{ منتصف } [AB]$$

(2) انظر الرسم .

أ - الرباعي CGDH مستطيل لأن قطريه متقايسان ومتقاطعان في منتصفهما O .


ب - انظر الرسم . (أثبت أن المستقيمين (CG) و (OF) متعامدان)

المستقيمان (CG) و (OF) متعامدان لأنهما قطري المربع FGO .

أ - إحداثيات C في المعين (O,I,J) هي : C(0,4) وإحداثيات G في المعين (O,I,J) هي :

G(-4,0) إحداثيات F في المعين (O,I,J) هي : F(-4,4) وإحداثيات A في المعين

A(-\frac{7}{2}, 0) في المعين (O,I,J)

التمرين 6:

(1) الرباعي ABCD معين لأن قطريه متعامدان في منتصفهما O .

(2) الرباعي AECF مستطيل لأن أضلاعه [EA] و [FC] و [EA] و [FC] متوازية

مثنى- مثنى له زاويتان قائمتان .



(3) بما أن ABCD متوازي أضلاع فإن (AD) // (BC) و AD = BC

و بما أن (AC) // (BK) فإن ACBK متوازي أضلاع و بالتالي :


[DK] منتصف A إذن AD = AK و (AK) // (BC) و AK = BC و بالتالي :

التمرين 8:

- (1)- انظر الرسم
 (2)- أ) المستقيم (AB) موازي لمحور الفاصلات لأن A و B لهما نفس الترتيب
 ب) بما أن المستقيم (AB) موازي لمحور الفاصلات نعين أصل التدرج O
 ثم نرسم الموازي لـ: (AB) المار من O
 (3) - ب) إحداثيات النقطة B_1 هي (4,0)
 ج) لبناء النقطة الواحدة I نحدد E منتصف $[OB_1]$ ثم I منتصف $[OE]$

**التمرين 9:**


- (1) مسقط A على (CD) وفقا لمنحى (AB) هي غير موجود
 مسقط B على (CD) وفقا لمنحى (AB) هي غير موجود
 مسقط C على (CD) وفقا لمنحى (AB) هي C
 مسقط D على (CD) وفقا لمنحى (AB) هي D
 (2) بما أن المستقيمان (OB) و (OA) متقاطعان في O فإن (O,A,B) معين.
 إحداثيات النقطة A في المعين (O,A,B) هي $A(1,0)$.
 إحداثيات النقطة B في المعين (O,A,B) هي $B(0,1)$
 إحداثيات النقطة C في المعين (O,A,B) هي $C(-1,0)$
 إحداثيات النقطة D في المعين (O,A,B) هي $D(0,-1)$

التمرين 10:

(2) طبيعة الرباعي OA_1AA_2 هو متوازي أضلاع لأن أضلاعه متوازية مثنى- مثنى

التمرين 11:

(1) (O, I, J) معين متعامد في المستوي حيث $OI = OJ$.



(1) أنظر الرسم


(ج-) يمثل النقطتان $A(1, -2)$ و $B(4, -2)$ طرفي المجموعة E .

(2) إحداثيات طرفي المجموعة E' هما $A'(-1, 2)$ و $B'(-4, 2)$

مناظرتي $A(1, -2)$ و $B(4, -2)$ بالنسبة إلى O .

التمرين 12:

. $OI = OJ$ معين متعامد في المستوي حيث (O, I, J) .



(1) أنظر الرسم

ث) D هي منازرة A بالنسبة إلى (OJ) إذن إحداثياتها هي : $D(-2, 4)$

ث) C هي منازرة B بالنسبة إلى (OJ) لأن فاصلتهما متقابلتان و بالتالي نستنتج أن القطعتين

$[AB]$ و $[CD]$ متناظرتان بالنسبة إلى (OJ) إذن $CD = AB$ و بالتالي الرباعي ABCD شبه

منحرف متقايس الضلعين.

(2) الرباعي ABEF متوازي الأضلاع إذن B و F متناظرتان بالنسبة إلى O و بالتالي فإن

إحداثيتهما متقابلة , يعني إحداثيات النقطة F هي : $F(-\frac{9}{2}, -2)$

(3) بما أن $CD = AB$ (حسب السؤال الأول)


و في المتوازي ABEF لدينا $EF = AB$ إذن $CD = EF$

(4) بما أن D و E لهما نفس الفاصلة فإن $(OJ) \parallel (DE)$ وبما أن C و F لهما نفس الفاصلة فإن

$(OJ) \parallel (CF)$ و بالتالي $(CF) \parallel (DE)$

التمرين 13:


(O,I,J) معين في المستوي حيث $OI = OJ$.



(1) أنظر الرسم

(2) إحداثيات النقطة M في المعين (O,A,B) هي : $M(2, -2)$

(3) النقطة N (2,-1) في المعين (O,A,B) إذا إحداثياتها في المعين (O,I,J) هي : $N(6, 1)$

التمرين 14:

(1) إحداثيات النقطة A في المعين (A,B,D) هي : $A(0,0)$

إحداثيات النقطة B في المعين (A,B,D) هي : $B(1,0)$

إحداثيات النقطة C في المعين (A,B,D) هي : $C(1,1)$

إحداثيات النقطة D في المعين (A,B,D) هي : $D(0,1)$

(2) أنظر الرسم

(3) ADIJ مستطيل لأنه رباعي له ثلاث زوايا قائمة .

(4) إحداثيات النقطة I في المعين (A,B,D) هي : $I(\frac{1}{2}, 1)$

إحداثيات النقطة J في المعين (A,B,D) هي : $J(\frac{1}{2}, 0)$


الدرس عدد 10: مبرهنة طالس و تطبيقاتها

(1) (-1) في مثلث ABC حيث I منتصف [AB] و J منتصف [AC] ، لنا:

$$\boxed{\text{صحيح}} \quad \frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{1}{2}$$

(-2) مهما تكن النقاط A و B و C من المستوي حيث I منتصف [AB] و J منتصف [AC] ، لنا:

$$\boxed{\text{خطا}} \quad IJ = \frac{1}{2} BC$$



(-3) في الرسم المجاور حيث (IA)//(JB) و (JB)//(CK) لنا:

$$\boxed{\text{صحيح}} \quad \frac{AB}{AC} = \frac{IJ}{IK}$$

(-4) إذا كان ABC مثلثا حيث AB=4 cm و AC=5 cm . و I نقطة من [AB]


$$\boxed{\text{خطا}} \quad \frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} \quad \text{، فإن: } AI=AJ=3\text{cm حيث } [AC] \text{ و نقطة من } [AB]$$

(-5) لتحديد النقطة M من قطعة المستقيم [AB] حيث $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{5}$ ،

نجزئ [AB] إلى ثلاثة أجزاء متقايسة $\boxed{\text{خطا}}$

(2) (-1) في الرسم المجاور، (PQ) // (BC) و AP=4cm و

و AQ=5cm و AB=6cm . AC تساوي :



$$7 \quad \square$$

$$\frac{15}{2} \quad \boxed{x}$$


$$\frac{4}{3} \quad \square$$

(-2) المستقيم المارّ من منتصف ضلعين في مثلث هو :

عمودي على الضلع الثالث

مواز للضلع الثالث

قاطع للضلع الثالث



(-3) (BC)//(IJ) و AB=3 و AC=2 و AI=x و AJ=y ،

$$x+2=y+3 \quad \square$$

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} \quad \square$$


$$2x=3y \quad \square \quad x$$

4-) ليكن $ABCD$ شبه منحرف قاعدته $[AB]$ و $[CD]$ حيث $DC=6\text{cm}$ و لكن I منتصف $[AD]$ و J منتصف $[BC]$ ، إذا كان $IJ=5\text{cm}$ ، فإن:

$$AB=2\text{cm} \quad \square$$

$$AB=4\text{cm} \quad \square \quad x$$

$$AB=3\text{cm} \quad \square$$



3


حسب نظرية طالس في المثلث ABC لدينا:

$$AN = \frac{AC \times AM}{AB} = \frac{5 \times 5}{7} = \frac{25}{7} \quad \text{وبالتالي:} \quad \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

$$CN = 5 - \frac{25}{7} = \frac{35}{7} - \frac{25}{7} = \frac{10}{7} \quad \text{ونستنتج أن}$$

$$NM = \frac{BC \times AM}{AB} = \frac{6 \times 5}{7} = \frac{30}{7} \quad \text{وبالتالي:} \quad \frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \quad \text{لدينا:} \quad \frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$$

4




حسب نظرية طالس في المثلث ABC لدينا: $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ إذن: $AB \times AN = AC \times AM$

$$AN = \frac{AC \times AM}{AB} = \frac{4 \times 7}{3} = \frac{28}{3} = 9,33 \text{ cm} \quad \text{وبالتالي:}$$

$$AB \times MN = BC \times AM \quad \text{لدينا:} \quad \frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$$

$$MN = \frac{BC \times AM}{AB} = \frac{3,5 \times 7}{3} = \frac{24,5}{3} = 8,16 \text{ cm} \quad \text{وبالتالي:}$$


و بالتالي محيط المثلث AMN يساوي : $AM + MN + AN = 7 + \frac{24,5}{3} + \frac{28}{3} = 24,5 \text{ cm}$



حسب نظرية طالس في المثلث AMN لدينا : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

إذن : $AB \times AN = AC \times AM$ و بالتالي : $AB = \frac{AC \times AM}{AN} = \frac{4 \times 2,5}{2} = 5 \text{ cm}$ و $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$

يعني $AB \times MN = AM \times BC$ و بالتالي : $BC = \frac{AB \times NM}{AM} = \frac{5 \times 3}{2,5} = 6 \text{ cm}$



(1) حسب نظرية طالس في المثلث IJK لدينا : $\frac{JM}{JI} = \frac{JN}{JK} = \frac{MN}{IK}$ إذا $JM \times JK = JN \times JI$ و بالتالي :


$\frac{JM}{JI} = \frac{MN}{IK}$ يعني $JM \times IK = MN \times JI$ و $JN = \frac{JK \times JM}{JI} = \frac{7 \times 1}{4} = \frac{7}{4} \text{ cm}$

$$MN = \frac{IK \times JM}{JI} = \frac{5 \times 1}{4} = \frac{5}{4} \text{ cm}$$

(2) حسب نظرية طالس في المثلث IJK لدينا : $\frac{IP}{JI} = \frac{PQ}{JK} = \frac{IQ}{IK}$ إذا $IP \times IK = IQ \times JI$

$$\text{وبالتالي: } IQ = \frac{IK \times IP}{JI} = \frac{5 \times 2}{4} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ cm}$$

$$\text{و } \frac{IP}{JI} = \frac{PQ}{JK} \text{ يعني } IP \times JK = PQ \times JI \text{ و بالتالي: } PQ = \frac{JK \times IP}{JI} = \frac{7 \times 2}{4} = \frac{7}{2} = 3,5 \text{ cm}$$



7

(1) حسب نظرية طالس في المثلث EFG لدينا: $\frac{EN}{EG} = \frac{EM}{EF} = \frac{MN}{FG}$


$$\text{إذن: } EN \times EF = EG \times EM \text{ و بالتالي: } EN = \frac{EM \times EG}{EF} = \frac{3 \times 6}{4} = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ cm}$$

و $\frac{EN}{EG} = \frac{MN}{FG}$ يعني $EN \times GF = EG \times MN$ و بالتالي:

$$MN = \frac{GF \times EN}{EG} = \frac{7 \times 4,5}{6} = 5,25 \text{ cm}$$

بما أن MNGP متوازي أضلاع فإن $PG = MN$

وبالتالي: $FP = GF - MN = 7 - 5,25 = 1,75 \text{ cm}$




8

حسب نظرية طالس في المثلث ABC لدينا: إذا $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{ED}{BC}$

وبالتالي: $AD \times AC = AB \times AE$

$$AB = \frac{AC \times AD}{AE} = \frac{6 \times 6}{4} = 9 \text{ cm}$$



9

(1) - أ) لتكن E نقطة من (IJ) بحيث AEIC متوازي أضلاع

إذن: $(AE) \parallel (IC)$ و $AE = CI$ و بالتالي AEIC متوازي أضلاع


إذن: قطراه [AB] و [EI] يتقاطعان في منتصفهما J

(ب) بما أن AEIC متوازي أضلاع و $(CI) \parallel (KJ)$ فإن KCIJ متوازي أضلاع

إذن: $CK = IJ = \frac{AC}{2}$ و بالتالي K منتصف [AC]

(ج) حسب نظرية طالس في المثلث AJK لدينا $(PN) \parallel (AK)$ و N منتصف [KJ]

(لأن M منتصف [JC] و [KI] و [JK] و [AK] و $NP = \frac{AK}{2}$ و $AK = \frac{AC}{2}$ و بالتالي $NP = \frac{AC}{4}$.



في هذا الاقتراح على متوازيات الأضلاع التالية: EFDB


و ECFD و AFED المتقايسة المساحة و حيث يمثل كل

من المثلثات المتحصل عليها نصف أحد هذه المتوازيات

و بالتالي يكون هذا المقترح صائبا.

10

11



(1) في المثلث BCA لدينا $(ED) \parallel (BC)$ و B منتصف [AD] و C منتصف [AE] إذن: حسب نظرية

طالس نتحصل على: $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{ED} = \frac{1}{2}$ و بالتالي $DF = BC = 7 \text{ cm}$.

(2) المستقيم الذي يمر من منتصف ضلع في مثلث وموازيا لضلع ثان يمر من منتصف الضلع الثالث لهذا

المثلث, و بالتالي M منتصف [DF] .

(3) في المثلث CBG لدينا $(MD) \parallel (BC)$ و $DM = \frac{BC}{2}$ إذن: حسب نظرية طالس نتحصل على:


. $\frac{GD}{GB} = \frac{GM}{GC} = \frac{DM}{BC} = \frac{1}{2}$ و بالتالي M منتصف [GC]

(12) حسب نظرية طالس في المثلث ABC لدينا : $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$ إذن : $AI \times BC = AB \times IJ$ وبالتالي :

$$BC = \frac{IJ \times AB}{IA} = \frac{1,5 \times 22,5}{7,5} = 4,5 \text{ m}$$


(2) لدينا : $\frac{AK}{AB} = \frac{1}{BC}$ إذن : $AK = \frac{AB}{BC} = \frac{22,5}{4,5} = 5\text{m}$ و بالتالي : $IK = 7,5 - 5 = 2,5$

(13)



في المثلث ABF لدينا $(IE) \parallel (BF)$ و I منتصف $[AB]$ إذن : E منتصف $[AF]$ يعني $EF = AE$
و نفس الشيء في المثلث CED نحصل على F منتصف $[CE]$ يعني $EF = CF$
و بالتالي : $EF = AE = CF$

(14)




لتكن K نقطة تقاطع (AD) و (BC) إذن : حسب نظرية طالس في المثلثين KCJ و KDJ نحصل على :

$$CJ = \frac{BI \times KJ}{KI} \text{ و } DJ = \frac{AI \times KJ}{KI} \text{ و بالتالي : } \frac{KI}{KJ} = \frac{BI}{CJ} \text{ و } \frac{KI}{KJ} = \frac{AI}{DJ}$$

و بما أن $BI = AI$ فإن $CJ = DJ$ يعني J منتصف $[CD]$.

(15) حسب نظرية طالس في المثلث ABC لدينا : $\frac{BF}{BA} = \frac{BE}{BC} = \frac{1}{2}$

إذن : F منتصف $[AB]$.



(2) حسب نظرية طالس في المثلث BEF لدينا : $\frac{BK}{BE} = \frac{BH}{BF} = \frac{KH}{EF}$

إذن : $BE \times BH = BF \times BK$ ثم نقسم على $HB \times BK$ ثم نحزّل

$$\frac{BE \times BH}{HB \times BK} = \frac{BF}{BF} \text{ يعني } \frac{BE}{BK} = \frac{BF}{HB} \text{ ونحصل على : } \frac{BK}{BF} = \frac{BE \times HB}{BF^2}$$

$$\text{و بالتالي : } BK = \frac{BE \times HB}{BF} = \frac{4 \times 2}{3} = 2,66 \text{ cm}$$

(3) أ- بما أن F منتصف [AB] و $(EF) \perp (AB)$ إذن (EF) هو الوسط العمودي للقطعة [AB]

و بالتالي : $AE = EB = 4 \text{ cm}$

$$\text{ب) } GE = \frac{1}{3} AE = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3} \text{ و } AG = \frac{2}{3} AE = \frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3}$$

ج) بما أن G هي مركز ثقل المثلث ABC (لأنها نقطة تقاطع الوسطين الصادرين من A و C)


إذن : (BG) هو المستقيم الحامل للوسط الصادر من B و بالتالي فهو يقطع [CA] في المنتصف

(1) في المثلثين ABD و ACD لدينا نظرية طالس : M منتصف [DC]

و L منتصف [DB] و بالتالي نحصل على :

$$2DL = BD \text{ و } 2DM = CD$$


$$CB = DC + BD = 2(DM + LD) = 2LM$$



(2) تجدر الإشارة إلى صياغة السؤال كالتالي: بين أن النقاط I و J و H على استقامة واحدة

بما أن H منتصف [DA] لأن [HB] هو الوسط الصادر من B في المثلثين ABD ,

و بالتالي : $(HI) \parallel (DB)$ و لدينا $(JI) \parallel (DB)$ يعني أن النقاط I و J و H على استقامة واحدة .




حسب نظرية طالس في المثلث AGD نحصل على : $\frac{AB}{AE} = \frac{BC}{EF}$

$$\text{إذن : } BC \times AE = AB \times EF \text{ يعني : } BC = \frac{AB \times EF}{AE} = \frac{6 \times 4}{5} = 4,8 \text{ cm}$$


$$\text{و كذلك : } \frac{AB}{AE} = \frac{CD}{FG} \text{ إذن : } DC \times AE = AB \times GF \text{ يعني } FG = \frac{AE \times DC}{AB} = \frac{5 \times 4,5}{6} = 3,75 \text{ cm}$$

(18)



لدينا حسب نظرية طالس: $\frac{ED}{CF} = \frac{AD}{BC}$ إذن $CF \times AD = ED \times BC$

يعني $CF = \frac{BC \times ED}{AD} = \frac{8 \times 2}{6} = 2,7$ cm و $BF = BC - CF = 8 - 2,7 = 5,3$ cm




لدينا حسب نظرية طالس: $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{DC}$ إذن $OA \times DC = OC \times AB$

يعني $OC = \frac{DC \times OA}{AB} = \frac{2 \times 3,5}{2,5} = 2,8$ cm

و $\frac{OA}{OE} = \frac{AB}{EF}$ إذن $OA \times EF = OE \times AB$

يعني $EF = \frac{AB \times OE}{AO} = \frac{2,5 \times 5}{3,5} = 3,57$ cm

(20) (-1) انظر الرسم



(2) لدينا $(AA'') \parallel (BB')$ إذن: حسب نظرية طالس

$$\frac{CA}{CB} = \frac{CA'}{BC'} = \frac{AA''}{BB'} = \frac{3}{5} \text{ لدينا وفي المثلث } B'CB \text{ } \frac{DA}{DB} = \frac{AA''}{BB'} = \frac{3}{5}$$

$$\text{و بالتالي: } \frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB} = \frac{3}{5}$$

(3) نعين نقطة B'' على (L') بحيث $BB'' = 7$

و نقطة I على المستقيم (L) بحيث $IA = 2$ و $M = (BA) \cap (B''I)$


$$\frac{MA}{BM} = \frac{IA}{BB''} = \frac{2}{7} : \text{BM''B}$$

(21) (1- (BD) // (AC) إذن حسب نظرية طالس ، في المثلث OCD

$$\frac{AO}{AB} = \frac{CO}{CD} : \text{نتحصل على:}$$

(2) نعين 8 نقاط $P_1, P_2, P_3, \dots, P_8$ على (Ox)

$$\text{بحيث : } OP_1 = P_1P_2 = P_2P_3 = P_3P_4 = \dots = P_7P_8$$




نصل P_3 بالنقطة C ثم نرسم الموازي لـ (CP_3) و المار من P_8 الذي يقطع (Oy) في M

$$\text{وبالتالي : } \frac{OC}{CM} = \frac{3}{5} \text{ يعني } CM = \frac{5}{3} OC$$


$$AM = \frac{2}{5} AB \quad (22)$$

$$\text{إذن : } MB = \frac{3}{5} AB = \frac{3 \times 9}{5} = \frac{27}{5} = 5,4 \text{ cm}$$



(23)

نجزئ $[Ax)$ إلى 14 جزء متقايسة




$$\text{لدينا : } \frac{AM}{AB} = \frac{3}{14} \text{ إذن : } 14 \times AM = 3 \times AB \text{ يعني } AM = \frac{3 \times 12}{14} = \frac{36}{14} = 2,57 \text{ cm}$$

$$\text{و } \frac{MN}{AB} = \frac{4}{14} \text{ إذن : } 14 \times MN = 4 \times AB \text{ يعني } MN = \frac{4 \times 12}{14} = \frac{48}{14} = 3,42 \text{ cm}$$

$$\text{و } \frac{NP}{AB} = \frac{5}{14} \text{ إذن : } 14 \times NP = 5 \times AB \text{ يعني } NP = \frac{5 \times 12}{14} = \frac{60}{14} = 4,28 \text{ cm}$$

$$\text{و } \frac{PB}{AB} = \frac{2}{14} \text{ إذن : } 14 \times PB = 2 \times AB \text{ يعني } PB = \frac{2 \times 12}{14} = \frac{24}{14} = 1,7 \text{ cm}$$


24



(2) لدينا : $\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{3}$ إذن : $AB = 3 \times AE$ يعني $EA = \frac{AB}{3} = \frac{4,5}{3} = 1,5 \text{ cm}$
و : $\frac{DE}{CB} = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{3}$ إذن : $CB = 3 \times DE$ يعني $ED = \frac{BC}{3} = \frac{6}{3} = 2 \text{ cm}$

(-1) انظر الرسم

25



(2) - أ) لدينا في المثلث ACD حسب نظرية طالس : $\frac{AI}{AC} = \frac{AM}{AD} = \frac{MI}{DC} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

ب) $\frac{MI}{DC} = \frac{1}{3}$ إذن : $MI = \frac{DC}{3} = \frac{7,5}{3} = 2,5 \text{ cm}$

(3) - أ) بما أن $\frac{AM}{AP} = \frac{AI}{AQ} = \frac{1}{2}$ إذن حسب عكس نظرية طالس $(MI) \parallel (PQ)$

و بالتالي $(CD) \parallel (MI)$ لأن $(CD) \parallel (PQ)$.


ب) و نستنتج أن $PQ = 2 MI = 5$.

26

(1) في المثلث EBM لدينا $(ME) \parallel (AC)$ إذن حسب نظرية طالس نحصل على :

$\frac{AB}{BE} = \frac{1}{3}$ يعني $BE = 3AB$ إذن : $\frac{AB}{BE} = \frac{BC}{BM} = \frac{1}{3}$

- ليكن ABCD مستطيلا مركزه I حيث $AD = 3 \text{ cm}$ و $AB = 2 \text{ cm}$.




لتكن M نقطة من $[BC]$ حيث $BM=3BC$.

(2 - أ) بما أن $(MF) \parallel (BD)$ و $M \in (BC)$ و $FE \parallel (DC)$ إذن حسب نظرية طالس في المثلث BCD

$$\text{نحصل على: } \frac{CD}{CF} = \frac{BC}{CM} = \frac{1}{2} \text{ يعني } \frac{CF}{CD} = 2$$

(ب) $BE=3BA$ و $(DF \parallel (BE))$ يعني $CF = 2CD$ و $(DF \parallel (BE))$ إذن الرباعي $BEDF$ متوازي أضلاع .



(27)

(1) انظر الرسم

$$2 \times CD = 5 \times CF \quad \text{و} \quad 2 \times AB = 5 \times AE$$

$$(2) \text{ نستنتج مما سبق أن: } AE = \frac{2}{5} AB \text{ و } CF = \frac{2}{5} CD$$

$$\text{و } DF = DC - CF = DC - \frac{2}{5} CD = \frac{3}{5} CD \text{ و } \frac{AE}{DF} = \frac{\frac{2}{5} AB}{\frac{3}{5} CD} = \frac{2}{3} \text{ : وبالتالي}$$

(نظرا لأن $AB = CD$)

(3) في المثلث IDF لدينا $(DF) \parallel (AE)$ و $A \in (DI)$ و $E \in (FI)$


$$\text{إذن حسب نظرية طالس نحصل على: } \frac{IE}{IF} = \frac{AE}{DF} = \frac{2}{3} \text{ إذن } \frac{IA}{ID} = \frac{2}{3}$$

$$\text{يعني } 3IA = 2ID \text{ يعني } 3IA = 2(AI + AD)$$

$$\text{يعني } 3IA - 2AI = 2AD \text{ يعني } AI = 2AD \text{ يعني } IK = AD = AK$$

(-4) K منتصف $[AI]$ إذن $AK = IK = (AD = AB)$ و بالتالي KBD قائم الزاوية في B
(لأن منتصف أحد أضلاعه متقايس البعد عن رؤوسه الثلاث)

28



(1) بمأن $AO = OB = OC$ و O منتصف $[AB]$ فإن المثلث ABC قائم الزاوية في C
(لأن منتصف أحد أضلاعه متقايس البعد عن رؤوسه الثلاث)

(2) بمأن $(CB) \parallel (DO)$ و O منتصف $[AB]$ إذن حسب نظرية طالس: $\frac{AO}{AB} = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$

إذن: $AC = 2AD$ يعني D منتصف $[AC]$


(3) - أ) بمأن $[CO]$ و $[DB]$ هما المتوسطين الصادرين من B و C في المثلث ABC

إذن G هي مركز ثقل المثلث ABC

ب) بمأن G هي مركز ثقل المثلث ABC فإن: $GC = \frac{2}{3} OC = \frac{2}{3} \times 6 = 4$


العلاقات القياسية في المثلث القائم

الدرس عدد 11:

تمرين 1نرمز بالحرف d إلى عرض الشارع.

إذن حسب نظرية بيتاغور في المثلث القائم في نقطة تثبيت الفانوس نحصل على :

$$d = \sqrt{244} = 15,62 \text{ m} \quad \text{إذن: } d^2 = 10^2 + 12^2 = 100 + 144 = 244$$

تمرين 2

في المثلث ADC القائم في A لدينا حسب نظرية بيتاغور:

$$AC = \sqrt{13} = 3,61 \text{ cm} \quad \text{إذا } AC^2 = AD^2 + CD^2 = 4 + 9 = 13$$

و في المثلث ABD القائم في A لدينا :

$$BD = \sqrt{29} = 5,39 \text{ cm} \quad \text{إذن } BD^2 = AD^2 + AB^2 = 4 + 25 = 29$$

لتكن النقطة I المسقط العمودي للنقطة C على (AB) إذن نحصل على مثلث قائم CIB حيث :

$$BC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} = 2,84 \text{ cm} \quad \text{إذن } BC^2 = AD^2 + IB^2 = 4 + 4 = 8$$

تمرين 3نحسب ارتفاعه h حيث : $150^2 = h^2 + 50^2$ إذن:

$$h^2 = 150^2 - 50^2 = 22500 - 2500 = 20000$$


$$h = \sqrt{20000} = 141,42 \text{ m} \quad \text{إذن:}$$

$$S = \frac{\text{قاعدة} \times \text{ارتفاع}}{2} = \frac{100 \times 141,42}{2} = 7071 \text{ m}^2 \quad \text{و بالتالي قيس مساحتها بالمتر المربع هي :}$$

$$S = \frac{100 \times 14142}{2} = 7071 \text{ m}^2 = 7071 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 \quad \text{و مساحتها بالصنمقتر المربع هي :}$$

تمرين 4

يتم استعمال هذا الحبل بتكوين مثلث أبعاده بالعقد 3 و 4 و 5


تمرين 5

* نبدأ بالبحث على طول الظل يمثل 90% من طول العمود و نرمز له بالحرف b إذن :

$$b = \frac{3 \times 90}{100} = 2,9 \text{ m}$$

إذن المسافة الفاصلة بين قمة العمود و طرف الظل و نرمز لها بالحرف L إذن :

$$L = \sqrt{17,41} = 4,17 \text{ m} \text{ و بالتالي } L^2 = 3^2 + (2,9)^2 = 9 + 8,41 = 17,41$$

تمرين 6

(أ) في المثلث CIB القائم في B لدينا حسب نظرية بيتاغور:

$$IC^2 = BC^2 + IB^2 = 3^2 + 9^2 = 9 + 81 = 90$$


و بالتالي : $IC = \sqrt{90} = 3\sqrt{10} = 3 \times 3,17 = 9,51 \text{ m}$

في المثلث AID القائم في A لدينا حسب نظرية بيتاغور:

$$ID = \sqrt{10} = 3,17 \text{ cm} \text{ إذن } ID^2 = AD^2 + IA^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10$$

(ب) بما أن : $IC^2 = 90$ و $ID^2 = 10$ إذن : $CD^2 = ID^2 + IC^2 = 10 + 90 = 100$

إذن حسب عكس نظرية بيتاغور المثلث CID قائم الزاوية في I

تمرين 7

نبدأ بحساب OB حيث في المثلث OAB و حسب نظرية بيتاغور :

$$OB = \sqrt{41} = 6,4 \text{ cm} \text{ إذن } OB^2 = 4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$$

ثم نحسب OC حيث في المثلث OCB : $OC^2 = BC^2 - OB^2 = 49 - 41 = 8$ إذن

$$OC = \sqrt{8} = 2,84 \text{ cm}$$


ثم نحسب OD حيث في المثلث OCD و حسب نظرية بيتاغور:

$$OD = \sqrt{28} = 5,3 \text{ cm} \text{ إذن } OD^2 = DC^2 - OC^2 = 36 - 8 = 28$$

وأخيرا نحسب OE حيث في المثلث OED و حسب نظرية بيتاغور:

$$DE = \sqrt{53} = 7,28 \text{ cm} \text{ إذن } DE^2 = OE^2 + OD^2 = 25 + 28 = 53$$

تمرين 8



نحسب أطوال المسالك الثلاث : X-A-Y أو X-B-Y أو X-C-Y

طول المسلك X-A-Y :

$$AY + XA = \sqrt{4^2 + 3^2} + \sqrt{8^2 + 3^2} = \sqrt{25} + \sqrt{73} = 5 + 8,5 = 13,5 \text{ m}$$

طول المسلك X-B- Y :

$$BY + XB = \sqrt{8^2 + 3^2} + 4 = \sqrt{73} + 4 = 8,54 + 4 = 12,54 \text{ m}$$

طول المسلك X-C-Y :

$$CY + XC = 3 + \sqrt{4^2 + 8^2} = 3 + \sqrt{80} = 3 + 8,95 = 11,95 \text{ m}$$


إذن المسلك الأقل تكلفة هو : X-C-Y لأنه أقل طولاً.

تمرين 9

نمثل هذه الوضعية بالرسم التالي حيث نرسم للشاحنة

بالمستطيل ABCD .

ونحسب البعد OB حيث :




حسب نظرية بيتاغور في المثلث BAO لدينا:

$$OB = \sqrt{11,25} = 3,35 \text{ m} \text{ إذن } OB^2 = AB^2 + OA^2 = 1,5^2 + 3^2 = 2,25 + 9 = 11,25$$

إذن يمكن لهذه الشاحنة العبور لأن البعد OB أقل من شعاع النفق $3,5\text{m}$: $(3,35 < 3,5)$

تمرين 12


طريقة أولى



$$AB^2 = 7^2 + 1 = 50$$


$$AB = \sqrt{50} \text{ يعني}$$

طريقة ثانية



$$KA = AB = \sqrt{50} \text{ يعني } KA^2 = AB^2 = 5^2 + 5^2 = 50$$

تمرين 13



نرسم مستطيلا قطره a و طوله b


و عرضه $BC = l$


$$\text{و نحصل على } a^2 = b^2 + l^2$$

$$\text{إذا على } l^2 = a^2 - b^2 \text{ و بالتالي: } l = \sqrt{a^2 - b^2}$$

تطبيق:

بما أن $55 = 64 - 9 = 8^2 - 3^2$ إذن لبناء قطعة مستقيم طولها $\sqrt{55}$ بالصنتمتر نرسم مثلثا قائما وتره 8 cm و أحد ضلعيه القائمين 3 cm و يكون طول الضلع الثالث $\sqrt{55} \text{ cm}$ كالتالي : حيث C المسقط العمودي لـ A على (BC)




تمرين 14

D منازرة النقطة A بالنسبة إلى المستقيم (BC) ينتج عنه $(BC) \perp (AD)$ و $DC = BD = AB = 5\text{cm}$ (لأن منازرة القطع [AB] بالنسبة إلى المستقيم (BC) هي القطعة [BD])
 إذن الرباعي ABDC معين (لأنه متعامد القطرين و متقايس الأضلاع)
 ونحسب ارتفاع المثلث ABC كالتالي: $IA^2 = 5^2 - 2,5^2 = 25 - 6,25 = 18,75$

$$\text{يعني : } IA = \sqrt{18,75} = 4,33 \text{ cm}$$

$$\text{إذا مساحته } S = \frac{5 \times 8,66}{2} = 5 \times 4,33 = 21,65 \text{ cm}^2 \text{ هي}$$

تمرين 15

نقسم الشكل إلى مثلثين ADB و BDC:

$$\text{مساحة BCD } S_1 \text{ ونرمز لها بالحرف : } S_1 \text{ إذا } S_1 = \frac{1,5 \times 1,5}{2} = 1,125 \text{ cm}^2$$

مساحة ADB ونرمز لها بالحرف : S_2 ونبدأ بحساب البعد BD.

$$\text{و بالتالي : } BD^2 = 1,5^2 + 1,5^2 = 2,25 + 2,25 = 4,5 \text{ cm} \text{ } BD = \sqrt{4,5} = 2,12$$

$$\text{ثم حساب } h \text{ ارتفاع المثلث ABD حيث : } AD^2 = h^2 + \left(\frac{DB}{2}\right)^2 = h^2 + \frac{4,5}{4}$$

$$h^2 = AD^2 - \frac{4,5}{4} = 5^2 - 1,125 = 25 - 1,125 = 23,87$$

$$\text{و بالتالي : } h = \sqrt{23,87} = 4,88 \text{ cm}$$

$$\text{إذن } S_2 = \frac{BD \times h}{2} = \frac{2,12 \times 4,88}{2} = 5,17 \text{ cm}^2$$

وأخيرا مساحة الرباعي ABCD ونرمز لها بـ S حيث: $S = S_1 + S_2 = 1,13 + 5,17 = 6,30 \text{ cm}^2$

ب) المثلثان IAT و IKT قائمان في A و K على التوالي و $IK = IA$ و $[IT]$ صلح مشترك : متقايسان

ج) و ينتج عن تقايسهما تقايس العناصر النظيرة مثنى- مثنى و منها : $KT = AT$

و بنفس الطريقة في المثلثين JBT و JKT نتحصل على : $KT = BT$ و بالتالي : $BT = AT$

يعني T منتصف [AB].

د) في المثلثين IAT و JBT القائمين في A و B على التوالي ، لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$IT = \sqrt{10} \quad \text{إذا} \quad IT^2 = IA^2 + AT^2 = 2^2 + \left(\frac{\sqrt{24}}{2}\right)^2 = 4 + 6 = 10$$

$$JT = \sqrt{15} \quad \text{إذا} \quad JT^2 = JB^2 + BT^2 = 3^2 + \left(\frac{\sqrt{24}}{2}\right)^2 = 9 + 6 = 15$$

و بالتالي : $IT^2 + JT^2 = 25 = IJ^2$ يعني أن المثلث ITJ قائم الزاوية في T

هـ) ينتج عن تقايس المثلثين IAT و IKT تقايس العناصر النظيرة مثنى - مثنى و منها :

$KT = AT$ و $IK = IA$ و بالتالي (IT) هو المتوسط العمودي لـ [AK] إذن : $AN = \frac{AK}{2}$ ،

وفي المثلث القائم IAT نتحصل على : $TA \times IA = AN \times IT = \frac{AK}{2} \times IT$ و بالتالي :

$$KA = \frac{2(IA \times TA)}{IT} = \frac{2\left(2 \times \frac{\sqrt{24}}{2}\right)}{\sqrt{10}} = \frac{2\sqrt{24}}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{2,4} \quad \text{يعني} \quad AK \times IT = 2(IA \times TA)$$

و) المثلث AKB قائم الزاوية في K لأن T منتصف [AB] و $TA = BT = TK$

و حسب بيتاغور : $BK^2 = AB^2 - AK^2 = 24 - 4,8 = 19,2$ إذا $BK = \sqrt{19,2}$

ز) الرباعي KMTN هو مستطيل لأن الزاويتين \hat{K} و \hat{T} متقابلتان و متقايسان و قيس كل منها 90°

و $(KA) \perp (IT)$ (لأن : $AI = KI$ و $KT = TA$)

تمرين 18

$OD = 16\text{cm}$ و $OE = 20\text{cm}$ و $(OF) \perp (AB)$

أ) في المثلث DEO القائم في O لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$ED^2 = DO^2 + OE^2 = 16^2 + 20^2 \\ = 256 + 400 = 656$$

إذن : $ED = \sqrt{656} = 25,6 \text{ cm}$


ب) في المثلث AEO القائم في O لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$AE^2 = AO^2 + OE^2 = x^2 + 20^2 = x^2 + 400$$

إذن : $AE = \sqrt{x^2 + 400}$

$$AD = AO + OD = x + 16$$

كتابة أولى:



$$AD^2 = AE^2 + DE^2 = x^2 + 400 + 656 = x^2 + 1056 \quad \text{كتابة ثانية:}$$

$$AD = \sqrt{1056 + x^2} \quad \text{يعني:}$$

$$x + 16 = \sqrt{1056 + x^2} \quad \text{(ت) ونستنتج أن: شعاع الدائرة } \mathcal{C} \text{ هو } x \text{ حيث:}$$

$$(x + 16)^2 = 1056 + x^2 \quad \text{يعني:}$$

$$x^2 + 32x + 256 = 1056 + x^2 \quad \text{يعني:}$$


$$32x = 1056 - 256 = 800 \quad \text{يعني:}$$

$$(x = 25 \text{ cm} \quad \text{يعني: (و هو شعاع الدائرة } \mathcal{C} \text{)})$$

و بالتالي شعاع الدائرة ' \mathcal{C} ' و نرسم له بالحرف y حيث :

$$y = \frac{x+16}{2} = \frac{25+16}{2} = \frac{41}{2} = 20,5 \text{ cm}$$

تمرين 19



$$AI^2 = AB^2 + IB^2 = 3^2 + 3^2 = 18 \quad \text{(أ) في المثلث ABI القائم في B لدينا:}$$

$$AI = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ cm} \quad \text{يعني}$$

$$CD^2 = CH^2 + DH^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \quad \text{و في المثلث HCD القائم في H لدينا:}$$

$$DC = \sqrt{25} = 5 \text{ cm} \quad \text{يعني}$$

(ب) طريقة أولى:

$$DJ^2 = DC^2 + CJ^2 = 5^2 + CJ^2 \quad \text{في المثلث DCJ القائم في C لدينا:}$$

$$CJ^2 = DJ^2 - 5^2 = (4 + HJ)^2 - 5^2 \quad \text{يعني:}$$

$$CJ^2 = 4^2 + 8JH + HJ^2 - 25 = 8JH + HJ^2 - 9 \quad \text{يعني:}$$

طريقة ثانية:

$$CJ^2 = HC^2 + HJ^2 = 9 + HJ^2 \quad \text{في المثلث HCJ القائم في H لدينا:}$$

$$JH = \frac{9}{4} \text{ يعني } 8JH = 18 \quad \text{(ج) وبالتالي: } 9 + HJ^2 = 8JH + HJ^2 - 9 \quad \text{إذن:}$$

و في المثلث CDJ القائم في C لدينا : $DJ \times HC = CD \times JC$ يعني :

$$CJ = \frac{CH \times DJ}{CD} = \frac{3 \times (4+HJ)}{5} = \frac{12+3HJ}{5} = \frac{12+3 \times \frac{9}{4}}{5} = \frac{48+27}{20} = \frac{75}{20} = \frac{15}{4} \text{ cm}$$

وبالتالي : $DJ = HD + JH = 4 + \frac{15}{4} = \frac{31}{4} \text{ cm}$ و $AJ = AH - HJ = 4 - \frac{15}{4} = \frac{1}{4} \text{ cm}$

(د) محيط الرباعي AICJ و نرسم له بالحرف P هو :

$$P = AI + CJ + AJ + IC = 3\sqrt{2} + \frac{15}{4} + \frac{1}{4} + 1 = 3\sqrt{2} + 5 \text{ cm}$$

و مساحة الرباعي AICJ و نرسم لها بالحرف S :

$$S = \frac{(CI+AJ) \times AB}{2} = \frac{(1+\frac{1}{4}) \times 3}{2} = \frac{(\frac{15}{4})}{2} = \frac{15}{8} \text{ cm}^2$$

تمرين 20

نحسب حجمها و نرسم له بالحرف V :

$V = S \times 0,5$ حيث S هي مساحة قاعدة هذا الموشور القائم

لحساب S نحسب القاعدة الصغرى و نرسم لها بالحرف x

(مع الملاحظة أن المثلث BCD متقايس الأضلاع)

لأنه متقايس الضلعين إحدى زواياه 60°)

إذن في المثلث ABD القائم في A لدينا حسب نظرية بيتا غور :

$$x = \frac{5}{\sqrt{2}} \text{ يعني } x^2 = \frac{25}{2} \text{ يعني } 5^2 = x^2 + x^2 = 2x^2$$

$$S = \frac{(5 + \frac{5}{\sqrt{2}}) \times \frac{5}{\sqrt{2}}}{2} = \frac{\frac{25}{\sqrt{2}} + \frac{25}{4}}{2} = \frac{\frac{50\sqrt{2} + 25}{4}}{2} = \frac{50\sqrt{2} + 25}{8} = 11,96 \text{ cm}^2$$
 : وبالتالي

$$V = 11,96 \times 0,5 = 5,98 \text{ cm}^3 \text{ إذن}$$

$$P = 19,3 \times 5,98 = 115,414 \text{ g} \text{ إذن : } P \text{ بالحرف له}$$


$$115,414 \times 10 = 1154,14 \text{ د} \text{ وأخيرا ثمنها هو}$$

تمرين 21

(أ) نبدأ بملاحظة أن المثلث ABC قائم في A لأنه يقبل الإرتسام

داخل دائرة أحد أضلاعه قطرا لها و بالتالي :

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$



* نرسم لها بالحرف S_2 إلى مساحة نصف القرص الدائري المحدود بـ C_2 : $S_2 = \frac{\pi \times (\frac{AC}{2})^2}{2} = \pi \times \frac{CA^2}{8}$ إذن :

* ونرمز لها بالحرف S_3 إلى مساحة نصف القرص الدائري المحدود بـ C_3 إذن: $S_3 = \frac{\pi \times (\frac{AB}{2})^2}{2} = \pi \times \frac{BA^2}{8}$

* ونرمز لها بالحرف S_1 إلى مساحة نصف القرص الدائري المحدود بـ C_1 إذن: $S_1 = \frac{\pi \times (\frac{CB}{2})^2}{2} = \pi \times \frac{BC^2}{8}$

$$S_1 = \pi \times \frac{BC^2}{8} = \frac{\pi}{8} \times BC^2 = \frac{\pi}{8} \times (AC^2 + AB^2) = S_2 + S_3 \quad \text{و بالتالي :}$$

(ب) مساحة المنطقة الملونة بالأزرق ونرمز لها بالحرف s : إذن : $s = (S_2 + S_3 + \frac{AC \times AB}{2}) - S_1$

و بما أن $S_1 = S_2 + S_3$ فإن : $S_1 = S_2 + S_3$ فإن : $s = (S_2 + S_3 + \frac{AC \times AB}{2}) - S_1 = S_1 + \frac{AC \times AB}{2} - S_1 = \frac{AC \times AB}{2}$

تمرين 22

(أ) إذا كان $y_A = y_B$ فإن $(AB) \parallel (OI)$ و $y_A - y_B = 0$ بالتالي :

$$AB = |x_B - x_A| = \sqrt{(x_B - x_A)^2}$$

(ب) إذا كان $x_B = x_A$ فإن $(AB) \parallel (OJ)$ و $x_B - x_A = 0$ بالتالي :

$$AB = |y_B - y_A| = \sqrt{(y_B - y_A)^2}$$

(ت) إذا كان $x_B \neq x_A$ و $y_A \neq y_B$ فإن $(AC) \parallel (OJ)$ لأن A و C لهما نفس


الفاصلة و $(BC) \parallel (OI)$ لأن B و C لهما نفس الفاصلة إذن $(AC) \perp (BC)$ يعني المثلث ABC قائم في C

وبالتالي: $AB^2 = AC^2 + BC^2$ يعني $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

تمرين 23

(أ) انظر الرسم

(O,I,J) معين متعامد في المستوي.



$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-1 - 4)^2 + (-2 - 3)^2} \quad (\text{ب})$$

$$= \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2} = \sqrt{50}$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{\left(-\frac{7}{2} + 1\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + 2\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{50}{4}}$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{\left(-\frac{7}{2} - 4\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - 3\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{7}{2} - \frac{8}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{6}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-15}{2}\right)^2 + \left(\frac{-5}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{250}{4}}$$

$$AC^2 + AB^2 = \frac{50}{4} + 50 = \frac{50}{4} + \frac{200}{4} = \frac{250}{4} = BC^2$$

و بالتالي :

إذن حسب عكس نظرية بيتاغور فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A


أنشطة حول رباعيات الأضلاعدرس عدد 12
مسائل تأليفيةمسألة تأليفية عدد 1

وحدة قياس الطول هي السنتيمتر

(1 - أ) و ب) انظر الرسم

(ج) في المثلث ACD القائم في A لدينا: $CD^2 = AC^2 + AD^2 = (3\sqrt{2})^2 + (\frac{6}{4})^2$

$$= 18 + \frac{9}{4} = \frac{72}{4} + \frac{9}{4} = \frac{81}{4}$$

و بالتالي: $CD = \frac{9}{2}$ في المثلث ABC القائم في A لدينا: $CB^2 = AC^2 + AB^2 = (3\sqrt{2})^2 + 6^2 = 18 + 36 = 54$ و بالتالي: $CB = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ (د) بما أن: $CD = \frac{9}{2} = 4,5$ و $BD = \frac{3}{4} AB = \frac{3}{4} \times 6 = 4,5$

و بالتالي فإن المثلث BDC متقايس الضلعين في D

(2) بما أن: $DC = DB = ED$ و D و B و E على استقامة واحدة

إذن D هي مركز دائرة مارة من C و B و E حيث [DE] قطرها إذن المثلث BCE قائم الزاوية في C.

(3 - أ) بما أن $(DF) \parallel (CE)$ إذا حسب نظرية طالس نحصل على: $\frac{FD}{CE} = \frac{AF}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{1}{2}$ (ب) بما أن: $\frac{AF}{AC} = \frac{1}{2}$ فإن $AC = 2AF$ يعني $AF = \frac{AC}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ (ج) بما أن: $\frac{FD}{CE} = \frac{1}{2}$ و بما أن $(CE) \parallel (HD)$ و D منتصف [BE] فإن: $DF = HD$ يعني D منتصف [HF]

و بالتالي الرباعي EFBH متوازي الأضلاع (لأن قطريه يتقاطعان في منتصفهما).

(د) لدينا $DF = HD = \frac{AC}{2}$ (يعني $HF = AC$) و $(CE) \parallel (HD)$:

إذن الرباعي FHCE متوازي أضلاع له زاوية قائمة إذن فهو مستطيل.

(3) – أ) المثلث BCI مرتسم داخل الدائرة C حيث ضلعه [BC] قطرها لها :

إذن المثلث BCI قائم في I يعني $(CD) \perp (BI)$

و بالتالي $(BI) \parallel (EC)$ لأنهما يتعامدان على نفس المستقيم (CD)

ب) بما أن النقطة B منتصف [CE] و $(BI) \parallel (EC)$:

$$\text{إذن حسب نظرية طالس: } I \text{ منتصف [DC] و } BI = \frac{CE}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

(4) – أ) في المثلث AEC لدينا : $(BF) \parallel (EC)$ و $Be(AE)$ و $Fe(AC)$, إذن حسب نظرية طالس :

$$\text{إذن : } CE = 2BF \quad \frac{AB}{AE} = \frac{BF}{EC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

ب) الرباعي EFDI متوازي أضلاع لأن قطريه [ED] و [FI] يتقاطعان في منتصفهما B .

ج) الرباعي EFIC مستطيل لأن ضلعيه [IF] و [CE] متقايسان و متوازيان (لأنهما متعامدان على

نفس المستقيم (IC)) و له زاوية قائمة في I.

(5) – أ) في المثلث CEM لدينا : $(BI) \parallel (EC)$ و $Be(MC)$ و $Ie(ME)$, إذن حسب نظرية طالس :

$$\left(\text{لأن في المثلث ECD : } (BI) \parallel (EC) \text{ و } I \text{ منتصف [DC]} \right) \frac{BI}{CE} = \frac{MB}{MC} = \frac{1}{2}$$

$$\text{و بالتالي } \frac{MB}{MC} = \frac{1}{2} \text{ ينتج عنه : } \frac{MB}{1} = \frac{MC}{2} \text{ إذن : } \frac{MB}{1} = \frac{MC}{2} = \frac{MB+MC}{3} = \frac{BC}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\text{و بالتالي : } MC = BC - MB = 6 - 2 = 4$$

ب) بما أن M هي مركز ثقل المثلث CDE لأنها نقطة تقاطع الموسطين [BC] و [EI] الصادرين

من C و E و بالتالي المستقيم (DM) الحامل للموسط الصادر من D يقطع [EC] في المنتصف.

مسألة عدد 3

وحدة قياس الطول هي السنتيمتر

(1) IBA مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسية I حيث :

$$IA = 3 \text{ و } AB = 4 \text{ و } C \text{ مناظرة } B \text{ بالنسبة إلى } I$$

أ) انظر الرسم


ب) المثلث ABC قائم في A لأن : I منتصف [BC] و $IB = IC = IA = 3$

مسألة عدد 4

وحدة قياس الطول هي السنتيمتر

1- أ) انظر الرسم

معين متعامد في المستوي. (O,I,J)



ب) المستقيمان (EA) و (OI) متوازيان لأن النقطتين A و E لهما نفس الترتيبية

(2 - أ) بما أن C هي منازرة A بالنسبة إلى O فإن إحداثيات C متقابلة مع إحداثيات A

يعني: $C(-2,-4)$

و بما أن D منتصف [EC] فإننا نتحصل على إحداثيات D كالتالي :

$$D(-3,0) \text{ يعني } y_D = \frac{y_E + y_C}{2} = \frac{4 - 4}{2} = 0 \text{ و } x_D = \frac{x_E + x_C}{2} = \frac{-4 - 2}{2} = -3$$

$$AE = |x_A - x_E| = |2 - (-4)| = |2 + 4| = 6 \quad (3)$$

(4 - أ) بما أن إحداثيات B و D متقابلة إذن B و D متناظران بالنسبة إلى O

و إحداثيات A و C متقابلة إذن A و C متناظران بالنسبة إلى O و بالتالي الرباعي ABCD متوازي أضلاع , لأن قطريه متقاطعان في منتصفهما O .

ب) الرباعي AHCK متوازي أضلاع لأن قطريه متقاطعان في منتصفهما O .

(5 - أ) الرباعي AEFC متوازي أضلاع لأن قطريه متقاطعان في منتصفهما D .


ب) المستقيم (FC) مواز لـ : (OI) إذن : $y_G = y_C = -4$ و (FC) يقطع (OJ) في النقطة G يعني $x_G = 0$ إذن : $G(0, -4)$.

* و AEFC متوازي أضلاع إذن: $CF = AE = 6$ و F تنتمي إلى (CG) فإن :
 $y_F = y_C = -4$. و بما أن C و G و F على استقامة واحدة و $CF = 6$ فإن :
 $x_F = x_C - 6$ يعني : $x_F = -2 - 6 = -8$ و بالتالي (-8, -4)

مسألة تأليفية عدد 5

وحدة قياس الطول هي السنتمتر

(1) (O,I,J) معين متعامد في المستوي حيث $OI=OJ$.



(1) - أ) انظر الرسم

ب) المستقيمان (CD) و (OJ) متعامدان لأن النقطتين C و D نفس الترتيبية.

$$OC = \sqrt{(x_C - x_O)^2 + (y_C - y_O)^2} = \sqrt{(1 - 0)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{10} \quad \text{ج}$$

$$= \sqrt{(1)^2 + (3)^2} = \sqrt{10}$$

$$y_E = \frac{y_C + y_A}{2} = \frac{3 + 2}{2} = 2,5 \quad \text{و} \quad x_E = \frac{x_C + x_A}{2} = \frac{1 + 4}{2} = 2,5 \quad \text{إذن : E منتصف [AC]}$$

$$x_B = 5 \quad \text{حيث B (أ) - (3) حيث E منتصف [OB] إذن : } x_E = \frac{x_O + x_B}{2} = \frac{x_B}{2} = 2,5 \quad \text{يعني } x_E = 5$$

$$\text{و } y_B = 5 \quad \text{يعني } y_E = \frac{y_O + y_B}{2} = \frac{y_B}{2} = 2,5$$

إذن إحداثيات B هي B(5,5).

ب) الرباعي OABC متوازي أضلاع لأن قطريه [OB] و [AC] يتقاطعان في منتصفهما E

(4) - أ) إحداثيات F : بما أن E منتصف [AC] و (EF) // (OC) إذن حسب نظرية طالس في

المثلث ACO فإن F منتصف [OA] و بالتالي :


$$F(2, 1) \text{ يعني } y_F = \frac{y_O + y_A}{2} = \frac{0+2}{2} = 1 \text{ و } x_F = \frac{x_O + x_A}{2} = \frac{0+4}{2} = 2$$

$$EF = \sqrt{(x_F - x_E)^2 + (y_F - y_E)^2} = \sqrt{(0,5)^2 + (1,5)^2} = \sqrt{2,5} \text{ (ب)}$$

مسألة تأليفية عدد 6

وحدة قياس الطول هي السنتمتر

(1) (O,I,J) معين متعامد في المستوي حيث $OI = OJ$.



(1) - أ) و ب) انظر الرسم

ج) إحداثيات B هي:

بما أن CBOA مستطيل فإن $AC = BO$ إذن :

$$x_B - 0 = 3 \text{ يعني } x_B - x_O = 3 \text{ إذن } |x_B - x_O| = |x_A - x_C| = |3 - 0| = 3$$

$$\text{و } y_B - 0 = 2 \text{ يعني } y_B - y_O = 2 \text{ إذن } |y_B - y_O| = |y_A - y_C| = |0 - 2| = 2$$

و بالتالي : $B(3, 2)$

(2) - أ) النقطة E مناظرة C بالنسبة إلى B إذن إحداثيات E هي : $E(6, 2)$

ب) بما أن $BE = OA$ و $(BE) // (OA)$ إذن الرباعي OAEB متوازي أضلاع

ج) B منتصف [CE] و $(EC) \perp (AB)$ إذن $AC = AE$:

يعني المثلث ACE متقايس الضلعين في A

(3) - أ) F مناظرة A بالنسبة إلى B يعني B منتصف [AF] إذن :

$$x_F = 3 : \text{بالتالي } 3 + x_F = 6 \text{ يعني } x_B = \frac{x_A + x_F}{2} = \frac{3 + x_F}{2} = 3$$

$$F(3, 4) : \text{بالتالي } y_F = 4 \text{ يعني } y_B = \frac{y_A + y_F}{2} = \frac{0 + y_F}{2} = 2 \text{ و}$$

(ب) بما أن B هو منتصف مشترك للقطعتين [CE] و [AF] المتعامدتين فإن الرباعي ACFE معين.

(4) في المثلث ACF حيث [BC] و [FH] الوسطين الصادرين من C و F و حيث $KC = \frac{2}{3} BC$


يعني K تمثل مركز ثقل المثلث ACF ؛

و بالتالي $K \in [FH]$ يعني النقاط F و H و K على استقامة واحدة

مسألة تأليفية عدد 7

وحدة قياس الطول هي السنتيمتر

(1) (O, I, J) معين متعامد في المستوي حيث $OI = OJ$.



(أ) و (ب) انظر الرسم

$$\text{ج) } K \text{ منتصف } [OB] \text{ إذن: } y_K = \frac{y_O + y_B}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0$$

$$\text{و } x_K = \frac{x_O + x_B}{2} = \frac{0 + 3}{2} = \frac{3}{2} \text{ إذن إحداثيات } K \text{ هي: } K\left(\frac{3}{2}, 0\right)$$

إحداثيات A : بما أن K هي المسقط العمودي لـ A على (OI) إذن: $x_A = \frac{3}{2}$

و $y_A = AK$ وحسب نظرية بيتاغور في المثلث AOK القائم في K نحصل على :

$$y_A = \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3}{2} \sqrt{3} \text{ إذن: } y_A^2 = 9 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9 - \frac{9}{4} = \frac{36}{4} - \frac{9}{4} = \frac{27}{4}$$

و بالتالي : $A\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \sqrt{3}\right)$

(2 - أ) مناظرة A بالنسبة إلى المستقيم (OI) إذن A و C لهما نفس الفاصلة و ترتيبتان متقابلتان يعني : إحداثيات C هي : $C(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\sqrt{3})$

ب) الرباعي ABCO هو معين لأنه متوازي أضلاع قطراه متعامدان في منتصفهما K.

(3 - أ) بما أن الرباعي ABCO هو معين فإن : $(CO) \parallel (AB)$ يعني $(CD) \parallel (AB)$

و بالتالي الرباعي ABCD شبه منحرف و بما أن : $AB = CO = DO$

فإن الرباعي ABDO معين إذن $AD = AB = CB$

يعني الرباعي ABCD شبه منحرف متقايس الضلعين

ب) محيط شبه المنحرف ABCD و نرسم له بالحرف P إذن :

$$P = 3 \times 5 = 15 \text{ cm}$$

و لحساب مساحته, نحسب أولاً ارتفاعه و نرسم له بالحرف h حيث : $h = AK = \frac{3}{2}\sqrt{3}$ (لأن

المثلث OBA متقايس الأضلاع)

$$S = \frac{6+3}{2} \times \frac{3}{2}\sqrt{3} = \frac{9}{2} \times \frac{3}{2}\sqrt{3} = \frac{27}{4}\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

(4 - أ) E مناظرة D بالنسبة إلى A و $(OI) \parallel (AD)$ إذن E و D لهما نفس الترتيبية

يعني $y_E = \frac{3}{2}\sqrt{3}$ و أما x_E فهي تساوي : $x_E = 3 + x_A = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$

و بالتالي إحداثيات E هي : $E(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\sqrt{3})$

ب) المثلث EDC متقايس الأضلاع لأنه حسب نظرية طالس :

$$. EC = DC = ED = 2AO = 2AB = 2OB$$


ج) مساحة المثلث DEC هي : $S = \frac{AC \times DE}{2} = \frac{3\sqrt{3} \times 6}{2} = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

ومحيط المثلث DEC هو : $P = 6 \times 3 = 18 \text{ cm}$

(5) بما أن G هي مركز ثقل المثلث DEC لأنها نقطة تقاطع المتوسطين الصادرين من C و D

إذن فهي تبعد عن كل رأس بـ : $\frac{2}{3}$ من طول المتوسط, إذن :

$$DG = \frac{2}{3} BD = \frac{2}{3} AC = \frac{2}{3} 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

مسألة تأليفية عدد 8

(ب) حسب نظرية بيتاغور في المثلث EFG القائم في F لدينا :

$$GE^2 = EF^2 + FG^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

$$GE = \sqrt{25} = 5 : \text{ إذن}$$

(ج) و بما أن منتصف الوتر في المثلث القائم هي نقطة متقايسة البعد عن رؤوس المثلث الثالث

$$\text{فإن : } FO = \frac{EG}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$$

(2) المثلث EGK متقايس الضلعين لأنه حسب نظرية طالس :

$$EK = 2OF = 5 = EG : ((EK) // (OF) \text{ و } O \text{ منتصف } [EG])$$

(3 - أ) بما أن M هي مركز ثقل المثلث EGK لأنها نقطة تقاطع الموسطين الصادرين من E و K

إذن فهي تبعد عن كل رأس بـ: $\frac{2}{3}$ من طول الموسط, إذن :

$$EM = \frac{2}{3} EF = \frac{2}{3} \times 3 = 2$$

(ب) بما أن M هي مركز ثقل المثلث EGK فإن المستقيم (GA) يحمل الموسط [GA] الصادر

من G إذن فهو يمر من منتصف الضلع [EK] المقابل لـ : G يعني A منتصف [EK].

(ج) الرباعي EAFO معين لأنه متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان (بتطبيق نظرية

طالس في المثلث EGK)

(4) النقطة F تنتمي إلى الدائرة C لأن: $OF = OG = OE$ (حسب السؤال الأول)

(5) في المثلث KGD لدينا : $(GD) \parallel (EF)$ و F منتصف [GK] إذن حسب عكس نظرية طالس E منتصف [DK]

(المستقيم الذي يمر من منتصف ضلع في مثلث و مواز لضلع آخر يمر من منتصف الضلع الثالث)

(6) – أ) بما أن المثلثين EPG و ENG مرتسمان داخل الدائرة C حيث ضلعهما المشترك [EG]

هو قطرا لها إذن فهما مثلثان قائمان في P و N على التوالي و بالتالي يكون [EP] و [NG]

الارتفاعين الصادرين من في المثلث EGD

ب) بما أن [EP] و [NG] ارتفاعين في المثلث EGD إذن: $ED \times GN = GD \times EP$

حيث: $GD = 2EF = 2 \times 3 = 6$ و $ED = EG = 5$ و $EP = FG = 4$

$$\text{و بالتالي: } GN = \frac{EP \times GD}{ED} = \frac{4 \times 6}{5} = \frac{24}{5}$$

ج) بما أن النقطة Q هي نقطة تقاطع الارتفاعين الصادرين من G و E في المثلث EGD

فهي تمثل المركز القائم للمثلث EGD و بالتالي يكون المستقيم (DQ) حاملا للارتفاع

الصادر من D يعني $(EG) \perp (DQ)$

درس عدد 13 التعامد في الفضاءإصلاح تمارين (استحضر)تمرين (1)

$(IC) \not\subset (BFC)$, $(JG) \subset (DCH)$, $I \in (ACG)$, $B \notin (EFG)$
 $(GI) \not\subset (CEA)$, $(AJ) \subset (HED)$, $(EJ) \not\subset (CGD)$, $J \notin (CEA)$

تمرين (2)

- (1) (DC) و (CA) هما مستقيمان متقاطعان
- (2) (DC) و (BA) هما مستقيمان ليسا في نفس المستوي
- (3) (MQ) و (NQ) هما مستقيمان متقاطعان
- (4) (DB) و (CA) هما مستقيمان ليسا في نفس المستوي
- (5) (MQ) و (BC) هما مستقيمان ليسا في نفس المستوي
- (6) (MN) و (CA) هما مستقيمان متوازيان

تمرين (3)

أ) النقطة K تنتمي إلى المستوي (JNI) لأن المستوي (JNI) يتطابق مع المستوي (JKI)

(لأن $M = (IN) \cap (KJ)$)

ب) بما أن $N \in (IM)$ و $(IM) \subset (MNO)$ إذن $I \in (MNO)$

ج) النقاط M و N و K و O لا تنتمي إلى نفس المستوي لأن المستقيمين (KO) و (MN) ليسا في نفس

المستوي لأنهما ليسا متوازيين ولا متقاطعين

تمرين (4)


أ) النقاط A و B و C تنتمي إلى المستطيل DBCA و النقاط I و D و C تنتمي إلى المستطيل DBCA

إذن كلا المجموعتين من النقاط تمثل نفس المستوي.

ب) النقاط I و A و D و E لا تنتمي إلى نفس المستوي لأن المستقيمين (AE) و (ID) ليسا متقاطعين و

لا متوازيين

ج) المستويان (DEB) و (CAE) يحويان المستقيم (EI)

تمرين (5)

(أ) لدينا $CD \parallel \Delta$ و $(BA) \parallel \Delta$ و $(CD) \parallel (BA)$ إذا $\Delta \parallel (BA)$

(ب) لدينا و $(HK) \parallel (BA)$ و $H \in (AO)$ و $K \in (OB)$ إذا حسب نظرية طالس نحصل على:

$$\frac{OB}{OK} = \frac{OA}{OH} = \frac{AB}{HK}$$

(ج) بما أن: $\frac{OB}{OK} = \frac{AB}{HK}$ إذن $KO \times BA = HK \times OB$ و نقسم طرفي المساواة على $KO \times OB$

$$\frac{DC}{OB} = \frac{HK}{OK} \text{ إذن } DC = AB \text{ و } \frac{AB}{OB} = \frac{HK}{OK} \text{ ثم نختزل و نحصل على } \frac{AB \times OK}{OB \times OK} = \frac{OK \times HK}{OB \times OK}$$

تمرين (6)

(أ) إذا كان مستقيم مواز لمستوي فهو مواز لكل مستقيم محتو في هذا المستوي: خطأ

(ب) إذا كان مستوي مواز لمستقيم فإن تقاطعهما إما نقطة أو المستقيم نفسه: خطأ


(ج) إذا كان مستقيمان موازيين على التوالي لمستوي فإنهما متوازيان: خطأ


تمرين (7)

(1) بما أن المستقيم $(JB) \parallel (AI)$ فإن $(FGC) \parallel (AI)$

(2) بما أن $I \in (EFG)$ و $G \in (EFG)$ فإن $(GI) \subset (EFG)$


(3) حجم مكعب طول حرفه a هو: $V = a^3$




تمرين (8)الطريقة الأولى:

في متوازي الأضلاع ABCD لدينا : $(CD) \parallel (BA)$ و $CD = AB$
 و في متوازي الأضلاع CDEF لدينا : $(FE) \parallel (CD)$ و $EF = CD$
 إذن : $(FE) \parallel (BA)$ و $EF = AB$ يعني متوازي الأضلاع
الطريقة الثانية:

نستعمل تقايس المثلثين : ADE و BCF حيث نحصل على: $BF = AE$ و بالإضافة إلى $(FE) \parallel (BA)$ و
 إذن $EF = AB$ متوازي الأضلاع

تمرين (9)

الخطأ الذي نلاحظه هو في وجود الخطوط المتقطعة بعد النقطة J

تمرين (10)

(2 - أ) الوضعية النسبية لـ: (FD) و (CB) متوازيان
 ب) الوضعية النسبية لـ: (AB) و (EB) متقاطعان في B
 ج) الوضعية النسبية لـ: (AE) و (DC) هما ليسا في نفس
 المستوي.

$$(1) \quad \begin{aligned} (BD) \cap (ABC) &= \{B\} \\ (EF) \cap (ABC) &= \{ \} \\ (BD) \cap (DCF) &= (BD) \end{aligned}$$

إصلاح التمارينتمرين (1)

(1) المستقيم (D'D) عمودي على المستوي (DBC) لأنه عمودي على المستقيمين (CD) و (AD) من المستوي (DBC)

(2) المستقيم (C'C) عمودي على المستوي (D'B'A') لأنه عمودي على المستقيمين (C'D') و (B'C') من المستوي (D'B'A')

(3) المستقيم (B'B) عمودي على المستوي (CAH) لأنه عمودي على المستقيمين (AH) و (HC) من المستوي (CAH)

تمرين (2)الشكل الأول:

أ) المستقيم (IJ) موازي للمستقيم (BC) : خطأ لأنهما ليسا في نفس المستوي

ب) المستقيم (IJ) موازي للمستوي (BCD) : صحيح لأنه يوازي المستقيم (DC) من المستوي (BCD).

ج) المستقيم (IJ) موازي للمستوي (BAC) : خطأ لأن النقطة J لا تنتمي إلى المستوي (BAC)

الشكل الثاني:

أ- $IA = JB$: صحيح لأنهما يمثلان شعاع الإسطوانة

ب- المستقيم (AJ) عمودي على المستوي (JBC) : خطأ لأن (AJ) لا يتعامد مع أي مستقيم من (JBC)

ج- حجم الاسطوانة يساوي $20\pi cm^3$: صحيح لأن الحجم يساوي جداء مساحة القاعدة $(\pi \times 2 \times 2)$ والارتفاع $(h = 5)$

الشكل الثالث:

أ- المستقيم (HF) عمودي على المستوي (DBF) : خطأ لأنه (BD) // (FH)

ب- حجم المتوازي يساوي $20\pi cm^3$: صحيح لأن الحجم يساوي جداء مساحة القاعدة والارتفاع

ج- المستقيم (GC) موازي للمستوي (DBF) : صحيح لأنه يوازي (FB) من المستوي (BFD)

الشكل الرابع:


أ- $EA > EC$: خطأ لأن $EA^2 = 5^2 + 3^2$ و $EC^2 = 5^2 + 5^2$

ب- المستقيم (AD) موازي للمستوي (EBC) : صحيح لأنه يوازي المستقيم (BC) من المستوي (ABC)

ج- المستقيم (ED) عمودي على المستوي (BCA) : صحيح لأنه عمودي على المستقيمين (DC) و (AD) من المستوي (CBA).

تمرين (3)

(1) انظر الرسم



(2) النقاط A و B و C ليست على استقامة واحدة فهي تمثل مستويا في الفضاء نرسم له بـ : (CBA) بحيث يكون المستوي (CBA) قاطعا للمستوي P في مستقيم واحد هو (IJ) غير مواز للمستقيم (BC) إذن النقاط I, J, K على استقامة واحدة.

تمرين (4)

(1) المستقيمان (AD) و (EF) لا ينتميان إلى نفس المستوي لأنهما غير متوازيين و غير متقاطعين
 (2) المتوسط العمودي لـ : [BA] المارّ من C و المتوسط العمودي لـ : [ED] المارّ من F هما مستقيمان عموديان على المستوي (ABD)
 (3) المستويان (BCA) و (FDE) هما عموديان على المستقيم (BE)

تمرين (5)

(1) مثلث قائم الزاوية في I : خطأ لأن EFGH هو هرم منتظم قيس زواياه 60°
 (2) خطأ لأن EFGH هو هرم منتظم و حسب نظرية طالس في المثلث HGF $KI=IE=HI$
 نحصل على: $KI = \frac{a}{2}$ بينما $EI = HI = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ (حسب نظرية بيتاغورس).
 (3) (FG) عمودي على المستوي (EIH) : صحيح لأن المستقيم (FG) عمودي على المستقيمين (EI) و (IH) من المستوي (EIH) في النقطة I
 (4) $IJ = KH = a\sqrt{2}$: خطأ لأن $IJ = HK = \frac{a}{2}$
 (5) المستقيم (EI) عمودي على المستوي (FGH) : خطأ : لأن المستقيم (EI) لا يتعامد إلا على المستقيم (FG) من المستوي (FGH) .

تمرين (6)

(1) $H \in \Delta'$ و $(AM) \parallel \Delta'$ إذن المستقيمان: Δ' و (AM) هما في نفس المستوي (HMA)
 (2) بما أن : $(AH) \perp (D)$ لأن H المسقط العمودي لـ : A على (D) و $(MH) \perp (D)$ إذن $(HMA) \perp (D)$

تمرين (7)

- (أ) بما أن المستقيمين (IK) و (JK) يقطعان المستوي (EFD) في K إذن المستويين (IJK) و (EFD) يتقاطعان في مستقيم Δ مار من K
 (ب) المستقيم Δ يوازي (DE) و K منتصف [FD] إذن حسب نظرية طالس Δ يقطع [FE] في منتصفها
 (ج) بما أن (EFD) // (ABC) و (ABC) \perp (KI) إذن (EFD) \perp (KI) (لأن مستويين متوازيين , العمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر)

تمرين (8)

- (1) بما أن (DC)//(IJ) و (BE)//(DC) إذن (BE)//(IJ)
 (2) - أ) بما أن : $A \in (AEF)$ و $A \in (ACD)$ إذن (AEF) و (ACD) متقاطعان
 (ب) بما أن المستويين: (AEF) و (IJF) متقاطعان إذن (IJ) يقطع المستوي (AEF).
 (3) - أ- ب) بما أن K مناظرة I بالنسبة للنقطة J إذن $KI = 2IJ = EB$ و (KI)//(EB) إذن KEBI متوازي أضلاع و بالتالي: (EK)//(BI)

تمرين (9)


- (1) المستقيم (AA') عمودي على المستوي (AEB) لأنه عمودي على مستقيمين منه : (BA) و (AD)
 (2) - أ) $EB = 5$ و $B'F = 5$ إذن الرباعيان FEAA' و FEBB' هما مستطيلان يشتركان في الضلع [EF] و محتويان في المستويين و (BB'E) و (AA'E) على التوالي، إذن المستويان (BB'E) و (AA'E) يتقاطعان وفق المستقيم (EF)

$$V_1 = \frac{15 \times 5}{2} \times 10 = 375 \quad : V_1 \text{ نمز له بالحرف } AA'FB'BE \text{ و نمز له بالحرف } V_1$$

$$V_2 = 10 \times 15 \times 15 - 375 = 1875 : V_2 \text{ نمز له بالحرف } AA'FECC'D'D \text{ و نمز له بالحرف } V_2$$


تمرين (10)

- (1) المستقيم Δ موازي لـ (D) و (D) عمودي على المستوي (AHC) إذا $\Delta \perp (HAC)$ (لأن مستقيمان متوازيان , العمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر)
 (2) المستقيم (BC) عمودي على المستوي (IHA) لأنه عمودي على مستقيمين منه
 ((IJ) \perp (CB) و (AH) \perp (CB))
 (3) بما أن : (AB) عمودي على (HC) في نقطة K و (KI) \perp (AB) إذن المستقيم (AB) عمودي على المستوي (IHC) (لأنه عمودي على مستقيمين منه)

**تمرين (11)**

(1) انظر الرسم

- (أ) - بما أن المستقيم (IJ) عمودي على (AB) في I إذن (IJ) محتو في المستوي P
 (ب) بما أن المستقيم $(KI) \parallel (BD)$ إذن $(KI) \perp (AB)$ في I إذن K تنتمي إلى المستوي P



(ت) النقاط I و J و K ليست على استقامة واحدة و منتمة إلى P إذن $P = (IJK)$

تمرين (12)

- (1) - بما أن $(AF) \perp (AC)$ و $(AH) \perp (AC)$ إذن (AC) عمودي على المستوي (HFA)
 (2) - المثلث HFA هو قائم و متقايس الضلعين في H لأن $FH = AH$ و $(AH) \perp (FH)$
 (3) - مساحة المثلث HFA و نرملها بالحرف S إذن :

$$S = \frac{AH \times HF}{2} = \frac{\sqrt{m^2+m^2} \times \sqrt{m^2+m^2}}{2} = m^2$$

تمرين (13)

- (1) المستقيمان (CD) و (BC) متقاطعان في C حيث $Q \perp (CD)$ و $P \perp (BC)$
 إذن المستويان P و Q يتقاطعان في مستقيم Δ
 (2) بما أن $Q \cap P = \Delta$ إذن Δ عمودي على مستقيم Δ_1 من P حيث $\Delta_1 \perp (BC)$

و آخر $\Delta_2 \perp (DC)$ حيث Q من Δ_2 ،


يعني Δ عمودي على المستوي (BCD) في نقطة I' $\Delta_2 \cap \Delta_1 = I'$ ؛

(3) Δ_1 عمودي على (BC) في I (حيث I منتصف $[BC]$)


و Δ_2 عمودي على (DC) في J (حيث J منتصف $[CD]$)

يعني Δ_1 و Δ_2 هما الموسطين العموديين لـ $[BC]$ و $[DC]$

إذن النقطة I' متقايسة البعد عن B و C و D يعني I' مركز الدائرة المحيطة بالمثلث BCD



تمرين (14)



(1) انظر الرسم

(2) بما أن $OC = OB$ و $(OB) \perp (OM)$ و $(OC) \perp (OM)$ إذن حسب نظرية بيتاغور :

$$MB = MC = \sqrt{OC^2 + MO^2}$$

(3) بما أن $(OI) \perp (BC)$ و $(MI) \perp (BC)$ إذن المستقيم (BC) عمودي على المستوي (OMI) لأنه

عمودي على مستقيمين منه

تمرين (15)

(1) - انظر الرسم

(ب) ليكن DI الارتفاع الصادر من D في المثلث CDB إذن : H تمثل المركز القائم للمثلث CDB لأن في المثلث المتقايس الأضلاع يتطابق المركز القائم و مركز


$$ID^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} a^2 \quad \text{حيث } HD = \frac{2}{3} DI \quad \text{الثقل و... و بالتالي :}$$

$$HD = \frac{2}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{3} a \quad \text{و بالتالي } DI = \frac{\sqrt{3}}{2} a \quad \text{يعني}$$

(ج) في المثلث AHD القائم في H لدينا : $AD^2 = DH^2 + AH^2$ إذن :

$$AH^2 = AD^2 - DH^2 = a^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2$$

$$AH = a \sqrt{\frac{2}{3}} \quad \text{يعني } HA^2 = a^2 - \frac{a^2}{3} = \frac{2a^2}{3} \quad \text{يعني}$$

(2) بما أن $(HD) \perp (BC)$ في I و $(AI) \perp (BC)$ إذن المستقيم (BC) عمودي على المستوي (AHD) (لأنه عمودي على مستقيمين مختلفين منه : هما (AI) و (HD))(3) مساحة المثلث CDB هي :

$$S = \frac{CB \times ID}{2} = \frac{a \times a \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = a^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = (2\sqrt{3})^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = 4 \times 3 \frac{\sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3}$$

حجم الهرم $CDBA$ هو جدًا مساحة القاعدة في الارتفاع :يعني $V = S \times h$ (حيث $h = AH$ ارتفاع الهرم)

$$V = S \times AH = 3\sqrt{3} \times a \sqrt{\frac{2}{3}} = 3\sqrt{2} \times a = 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} = 6\sqrt{6} \quad \text{إذن :}$$

تمرين (16)

$$(1) \text{ في المثلث } ABD \text{ لدينا حسب نظرية طالس : } OI = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$$

(2) في المثلث ABD القائم في A لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$BD^2 = AD^2 + AB^2 = 6^2 + 4^2 = 52$$

$$\text{يعني : } BD = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \text{ و بالتالي : } OD = \sqrt{13} \text{ cm}$$

(3) بما أن المستقيم (HD) عمودي على المستوي (ABD) في النقطة D فإن المستقيم (HD) عمودي

على كل المستقيمت المحتواة في المستوي (ABD) و المارة من النقطة D إذن : $(DO) \perp (HD)$

و بالتالي يكون المثلث ODH قائم الزاوية في D .

و باستعمال نظرية بيتاغور في المثلث ODH نتحصل على :

$$OH^2 = OD^2 + DH^2 = \sqrt{13}^2 + 2\sqrt{3}^2 = 13 + 12 = 25$$

$$\text{يعني : } OH = 5 \text{ cm}$$


(4) باستعمال نظرية بيتاغور في المثلث IDH نتحصل على :

$$IH^2 = ID^2 + DH^2 = 2^2 + 2\sqrt{3}^2 = 4 + 12 = 16$$

$$\text{يعني : } IH = 4 \text{ cm}$$

و بما أن : $5^2 = 3^2 + 4^2$ يعني $OH^2 = OI^2 + IH^2$ إذن المثلث OIH قائم الزاوية في I

(5)



بتطبيق نظرية طالس في المثلث OBC نحصل على :

$$MN = \frac{2\sqrt{13} \times \sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{39}}{2} \text{ : يعني } \frac{MN}{OB} = \frac{MN}{2\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ إذن } \frac{CM}{CB} = \frac{MN}{OB} = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ cm}$$

تمرين (17)

(1) في المثلث ABD القائم في A لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$BD^2 = AD^2 + AB^2 = 6^2 + 6^2 = 72$$

$$OB = 3\sqrt{2} \text{ cm} : \text{ يعني } BD = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ و بالتالي}$$

(2) و في المثلث SBO القائم في O لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$SO^2 = SB^2 - OB^2 = 6^2 - 3\sqrt{2}^2 : \text{ يعني } SB^2 = SO^2 + OB^2$$

$$SO = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} : \text{ يعني } SO^2 = 36 - 18 = 18$$

(3) **مع الملاحظة** : تغيير السؤال كالتالي "لتكن H نقطة تقاطع ارتفاع المثلث BSO (عوض BAO)

الصادر من O مع المستقيم (BS)

(لأن المستقيم (BS) وارتفاع المثلث BAO الصادر من O ليسا في نفس المستوي)

و الجواب كالتالي:

في المثلث BSO القائم في O لدينا حسب العلاقة القياسية في المثلث القائم: $BS \times HO = SO \times OB$

$$OH = \frac{OS \times OB}{BS} = \frac{3\sqrt{2} \times 3\sqrt{2}}{6} = 3 : \text{ يعني}$$

(4) في المثلث CKS القائم في K لدينا : $SC^2 = SK^2 + KC^2$ إذن:

$$SK^2 = SC^2 - KC^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27$$

$$SK = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ يعني}$$

تمرين (18) (وحدة قياس الطول هي الصنتمتر)

(1) في المثلث AHB القائم في H لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$BH^2 = AB^2 - AH^2 = 3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9 - \frac{9}{4} = \frac{36}{4} - \frac{9}{4} = \frac{27}{4} : \text{ يعني } AB^2 = BH^2 + AH^2$$

$$BH = \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt{3} : \text{ يعني}$$

و $BO = \frac{2}{3} \frac{3}{2} \sqrt{3} = \sqrt{3}$ (لأن O هي مركز ثقل المثلث ABC)

(2) في المثلث SOB القائم في O لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$SB^2 = SO^2 + OB^2 = 5^2 + \sqrt{3}^2 = 25 + 3 = 28$$


$$SB = \sqrt{28} = 2\sqrt{7} \text{ : يعني}$$

(3) في المثلث SHB القائم في O لدينا حسب نظرية بيتاغور :

$$HO = \frac{1}{3}BH = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ : حيث } SH^2 = SO^2 + OH^2$$

$$SH^2 = 5^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 25 + \frac{3}{4} = \frac{100}{4} + \frac{3}{4} = \frac{103}{4} \text{ : إذن}$$

$$SH = \frac{1}{2}\sqrt{103} \text{ : وبالتالي}$$



(4) **مع الملاحظة** : تغيير السؤال كالتالي " لتكن M نقطة من [SC] حيث $SM = 2$ و N نقطة تقاطع

المستقيم الموازي لـ (AC) (عوض : الموازي لـ (AB)) و المار من M و المستقيم (SA) ((

لأن المستقيمين (AB) و (MN) ليسا في نفس المستوي

و الجواب كالتالي:

بتطبيق نظرية طالس في المثلث SAC حيث $(NM) \parallel (AC)$ نحصل على :

$$MN = \frac{3}{\sqrt{7}} \text{ : يعني } \frac{MN}{AC} = \frac{MN}{3} = \frac{1}{\sqrt{7}} \text{ : إذن } \frac{SM}{SC} = \frac{MN}{AC} = \frac{2}{2\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$

تمرين (19) (وحدة قيس الطول هي الصنمتر)

(1) بما أن: $(CB) \perp (DB)$ و $(BC) \perp (AB)$

فإن: $(BC) \perp (ABD)$


(أ) بما أن النقطتين N و F تنتميان إلى المستوي (BCF)

إذن المستقيم (NF) محتو في المستوي (BCF)

(ب) بما أن المستقيمين (NF) و (BE) محتويان في

نفس المستوي (BCF) و هما غير متوازيين إذن

فهما متقاطعان



(ج) بما أن المستقيمين (NF) و (BE) متقاطعان و (BE) محتو في المستوي (ABD) إذن المستقيم (NF) و المستوي (ABD) متقاطعان في نقطة M.
 (2) نعتبر المثلث MEF حيث (FE) // (NB) إذن حسب نظرية طالس نحصل على :

$$\frac{MB}{ME} = \frac{\frac{1}{3}BC}{BC} \text{ فإن } NB = \frac{1}{3} BC = \frac{1}{3} EF \text{ و بما أن } \frac{MB}{ME} = \frac{MN}{MF} = \frac{NB}{EF}$$

$$\frac{MB}{BE + MB} = \frac{1}{3} \text{ إذن } ME = MB + BE \text{ و بما أن } \frac{MB}{ME} = \frac{1}{3}$$

$$\text{يعني : } \frac{BE}{MB} + 1 = 3 \text{ يعني } \frac{BE}{MB} + \frac{MB}{MB} = 3 \text{ يعني } \frac{BE + MB}{MB} = 3$$

$$\text{يعني } \frac{BE}{MB} = 2 \text{ يعني } MB = \frac{1}{2} BE$$

تمرين (20) (وحدة قياس الطول هي الصنمتر)

(1) بما أن: (DH) \perp (AD) و (AD) = (ND) فإن المثلث NDH قائم الزاوية في D ، إذن حسب نظرية بيتاغور نحصل على:

$$NH^2 = DN^2 + DH^2 = \left(\frac{AD}{2}\right)^2 + (2\sqrt{2})^2$$

$$= 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = 4 + 8 = 12$$

$$\text{و بالتالي : } NH = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

(2) حسب نظرية بيتاغور في المثلث DHC نحصل على:

$$CH^2 = DC^2 + DH^2 = \left(\frac{AD}{2}\right)^2 + (2\sqrt{2})^2$$

$$= (2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 = 8 + 8 = 16$$

$$\text{و بالتالي : } CH = 4 \text{ و } OH = 2$$


(3) بما أن (DHC) \perp (ND) في النقطة D فهو عمودي على كل مستقيمت المستوي (DHC) المارة من D
 إذن : (DO) \perp (ND) ، و بتطبيق نظرية بيتاغور في المثلث القائم DNO نحصل على:

$$NO^2 = DO^2 + DN^2 = \left(\frac{CH}{2}\right)^2 + \left(\frac{AD}{2}\right)^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8$$

$$\text{و بالتالي : } NO = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

(4) بما أن : $HN^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$ و $HO^2 = 4$ و $NO^2 = 8$ إذن : $NH^2 = NO^2 + HO^2$

و حسب عكس نظرية بيتاغور فإن المثلث NOH قائم الزاوية في H



(5) مساحة المثلث NOH و نرسم لها بالحرف S :

$$S = \frac{NH \times OH}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 2}{2} = 2\sqrt{3}$$

(6) نعتبر المثلث BGF حيث (MP) // (EB) إذن حسب نظرية طالس نحصل على :

$$\frac{MP}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ يعني } \frac{MP}{BF} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ فإن } \frac{GM}{GF} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ و بما أن } \frac{GM}{GF} = \frac{GP}{GB} = \frac{MP}{BF}$$

$$\text{و بالتالي : } MP = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{4} = 1$$

$$\text{و بما أن : } \frac{GP}{GB} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ و } GB = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 4^2} = \sqrt{12 + 16} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

$$\text{فإن : } \frac{GP}{GB} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ يعني } \frac{GP}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ و بالتالي : } GP = \frac{2\sqrt{7} \times \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{2}}{2} = \sqrt{\frac{7}{2}}$$

(7) تمثل K مركز ثقل المثلث HGC لأنها نقطة تقاطع المتوسطين الصادرين من G و H

$$\text{إذن : } GK = \frac{2}{3} GO = \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$$

نماذج فروض لتلاميذ التاسعة أساسية

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-1 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: التعيين في المستوي

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

O	I	J	معين في (O , I , J) المستوي أصل تدرجه هو	9	11	7	117 يقبل القسمة على :
(IO)	(BI)	(JO)	A و B نقطتان لهما نفس الفاصلة إذا (BA) بوازي	4	3	2	باقي قسمة العدد 214 على 4 هو
E(0;1)	E(1;0)	E(2;1)	B(3;2) و A(-1; -2) إذا إحداثيات E منتصف [BA]	6	5	3	العدد 2a1 يقبل القسمة على 3 إذا كان a يساوي :
(1; 2)	(1; -2)	(-1; 2)	مناظرة النقطة A(-1;2) بالنسبة إلى O هي نقطة إحداثياتها	3 و 5	3 و 4	3 و 2	يكون العدد الصحيح الطبيعي قابلا للقسمة على 12 إذا كان قابلا للقسمة على

تمرين عدد 2

1 - أ) بين أن العدد $2^{149} + 2^{151}$ قابل للقسمة على 5

ب) استنتج انه قابل للقسمة على 10

تمرين عدد 3

1) حدد الأرقام a و b و c في الحالات التالية :
أ) العدد $23a4$ يقبل القسمة على 3

ب) العدد $23b5c$ يقبل القسمة على 3 و على 5

2) أوجد العدد الصحيح الطبيعي n حيث $\frac{21}{n+5}$ عدد صحيح طبيعي

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-2 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: التعيين في المستوي

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

(IO)	(BI)	(JO)	(O , I , J) معين في المستوي إذا محور الفاصلات هو	11	10	9	العدد $3^{121} + 3^{119}$ قابل للقسمة على:
(IO)	(BI)	(JO)	A و B نقطتان لهما نفس الترتيب إذا (BA) يوازي	4	3	2	مجموع 3 أعداد صحيحة طبيعية متتالية هو مضاعف لـ :
2	4	0	B(3;2) و A(3; -2) إذا البعد BA يساوي	1	2	3	$\frac{21}{n+5}$ عدد صحيح طبيعي إذا n يساوي :
(1; 2)	(-2; 1)	(-1; 2)	مناظرة النقطة A(2;1) بالنسبة إلى (JO) هي نقطة إحداثياتها	6	5	4	كم مجموعة الأعداد ذات رقمين المكونة من الرقمين 1 و 2

تمرين عدد 2

نعتبر العدد : $k = 7b5a$

(1) أوجد الرقمين a و b بحيث يكون k قابلاً للقسمة على 45

(2) هل يوجد رقمين a و b بحيث يكون k قابلاً للقسمة على 20 ، علل جوابك

تمرين عدد 3

لتكن المجموعة A حيث $A = \{ 1, 2, 3 \}$

- و لتكن A_1 هي مجموعة الأعداد المكوّنة من 3 أرقام مختلفة من A بحيث يكون رقم مأتها 1
 A_2 هي مجموعة الأعداد المكوّنة من 3 أرقام مختلفة من A بحيث يكون رقم مأتها 2
 A_3 هي مجموعة الأعداد المكوّنة من 4 أرقام مختلفة من A بحيث يكون رقم مأتها 3
 باستعمال شجرة الاختيار حدّد عناصر المجموعات A_1 و A_2 و A_3 واستنتج كمّ كلّ منها.

- ليكن Δ مستقيماً مدرجاً بمعيين (O, I) والنقطتين M و N حيث $NO \perp MO$ و $NO \perp MO$: أحسب MO و NO و ماذا تمثل O بالنسبة لـ $[NM]$ معللاً جوابك.
- (2) وليكن (JO) المستقيم العمودي على Δ في O بحيث $IO = JO$
- (أ) عين النقاط $A(2,3)$ و $B(-2,1)$ و $C(-2,-3)$ في المعين (O, I, J) .
- (ب) ابن النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى O وحدد إحداثياتها.
- (ج) أثبت أن $(DA) \parallel (CB)$ و $DA = CB$.
- (3) المستقيم (JO) يقطع (BA) في K و (DC) في L .
- (أ) حدد إحداثيات كلٍّ من K و L و M و N في المعين (O, I, J) .
- (ب) أحسب NM و LK .
- (ج) بين أن $LNKM$ معين.

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 2-1 في الرياضيات	جبر: مجموعة الأعداد الحقيقية
وأساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

(JI)//(AB)	(JI)//(CA)	(JI)//(CB)	I منتصف [BA] و J منتصف [CA] في المثلث CBA إذا	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	القيمة المطلقة ل : $(-\frac{1}{5})$ يساوي
$\frac{AI}{AJ} = \frac{AB}{AC}$	$\frac{AI}{AJ} = \frac{AC}{BC}$	$\frac{AI}{AJ} = \frac{AC}{AB}$	I ∈ (AB) و (JI)//(CB) و J ∈ (CA) إذا	0,04	0,4	4	$\sqrt{0,16}$ يساوي
CB = CA × AI	$\frac{AI}{AC} = \frac{AB}{AJ}$	$\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC}$	يعني $\frac{AI}{AJ} = \frac{AB}{AC}$	125	25	12	في الكتابة 7,1252525... الدور هو :
CB = 3 JI	CB = 2 JI	CB = JI	I منتصف [BA] و J منتصف [CA] إذا	IR	ID	IN	π هو عدد ينتمي إلى

تمرين عدد 2

(1) أكمل بما يناسب : $\sqrt{\dots} = 2 \times 5^3$ ؛ $\sqrt{\dots} = \frac{3}{5}$ ؛ $\sqrt{\dots} = 7$

(2) أكتب بدون جذور : $\sqrt{\frac{16}{49}}$ ؛ $\sqrt{\frac{8}{18}}$ ؛ $\sqrt{\frac{2}{50}}$ ؛ $\sqrt{\frac{12}{147}}$

(3) أحسب و بسط ما يلي :

$$B = \sqrt{25 \times \sqrt{3} \times \sqrt{27}} \quad \text{و} \quad A = 3\sqrt{8} + \sqrt{32} - 2\sqrt{50}$$

(4) بسط الجذر التربيعي : $\sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{6 + \sqrt{7 + \sqrt{4}}}}}$

جبر: مجموعة الأعداد الحقيقية	فرض مراقبة عدد 2-2 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: مبرهنة طالس	الإسم و اللقب	9 أساسي

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

(JI)//(AB)	(JI)//(CA)	(JI)//(CB)	$J \in [CA]$ و $I \in [BA]$ حيث $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC}$ إذا	$\sqrt{2}$	4	2	العدد الذي مربعه 2 هو
BA = 2IA	BI = IA	BA = IA	$I \in (AB)$ و $(JI)//(CB)$ و J منتصف [CA] إذا	0,04	0,4	4	مربع العدد 0,2 يساوي
(IO)//(AB)	IO = IA	(IO)//(CB)	متوازي CBAD أضلاع مركزه O و I منتصف [BA] إذا	42	4	3	3,742 هي كتابة دورية دورها :
CB = 3 JI	CB = 2 JI	CB = JI	I منتصف [BA] و J منتصف [CA] إذا	IR	ID	IN	$\sqrt{2}$ هو عدد ينتمي إلى

تمرين عدد 2

(1) أكمل بما يناسب :

$$\sqrt{\dots} = 2 \times 3 \quad ; \quad \sqrt{\frac{4}{25}} = \dots \quad ; \quad \sqrt{\dots} = 5$$

(2) أوجد العدد الحقيقي x في الحالات التالية إن أمكن ذلك :

$$x^2 + 1 = 0 \quad (د) \quad ; \quad x^2 = 7 \quad (ج) \quad ; \quad x^2 = \frac{16}{25} \quad (ب) \quad ; \quad x^2 = 16 \quad (أ)$$

(3) - أ) أكتب بواسطة $\sqrt{2}$ الأعداد التالية : $\sqrt{72}$ و $\sqrt{32}$ و $\sqrt{50}$

ب) بسط العبارات التالية : $A = 2\sqrt{32} - \sqrt{72}$ و $B = \sqrt{50} - 3\sqrt{32} + \sqrt{72}$

تمرين عدد 1

ABCD متوازي أضلاع و M منتصف [AB] و N منتصف [CD]

المستقيمان (MD) و (NB) يقطعان القطر [AC] في E و F : بين أن : FC = EF = AE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تمرين عدد 2

لتكن [AB] قطعة مستقيم طولها 10 صم

(1) جزء [AB] إلى 7 أجزاء متقايسة

$$\frac{AM}{2} = \frac{MN}{1} = \frac{NB}{4}$$

(2) عين على [AB] النقطتين M و N حيث

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

التاريخ:	فرض تألّيفي عدد 1-1 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب- مجموعة أ. حقيقية
أساسي 9	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس - العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

ضع علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

11	1	0	a و b متقابلان إذن $a + 11 + b$ يساوي

عشري	صحيح	أصم	$\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}}$ هو عدد

$\frac{AI}{A'I'} = \frac{BI}{B'I'}$	$\frac{AI}{AB} = \frac{AI}{A'I'}$	$\frac{AI}{AB} = \frac{AI}{II'}$	<p>ينتج عنه : $(BB') // (II') // (AA')$</p>
$2\sqrt{x}$	$2x$	$x\sqrt{2}$	إذا كان x هو طول ضلع مربع فإن طول قطره يساوي:

تمرين عدد 2

نعتبر العبارة $W = -(\frac{3}{2} - x) + [\frac{5}{4} + (1 + x)] - (x - \frac{3}{2})$ حيث x عدد حقيقي

(1) اختصر العبارة W.

(2) أحسب W في الحالتين التاليتين : $x = -\frac{9}{4}$ و $x = \frac{5}{2}$

(3) أوجد x حيث $W = \frac{11}{2}$

تمرين عدد 3

جذ كتابة مقامها عدد صحيح لكل عدد من الأعداد التالية :

$$p = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} ; \quad n = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} ; \quad m = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

.....

.....

.....

.....

.....

التاريخ:	فرض تأليفي عدد 1-2 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب- مجموعة أ. حقيقية
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: التعيين في المستوي- مبرهنة طالس

تمرين عدد 1

(1) اتمم الجدول التالي حيث x عدد حقيقي موجب


		$\frac{1}{100}$	121		16	x
0,4	30			6		\sqrt{x}

(2) ضع علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

7 أجزاء متقايسة	5 أجزاء متقايسة	4 أجزاء متقايسة	لتعيين نقطتين M و N على [AB] حيث $\frac{AM}{2} = \frac{MN}{1} = \frac{NB}{4}$ نقسم [AB] إلى :
4,2	3,6	2,8	في الرسم التالي: (IJ)//(BC) ، إذا x يساوي:

تمرين عدد 2

- لربط النقطة A بالنقطة S يمكننا إتباع المخطط التالي :
- (1) حول هذا المخطط إلى شجرة اختيار.
- (2) استنتج عدد الإمكانيات المتاحة حسب هذا الجدول.



تمرين عدد 3

بين أن : $3^n - 9^{\frac{n+2}{2}}$ من مضاعفات 8 مهما يكن n في NI

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 3-1 في الرياضيات	جبر: العمليات على الأعداد الحقيقية
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	ACB مثلث حيث $BA=6$ و $CA = 4$ و $I \in (BA)$ حيث $IA=2$ و $(JI) \parallel (CB)$ إذا $\frac{AI}{AC}$ يساوي
5	6	7	CBA مثلث قائم حيث $BA=3$ و $CA = 4$ إذا CB يساوي

- 2	$\sqrt{2}$	0,5	مقلوب 2 هو
$2 - \sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$	$\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$	مقلوب $\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ يساوي
2	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	القيمة المطلقة ل: $\sqrt{2}$ تساوي
$\sqrt{2}-\sqrt{3}$	$\sqrt{2}+\sqrt{3}$	$\sqrt{3}-\sqrt{2}$	القيمة المطلقة ل: $\sqrt{2}-\sqrt{3}$ تساوي

تمرين عدد 2

(1) أحسب واختصر العبارات التالية :

$$D = \sqrt{2} \times \sqrt{0,02} \quad ; \quad E = \sqrt{\frac{1}{7}} \times \sqrt{63}$$

(2) أوجد كتابة يكون مقامها عددا صحيحا طبيعيا.

$$\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{2\sqrt{2}+\sqrt{7}} ; \frac{-5}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} ; \frac{5}{1-\sqrt{2}} ; \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}$$

$$\sqrt{\frac{3\sqrt{64}+1}{4\sqrt{49}-\sqrt{9}}} = 1 \quad \text{و} \quad \sqrt{7-3\sqrt{5}} \times \sqrt{7+3\sqrt{5}} = 2 \quad (3) \text{ بين أن:}$$

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 3-2 في الرياضيات	جبر: العمليات على الأعداد الحقيقية
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

(1) إذا كان ABC مثلث قائم في A ؛ أكمل الجدول التالي.

(2) اربط بسهم :

CB	CA	BA
10		8
$2\sqrt{5}$	4	
10		$5\sqrt{2}$

EFG قائم	*	$\left\{ \begin{array}{l} K \text{ منتصف } [FE] \\ GK = FK = EK \end{array} \right.$
EFG الأضلاع متقايس	*	
K مركز ثقل الثلث GFE	*	

(3) ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$-1 - \sqrt{2}$	$\sqrt{2} - 1$	$1 - \sqrt{2}$	$ 1 - \sqrt{2} $ يساوي
$-3 + \sqrt{7}$	$3 + \sqrt{7}$	$3 - \sqrt{7}$	$ 3 - \sqrt{7} $ يساوي

تمرين عدد 2

(1) انشر واختصر الجذاءات التالية .

$$(\sqrt{2} - 3)(\sqrt{2} + 3) ؛ \sqrt{5}(1 + \sqrt{2} - \sqrt{5}) ؛ \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)$$

$$(2\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$$

(2) حوّل المجاميع التالية إلى جذاءات . $2 + \sqrt{2} ؛ 25c + 10b - 5a$.

$$(2x - \sqrt{5})(1 - x) + \sqrt{5}(x - 1) ؛ x + 1 + \sqrt{2}(x + 1) ؛ \sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{25}$$

- (1) ارسم شبه منحرف DCBA قائم في A و D حيث: $BA = 4 \text{ cm}$ و $DA = 12 \text{ cm}$ و $CD = 9 \text{ cm}$
- (2) وليكن H المسقط العمودي لـ B على (CD): بين أن $CH = 5 \text{ cm}$ و $CB = 13 \text{ cm}$
- (3) عين E منتصف [DA]: أ) أحسب BE و CE
ب) بين أن المثلث CEB قائم في E.
- (4) عين K المسقط العمودي لـ E على (CB): أ) بين أن $KE = 6 \text{ cm}$ و $KB = 4 \text{ cm}$
ب) استنتج أن المثلث DKA قائم في K
- ج) بين أن (EB) هو المتوسط العمودي لـ [KA]:
- (5) وليكن $(EB) \cap (KA) = \{F\}$ و $(EB) \cap (CE) = \{L\}$
أ) بين أن الرباعي LKFE مستطيل .
ب) بين أن $LE = 12\frac{\sqrt{13}}{13}$

التاريخ:	فرض مراقبة عدد4-1 في الرياضيات	جبر: العمليات - قوى و مقارنة
9أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة

إذا كان ABC مثلث قائم في A و H المسقط العمودي لـ A على (CB).

$BA \times CA = CB \times HA$	$BA \times HA = CB \times CA$	$CA \times HA = CB \times BA$
مثلث متقايس الأضلاع	مثلث قائم	C دائرة قطرها [FE] و H ∈ C إذا HFE

2	1	0	a و b متقابلان إذا a + b يساوي
2	1	0	a و b مقلوبان إذا a × b يساوي

تمرين عدد2

(1) m و n عددان حقيقيان حيث : $n\sqrt{3} = m\sqrt{2}$ أوجد العدد الحقيقي $\frac{n}{m}$

(2) أوجد العدد الحقيقي x في الحالات التالية إن أمكن ذلك :

(أ) $\sqrt{3}x = 0$

(ب) $\sqrt{5}(x-1) = \sqrt{5}$

(ج) $\sqrt{(-x)^2} = 2$

تمرين عدد3 (1) - أختزل إلى أقصى حد :

$$A = \frac{a^4 \times b^{-2} \times c^5}{a^6 \times b^{-2} \times c^3} =$$

$$B = \frac{(a^{-3} \times b^3)^2 \times a^5}{a^{-4} \times b^6} =$$

$$x = \frac{(7 \times 8^3)^4 \times 8^{10}}{(7 \times 8^5)^4 \times 8^2} =$$

2 - أحسب بأيسر طريقة :

$$y = \frac{3^4 \times 11^5}{(-66)^4} =$$

التاريخ:	فرض مراقبة عدد4-2 في الرياضيات	جبر: العمليات - قوى و مقارنة
9أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد1

1- أكمل بما يناسب المساواة التالية :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^7 \times \left(\frac{3}{5}\right)^{\dots} = \left(\frac{3}{5}\right)^{12} \quad ; \quad \left[\left(-\frac{11}{5}\right)^{17}\right]^{\dots} = 1$$

$$\frac{3 \times 10^{-2}}{3 \times 10^{-3}} = \dots \times 10^{\dots} \quad ; \quad \frac{\left(-\frac{3}{4}\right)^2}{\left(-\frac{3}{4}\right)^5} = \left(-\frac{3}{4}\right)^{\dots} \quad ; \quad \left[\left(-\frac{11}{3}\right)^5\right]^4 = \left(-\frac{11}{3}\right)^{\dots}$$

(2) ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

متقايس الضلعين	متقايس الأضلاع	قائم	CBA مثلث حيث : $BA = 2\sqrt{5}$ و $CA = \sqrt{7}$ و $CB = \sqrt{13}$ إذا CBA
متقايس الضلعين	متقايس الأضلاع	قائم	I تنتمي إلى [BA] و $C \notin [BA]$ حيث : $CI = BI = AI$ إذا CBA

تمرين عدد2

- 1) قارن بين 1 و $\sqrt{3}$ ثم بين 2 و $\sqrt{3}$.
- 2) رتب تصاعديا الأعداد 2 ؛ 1 و $\sqrt{3}$.
- 3) استنتج ترتيبا تصاعديا للأعداد -2 ؛ -1 و $-\sqrt{3}$.
- 4) نعتبر العبارتين A و B حيث $A = |2 - \sqrt{3}| + |1 - \sqrt{3}|$ و $B = 2|\sqrt{3} - 2| + 3(-2 + \sqrt{3})$.
 أ) أحسب العبارتين A و B .
 ب) قارن بين A و B .

تمرين عدد 1

ليكن CBA مثلثا حيث : $BA = \sqrt{8}$ و $CA = (x - 2)$ و $CB = x$ حيث $x > 2$
حدد قيمة العدد x لكي يكون المثلث CBA قائم الزاوية في A

تمرين عدد 2

- (1) ابن قطعة مستقيم طولها $\sqrt{21}$ صم ثم ابن مثلثا DCB حيث :
 $DC = \sqrt{21}$ صم و $CB = 2$ صم و $DB = 5$ صم.
- (2) بين أن المثلث DCB قائم في C .
- (3) لتكن A المسقط العمودي لـ C على (DB) ؛ أحسب CA .

التاريخ:	فرض تألّيفي عدد 1-2 في الرياضيات	جبر: قوى - مقارنة - جذاءات معتبرة
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس - العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

ضع علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

2	1	0	يساوي $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^0$

8	6	4	يساوي $\sqrt{33 + \sqrt{8 + \sqrt{1}}}$

A(0,0)	A(1,0)	A(1,1)	إحداثيات النقطة A في المعين (A,B,C) هي :
1	2	$\sqrt{2}$	A(0,1) و B(1,0) إذا البعد BA يساوي

تمرين عدد 2

(1) أحسب ما يلي :

$$\sqrt{10^{-6}} = \dots \quad ; \quad \sqrt{144} = \dots \quad ; \quad \sqrt{81} = \dots$$

$$\left(\frac{-\sqrt{7}}{2}\right)^2 = \dots$$

(2) انشر واختصر :

$$E = (3\sqrt{2} - 2)^2 \dots$$


$$F = (\sqrt{15} + \sqrt{30})(\sqrt{15} - \sqrt{30}) \dots$$

$$2\sqrt{3} + 4 = (1 + \dots)^2 ; \quad a \in \mathbb{N} \text{ حيث } a + 4\sqrt{a} + 4 = (\dots + \dots)^2 \quad \text{أنم (3)}$$

(4)

قارن مايلي:

$$5 + \sqrt{6} \text{ و } 5 + \sqrt{7} \quad ; \quad 3\sqrt{5} \text{ و } -17\sqrt{5} \quad ; \quad \frac{1}{3\sqrt{2}} \text{ و } \frac{1}{2\sqrt{3}} \quad ; \quad -6\sqrt{3} \text{ و } -3\sqrt{7} \quad ; \quad 5\sqrt{2} \text{ و } 4\sqrt{3}$$



$ABCD$ متوازي الأضلاع بحيث $AB=9$ و

$BC=6$ بحيث $E \in [BC]$ $CE=2$

الموازي ل (BD) المار من E يقطع (DC)

في M

(1) احسب MC

(2) احسب ME علما أن $BD=12$

(3) لتكن F نقطة من $[AB]$ بحيث $BF=6$

بين أن $(AC) \parallel (EF)$.

التاريخ:	فرض تأليفي عدد 2-2 في الرياضيات	جبر: قوى - مقارنة - جذاءات معتبرة
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس - العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

ضع علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$\frac{n}{n(n+1)}$	$\frac{2}{n(n+1)}$	$\frac{1}{n(n+1)}$	$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ يساوي

$\frac{9}{2}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{4}{9}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^{-2}$ يساوي

تمرين عدد 2

(1) ليكن n عدد صحيح طبيعي ، بين أن : $\frac{25^{n+1}+25^n}{5^{2n+1}-5^{2n}} = \frac{13}{2}$

(2) نعتبر العددين K و L حيث : $K = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$ و $L = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$

(أ) أحسب $(K + L)^2$ ثم استنتج $K + L$

(ب) أحسب : $\frac{1}{L} + \frac{1}{K}$

(3) بسط العبارة التالية حيث $a \neq 0$ و $b \neq 0$: $M = \frac{a^4b^{-2}(ab)^0a}{a^{-3}b^2a^5b}$

(4) قارن العددين الآتيين في كل حالة :
 - أ- $3\sqrt{7}$ و $2\sqrt{5}$ ؛
 - ب- $\sqrt{5} - \sqrt{7}$ و $2\sqrt{5}$ ؛

- ج- $\frac{5}{\sqrt{8}}$ و $\frac{\sqrt{8}}{5}$ ؛
 - د- $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ و $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{5}+1}$ ؛

ABCD شبه منحرف قائم الزاوية في A و D حيث:

AB = 5 و AD = 4 و DC=8 و E نقطة من [AB] حيث AE=3

- (1) احسب DE
- (2) عين I منتصف [ED] ثم احسب AI.
- (3) المستقيم المار من I والموازي للمستقيم (AB) يقطع المستقيم (BC) في نقطة J .
 (أ) بين أن J منتصف [BC] .
 (ب) احسب IJ .
 (ج) بين أن ABJI متوازي أضلاع.
- (4) احسب BC ثم استنتج طبيعة الرباعي EBCD.

جبر: قوى و مقارنة و جذاءات معتبرة	فرض مراقبة عدد 1-5 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: علاقات قياسية و رباعيات أضلاع	الإسم و اللقب	9 أساسى

تمرين عدد 1

ضع علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$4x^2 - 4x + 1$	$4x^2 + 1$	$4x^2 - 1$	$(2x - 1)^2$ يساوي
$2x(2x - 1)$	$(2x + 1)(2x - 1)$	$4x^2 + 4x$	$(2x + 1)^2 - 1$ يساوي
$4x^2 - 6x$	$4x^2 - 3$	$2x^2 - 6$	$2x(2x - 3)$ يساوي :

$2x$	$4x$	x^2	مساحة
			مربع طول ضلعه x تساوي
60°	50°	140°	ABCD متوازي أضلاع حيث
			$\widehat{DAB} = 40^\circ$ إذا \widehat{ABC} يساوي

تمرين عدد 2

(1) بين أن $(b + a)^2 - (b - a)^2 = 4ba$ و $(\frac{1}{a} + a)^2 = \frac{1}{a^2} + a^2 + 2$

(2) اكتب في صيغة مربع ، كلا من العبارتين التاليتين :

$$B = \frac{1}{a^2} + \frac{2}{a} + 1 \quad \text{و} \quad A = \frac{1}{a^2} + a^2 - 2$$

(1) - أ) ارسم مستطيلا HGFE بعدها : $FE = 8$ و $HE = 6$

ب) احسب GE

(2) - أ) ارسم نقطة I من [FE] بحيث $GF = IF$

ب) احسب IG

(3) - أ) ارسم نقطة J من [HG] بحيث $JG = IE$

ب) بين أن الرباعي JGIE متوازي أضلاع.

(4) - أ) ولتكن K المسقط العمودي لـ F: على [GE]

ب) احسب KF

(5) - أ) عين نقطة M بحيث تكون K منتصف [MF]

ب) استنتج MG و ME

هندسة: قوى و مقارنة و جذاءات معتبرة	فرض مراقبة عدد5-2 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: علاقات قياسية و رباعيات اضلاع	الإسم و اللقب	وأساسي

تمرين عدد1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

2	4	-2	$(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)$ يساوي
$4 - 2\sqrt{3}$	4	$4 + 2\sqrt{3}$	$(1 + \sqrt{3})^2$ يساوي
$(2 - x)^2$	$(2 + x)^2$	$(4 + x)^2$	$x^2 + 4x + 4$ يساوي :

محيط مربع طول ضلعه x هو	x^2	$4x$	$2x$
ABCD رباعي حيث [AC] و [BD] يتقاطعان في منتصفهما يعني ABCD	متوازي أضلاع	شبه منحرف	مربع

تمرين عدد2

نعتبر العبارة : $E(x) = 4x^2 + 5x + 1$

(1) اكتب $E(a)$ و $E(b)$ ثم فكك إلى جذاء عاملين : $E(a) - E(b)$

(2) إذا كان $0 \leq a \leq b$ بين أن : $4a + 4b > -5$

(3) بين أن : $E(x) = \left(2x + \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{16}$

(4) استنتج تفكيكا لـ : $E(x)$

- (1) أرسم مثلثا ABC قائم الزاوية في A حيث $AB = 6$ و $CA = 2\sqrt{3}$
- (2) ارسم النقطة D من [AB] حيث $DA = \frac{1}{3} AB$
- (3) احسب DC و BC و استنتج أن المثلث BDC متقايس الضلعين.
- (4) لتكن النقطة E حيث D منتصف [BE] ، أثبت أن المثلث BCE قائم الزاوية.
- (5) المستقيم المار من D والعمودي على (BC) يقطع (BC) في H ويقطع (AC) في F.
- (أ) بين أن $\frac{CE}{DF} = 1$ واستنتج البعد AF
- (ب) اثبت أن الرباعي EFDC معين.
- (ج) استنتج طبيعة الرباعي FHCE .

جبر: معادلات - مترجمات وإحصاء	فرض مراقبة عدد 6-1 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: رباعيات أضلاع وتعامد في الفضاء	الإسم و اللقب	9 أساسى

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$\frac{3}{2}$	1	$\frac{2}{3}$	حل المعادلة $2n - 3 = 0$ في IR هو
0,001	0,01	0,1	$1,73 < \sqrt{3} < 1,74$ هو حصر $\sqrt{3}$ لمداه
$(t+1) = 0$	$(t-1) = 0$ أو $(t+1) = 0$	$(t-1) = 0$	إذا $(t+1)(t-1) = 0$

شبه منحرف	مستطيل	مثلث	شكل الأوجه الجانبية لهرم رباعي منتظم
9 cm^3	15 cm^3	5 cm^3	حجم هرم مساحة قاعدته 5 cm^2 وارتفاعه 3 cm هو

تمرين عدد 2

- جمع أحمد في حصّالته مبلغاً مالياً قدره : 53 بينما جمعت أخته سلمى مبلغاً قدره : 13 و بمناسبة العيد أهدى أبوهما لكلّ منهما نفس المبلغ فأصبح لسلمى نصف مبلغ أحمد.
- (1) حوّل هذه المسألة إلى معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد (هو) واستنتج حلاً لها.
- (2) أوجد المبلغ الذي أصبح لدى كلّ منهما.

تمرين عدد 3

- لحساب معدل الرياضيات لثلاثي نسد للفرضين الأول والثاني الضارب 1 و 2 للفرض الثالث.
- (1) أحسب معدل أحمد إذا تحصل على 15 و 9 و 11 بالترتيب.
- (2) تحصل عمر على 8 و 9 و a و a أوجد إذا علمت أن معدله 12

نعتبر الهرم SABCD قاعدته متوازي الأضلاع ABCD. و لتكن I و J و K منتصفات القطع [SA] و [SB] و [CS] على التوالي.

- (1) بين أن المستقيمين (IJ) و (DC) متوازيين
- (2) بين أن المستقيم (DC) محتو في المستوي (CIJ)
- (3) حدد تقاطع المستويين (ABCD) و (CIJ)
- (4) حدد تقاطع المستويين (DSA) و (CIJ)

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 2-6 في الرياضيات	جبر: معادلات - متراجحات و إحصاء
أساسي 9	الإسم و اللقب	هندسة: رباعيات أضلاع وتعادم في الفضاء

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$]a,b[$	$]a,b]$	$[a,b[$	$\{ a \text{ و } b \in \mathbb{R}$
			هي مجموعة تساوي
$n - \sqrt{2} = 0$	$n + \sqrt{2} = 0$	$n - 2 = 0$	$\sqrt{2}$ هو حل للمعادلة
$y \in]1, 3]$	$y \in]1, 3[$	$y \in]1, 3]$	$1 \leq y < 3$ يعني

شبه منحرف	مربع	مثلث	شكل قاعدة هرم رباعي منتظم هو
27 cm^3	24 cm^3	9 cm^3	حجم مكعب طول حرفه 3cm يساوي

تمرين عدد 2

يمثل الجدول التالي عدد الأهداف التي سجلها فريق كرة القدم خلال 25 مقابلة.

6	5	4	3	2	1	عدد الأهداف المسجلة (قيمة الميزة)
y	2		3	8	5	عدد المقابلات (التكرار)

(1) إذا علمت أن التواتر التراكمي الموافق للقيمة 4 هو 0,88 بين أن $6 =$

(2) ما هو عدد المقابلات التي سجلت فيها 6 أهداف (أي أوجد y)


(3) حدد متوسط والمعدل الحسابي لهذه السلسلة الإحصائية

هندسة

نعتبر متوازي المستطيلات HFGABCDE حيث $AB = 7$ سم و $AD = 4$ سم و $AE = 3$ سم

(1) أحسب حجمه V .

(2) لتكن M نقطة من المستوي (DCH)



(أ) عين نقطة تقاطع

المستقيمين (GM) و (DH).

ب - هل أن المستقيمين (GM) و (DK) في نفس المستوي و لماذا

ج - أذكر مستقيمين ليسا في نفس المستوي معللا جوابك

د - بين أن (AD) و (FG) هما في نفس المستوي

3- أكمل بما يناسب :

..... = (AB) ∩ (DCH) إذا الوضعية النسبية لهما (AB)....(DCH)

..... = (FM) ∩ (DCH) إذا الوضعية النسبية لهما:

..... = (ADC) ∩ (ABF) إذا الوضعية النسبية لهما:

التاريخ:	فرض تألّفي عدد 3-1 في الرياضيات	جبر: حصر و مجالات - معادلات و متراجحات - إحصاء احتمالات
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: رباعيات أضلاع و تعامد في الفضاء

تمرين عدد 1

أكمل الجدول التالي :

المجال أو اتحاد مجالات	المتراجحة الموافقة	التمثيل على مستقيم	القيمة المطلقة
	$-2 < x < 2$		
$]-\infty, 3[\cup]5, +\infty[$	$x < 3$ أو $x > 5$		$ x - 4 \dots 1$

تمرين عدد 2

حلّ في IR المتراجحتين التاليتين : $2(x + 3) > 5x - 3$ و $\frac{2x+5}{2} \leq \frac{-5x-8}{4}$


تمرين عدد 3

نعتبر السلسلة الإحصائية التالية :

4	3	2	1	قيمة الميزة
2	10	4	14	التكرار

- أوجد مدى و منوال هذه السلسلة و أحسب التكرار الجملي.
- أحسب المعدّل الحسابي لهذه السلسلة الإحصائية.
- كون جدول التكرارات التراكمية الصاعدة .
- حدد متوسط هذه السلسلة الإحصائية .

تمرين عدد 4



أنظر الشكل أمامك

ABCDEF موشور قائم قاعدته مثلث .

1 - أحسب AE^2 ؛ BC^2 و CE^2

2 - هل المثلث ACE قائم الزاوية؛ علل جوابك.

(وحدة قياس الطول هي الصنتمتر)

(1 - أ) ارسم مستطيلا DCBA مركزه O بحيث : $BA = 8$ و $CB = 6$
و عين H المسقط العمودي لـ A على (DB)

(ب) أحسب DB ثم HA

(ج) أحسب HO و HB

(2) المستقيم (HA) يقطع (DC) في M و (CB) في N ؛ عين K المسقط العمودي لـ C على (NA)

(أ) أثبت أن H منتصف [KA]

(ب) أحسب KC و بين أن $KO = 5$

(3) المستقيم (HC) يقطع (KO) في G

(أ) ماذا تمثل G بالنسبة للمثلث KCA ؛ (ب) أحسب GO

(4) بين أن : $\frac{CK}{BH} = \frac{MC}{AB}$


التاريخ:	فرض تألّيفي عدد3-2 في الرياضيات	جبر: حصر و مجالات - معادلات و متراجحات - إحصاء احتمالات
9أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: رباعيات أضلاع و تعامد في الفضاء

تمرين عدد 1

1) ضع كل حلّ من المجموعة التالية تحت المعادلة المناسبة: $\{\frac{3}{7}, 1, 0, -\frac{3}{7}\}$

$x + \frac{3}{7} = \frac{3}{7}$	$x - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$	$x \times \frac{3}{7} = 1$	$x + \frac{3}{7} = 0$	المعادلة
				الحلّ

2) أكمل الفراغات بما يناسب من المقترحات التالية :



متقاطعان ، متوازيان ، ليسا في نفس المستوي.

- 1) (CA) و (CD) هما مستقيمان
- 2) (BA) و (CD) هما مستقيمان
- 3) (FA) و (CD) هما مستقيمان
- 4) (FE) و (HD) هما مستقيمان

تمرين عدد 2

ليكن a و b و c أعدادا حقيقية حيث: $-5 \leq a \leq -2$ و $1 \leq b \leq 3$ و $\frac{1}{6} \leq \frac{1}{c^2-3} \leq 1$

- 1) أوجد حصر a: $a+b$ و $a \times b$ و $a^2 - 3$
- 2) بين أن: $2 \leq c \leq 3$

.....
.....
.....

تمرين عدد 3

في كيس به كويرة صفراء و 4 كويرات سوداء و 5 كويرات زرقاء و 10 كويرات بيضاء و طلب مرثك سحب كويرة واحدة من الكيس دون رؤيتها .

- أكتب في صيغة عدد كسري ثم في صيغة نسبة مائوية احتمال استخراج :

- 1) كويرة صفراء. (2) كويرة سوداء.
- 2) كويرة بيضاء. (4) كويرة زرقاء.
- 3) كويرة بيضاء. (5) كويرة بيضاء أو زرقاء.

.....
.....
.....
.....

هندسة

(وحدة قياس الطول هي الصنتمتر)

ABCDEFGH مكعب حيث : $HB = 7\sqrt{3}$ و $BA = a$

(1) - أ) بين أن : $DB = a\sqrt{2}$.

ب) ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (DB) و (HA).

(2) - أ) بين أن المثلث HDB قائم الزاوية في D بطريقتين مختلفتين.


ب) استنتج أن : $HB = a\sqrt{3}$ و $a = 7$

(3) ليكن المستوي (P) الموازي للمستوي (DBA) ،

المستوي (P) يقطع [HA] في A' و [HB] في B' و [HD] في D' بحيث $DH' = 3$ ؛

أ) بين أن : $\frac{A'D'}{AD} = \frac{3}{7}$ ؛ ب) هل المثلث H'B'D' قائم الزاوية علل جوابك.

ج) أحسب حجم الهرم AH'B'D'.



إصلاح نماذج فروض لتلاميذ التاسعة أساسى

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-1 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب
9 أساسى	الإسم و اللقب	هندسة: التعيين في المستوي

تمرين عدد 1

علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

O	I	J	(O, I, J) معين في المستوي أصل تدرجه هو	9	11	7	117 يقبل القسمة على :
x				x			
(IO)	(BI)	(JO)	A و B نقطتان لهما نفس الفاصلة إذا (BA) يوازى	4	3	2	باقي قسمة العدد 214 على 4 هو
		x				x	
E(0·1)	E(1·0)	E(0·1)	B(3·2) و A(-1· -2) إذا إحداثيات E منتصف [BA] هي :	6	5	3	العدد 2a1 يقبل القسمة على 3 إذا كان a يساوي :
	x			x		x	
(1· 2)	(1· -2)	(-1· 2)	مناظرة النقطة A(-1·2) بالنسبة إلى O هي نقطة إحداثياتها	3 و 5	3 و 4	3 و 2	يكون العدد الصحيح الطبيعي قابلا للقسمة على 12 إذا كان قابلا للقسمة على
	x				x		

تمرين عدد 2

(أ - 1) العدد : $2^{149} + 2^{151} = 2^{149} (1+2^2) = 2^{149} \times 5$ ؛ إذا فهو يقبل القسمة على 5

(ب) $2^{149} + 2^{151} = 2^{149} \times 5 = 2^{148} \times 2 \times 5$ ؛ إذا فهو يقبل القسمة على 10

تمرين عدد 3

(11 - أ) العدد $23a4$ يقبل القسمة على 3 يعني $a \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

و $a + 9 = 2 + 3 + a + 4$ يقبل القسمة على 3 إذا $a \in \{0, 3, 6, 9\}$

(ج) العدد $23b5c$ يقبل القسمة على 3 و على 5 يعني $b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

و $c \in \{0, 5\}$ و $10 + b + c$ يقبل القسمة على 3

* $c = 0$ إذا $10 + b + c$ يقبل القسمة على 3 يعني $b = 2$ أو $b = 5$ أو $b = 8$

* $c = 5$ إذا $10 + b + c$ يقبل القسمة على 3 يعني $b = 0$ أو $b = 3$ أو $b = 6$ أو $b = 9$

(2) يكون العدد $\frac{21}{n+5}$ صحيحا طبيعيا إذا كان $n + 5$ من قواسم 21

و بما أن مجموعة قواسم العدد 21 هي : $\{1, 3, 7, 21\}$ إذن :


؛ $n + 5 = 1$ يعني $n = -4$ غير طبيعي ؛ $n + 5 = 3$ يعني $n = -2$ غير طبيعي ؛

؛ $n + 5 = 7$ يعني $n = 2$ ؛ $n + 5 = 21$ يعني $n = 16$ ؛

إذا ليهكون العدد $\frac{21}{n+5}$ صحيحا طبيعيا يجب أن يكون الرقم n ضمن المجموعة

$$n \in \{2, 16\}$$

- يمثل الرسم التالي معينا متعامدا (O , I , J)



1 - O (0,0) و I(1,0) و J(0,1)

2 - انظر الرسم

3 - إحداثيات K منتصف [BA] : $x_K = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3 + (-2)}{2} = \frac{1}{2}$ و $y_K = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$

4 - A'(3 , -1) و B'(-2 , 1) و C'(2 , -2)

5 - E(2 , 1) و F(-2 , -2)

ب) الرباعي FEBC متوازي أضلاع لأن (EC)//(JO) و (FB)//(JO)

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-2 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: التعيين في المستوي

تمرين عدد 1

علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

(IO)	(BI)	(JO)	المستوي (O, I, J) معين في المستوي إذا محور الفاصلات هو	11	10	9	العدد $3^{121} + 3^{119}$ قابل للقسمة على:
x					x	x	
(IO)	(BI)	(JO)	A و B نقطتان لهما نفس الترتيب إذا (BA) يوازي	4	3	2	مجموع 3 أعداد صحيحة طبيعية متتالية هو مضاعف لـ:
x					x		
2	4	0	B(3,2) و A(3,-2) إذا البعد BA يساوي	1	2	3	$\frac{21}{n+5}$ عدد صحيح طبيعي إذا n يساوي :
	x				x		
(1, 2)	(-2, 1)	(-1, 2)	مناظرة النقطة A(2,1) بالنسبة إلى (JO) هي نقطة إحداثياتها	6	5	4	كم مجموعة الأعداد ذات رقمين المكونة من الرقمين 1 و 2
	x					x	

تمرين عدد 2

1) حتى يكون $k = 7b5a$ قابلاً للقسمة على 45 يجب أن يكون قابلاً للقسمة على 5 و مجموع أرقامه من مضاعفات 9 ؛ و ليكون قابلاً للقسمة على 5 يجب أن يكون الرقم a مساو لـ 0 أو 5

$$a = 0 \quad \text{إذا} \quad 12 + b = 18 \quad \text{يعني} \quad b = 6 \quad \text{أو} \quad a = 5 \quad \text{إذا} \quad 12 + b = 11 \quad \text{يعني} \quad b = 1$$

2) ليكون k قابلاً للقسمة على 20 يجب أن يكون قابلاً للقسمة على 5 و $5a$ مضاعفاً لـ 4 :


و ليكون قابلاً للقسمة على 5 يجب أن يكون الرقم a مساو لـ 0 أو 5 و بالتالي : $5a = 50$ أو $5a = 55$

و 50 و 55 كلاهما ليس مضاعفاً لـ 4 إذا لا يوجد رقمين a و b بحيث يكون k قابلاً للقسمة على 20

تمرين عدد 3

العدد	رقم الآحاد	رقم العشرات	رقم المئات	المجموعة
123	3	2	1	A ₁
132	2	3	1	
213	3	1	2	A ₂
231	1	3	2	
312	2	1	3	A ₃
321	1	2	3	

إصلاح تمرين عدد 16



$$ON = |2 - 0| = 2 \text{ يعني } = 2 \text{ و } MO = |-2 - 0| = 2 \text{ يعني } = 2 \quad (1)$$

إذا O هي منتصف [MN]

(2) - انظر الرسم

ب) النقطتان A و D لهما نفس الفاصلة إذا $(DA) \parallel \Delta$ وكذلك النقطتان B و C

لهما نفس الفاصلة إذا $(CB) \parallel \Delta$ وبالتالي $(DA) \parallel (CB)$ و $CB = DA = 4$

(3) - أ) إحداثيات K في المعين (O,I,J) هي (2, 0) و إحداثيات L في المعين (O,I,J) هي (0, -2)

إحداثيات M في المعين (O,I,J) هي (0, -2) و إحداثيات N في المعين (O,I,J) هي (2, 0)

$$LK = |2 + 2| = 4 \text{ و } NM = |-2 - 2| = 4 \quad (ب)$$

ج) LNKM معين لأن قطريه متعامدان في منتصفهما.

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-2 في الرياضيات	جبر: مجموعة الأعداد الحقيقية
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس

تمرين عدد 1

علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

(JI)/(AB)	(JI)/(CA)	(JI)/(CB)	I منتصف [BA] و J منتصف [CA] في المثلث CBA إذا	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1	القيمة المطلقة ل: $(-\frac{1}{5})$ يساوي
					x		
$\frac{AI}{AJ} = \frac{AB}{AC}$	$\frac{AI}{AJ} = \frac{AC}{BC}$	$\frac{AI}{AJ} = \frac{AC}{AB}$	$J \in (AB)$ و $(JI)/(CB)$ إذا $J \in (CA)$	0,04	0,4	4	$\sqrt{0,16}$ يساوي
x					x		
$CB = CA \times AI$	$\frac{AI}{AC} = \frac{AB}{AJ}$	$\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC}$	$\frac{AI}{AJ} = \frac{AB}{AC}$ يعني	125	25	12	في الكتابة... 7,1252525... الدور هو :
		x			x		
$CB = 3 JI$	$CB = 2 JI$	$CB = JI$	I منتصف [BA] و J منتصف [CA] إذا	IR	ID	IN	π هو عدد ينتمي إلى
	x			x			

تمرين عدد 2

$$\sqrt{(5^3 \times 2)^2} = 2 \times 5^3 ; \quad \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5} ; \quad \sqrt{49} = 7 \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{16}{49}} = \frac{4}{7} ; \quad \sqrt{\frac{8}{18}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} ; \quad \sqrt{\frac{2}{50}} = \sqrt{\frac{1}{25}} = \frac{1}{5} ; \quad \sqrt{\frac{12}{147}} = \sqrt{\frac{4}{49}} = \frac{2}{7} \quad (2)$$

(3)

$$A = 3\sqrt{8} + \sqrt{32} - 2\sqrt{50} = 3 \times 2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 2 \times 5\sqrt{2} = 6\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 10\sqrt{2} = 0$$


$$B = \sqrt{25 \times \sqrt{3} \times \sqrt{27}} = \sqrt{25 \times \sqrt{3} \times 3\sqrt{3}} = \sqrt{25 \times 9} = 5 \times 3 = 15$$

$$\sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{6 + \sqrt{7 + \sqrt{4}}}}} = \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{6 + \sqrt{7 + 2}}} \quad (4)$$

$$= \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{6 + \sqrt{9}}}} = \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{6 + 3}}}$$

$$= \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{9}}} = \sqrt{21 + \sqrt{13 + 3}} = \sqrt{21 + \sqrt{16}}$$

$$= \sqrt{21 + 4} = \sqrt{25} = 5$$



ABCD شبه منحرف قاعدته [AB] و [CD]

حيث : $AB = 15$ صم و $CD = 6$ صم و $IJ = 3$ صم.

(1) بما أن $(AB) \parallel (CD)$ و (OA) و (OB) و (OJ) و (OI)

إذا حسب نظرية طالس في المثلث OAB نتحصل على :

و في المثلث OAJ نتحصل على :

إذا : $OI = 3$ و $OJ = 6$ يعني :

(2) ليكن $IO = x$ إذا $OJ = x + 3$ و $OJ = 6$ يعني :

(3) لحساب مساحة المثلث OCD لدينا $CD = 6$ صم و $IO = x$ صم :

نحسب : لدينا $IO = x$ يعني $6 \times (x + 3) = 15$ يعني $x = 3$ يعني $IO = 3$ صم

يعني $IO = 3$ صم

إذا : مساحة المثلث OCD هي $S = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$ صم²

التاريخ:	فرض مراقبة عدد2-2 في الرياضيات	جبر: مجموعة الأعداد الحقيقية
9أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرنة طالس

تمرين عدد1

علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

(JI)//(AB)	(JI)//(CA)	(JI)//(CB)	$J \in [CA]$ و $I \in [BA]$ حيث $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC}$ إذا	$\sqrt{2}$	4	2	العدد الذي مربعه 2 هو
		×		×			
$BA = 2IA$	$BI = IA$	$BA = IA$	$I \in (AB)$ و $(JI)//(CB)$ لمنتصف $[CA]$ إذا	0,04	0,4	4	مربع العدد 0,2 يساوي
×	×			×			
(IO)//(AB)	$IO = IA$	(IO)//(CB)	متوازي أضلاع CBAD مركزه O و I منتصف إذا $[BA]$	42	4	3	3,742 هي كتابة دورية دورها :
		×		×			
$CB = 3 JI$	$CB = 2 JI$	$CB = JI$	I منتصف $[BA]$ و منتصف $[CA]$ إذا	IR	ID	IN	$\sqrt{2}$ هو عدد ينتمي إلى
	×			×			

تمرين عدد 2

(1) $2^2 = 4$ إذا العدد الذي مربعه 4 هو 2 , نسمي العدد 2 الجذر التربيعي لـ : 4

$$\sqrt{36} = \sqrt{4 \times 9} = 2 \times 3 ; \quad \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5} ; \quad \sqrt{25} = 5$$

(2) أ) $x^2 = 16$ يعني $x = 4$ أو $x = -4$ ؛

ب) $x^2 = \frac{16}{25}$ يعني $x = \frac{4}{5}$ أو $x = -\frac{4}{5}$ ؛

ج) $x^2 = 7$ يعني $x = \sqrt{7}$ أو $x = -\sqrt{7}$ ؛


د) $x^2 + 1 = 0$ يعني $x^2 = -1$ غير ممكن لأن مربع عدد حقيقي موجب

(3) أ) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ ؛ $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$ ؛ $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$

ب) $A = 2\sqrt{32} - \sqrt{72} = 2 \times 4\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

$B = \sqrt{50} - 3\sqrt{32} + \sqrt{72} = 5\sqrt{2} - 3 \times 4\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 11\sqrt{2} - 12\sqrt{2} = -\sqrt{2}$

تمرين عدد 1



M منتصف [AB] و N منتصف [CD]

يعني $MB = ND$ إذا $(BN) \parallel (MD)$

و حسب نظرية طالس في المثلث ABF لدينا :


E منتصف [AF] يعني $EF = AE$

وفي المثلث CDE لدينا حسب نظرية طالس :

F منتصف [CE] يعني $EF = CF$ و بالتالي : $FC = EF = AE$

تمرين عدد 2

(2) لدينا :



$$\frac{AM}{2} = \frac{MN}{1} = \frac{NB}{4}$$

نرسم نصف مستقيم $[Ax]$ و نعين عليه 7 أبعاد متقايسة ثم نصل النقطة السابعة بالطرف B

و نعين النقطتين M و N كما هو مبين في الرسم و حسب مبرهنة طالس


التاريخ:	فرض تأليفي عدد 1-1 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب- مجموعة أ. حقيقية
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: التعيين في المستوى- مبرهنة طالس

تمرين عدد 1

(1) x عدد حقيقي موجب


0,16	900	$\frac{1}{100}$	121	36	16	x
0,4	30	$\frac{1}{10}$	11	6	4	\sqrt{x}

(2) علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

7 أجزاء متقايسة	5 أجزاء متقايسة	4 أجزاء متقايسة	لتعيين نقطتين M و N على [AB] حيث $\frac{AM}{2} = \frac{MN}{1} = \frac{NB}{4}$ نقسم [AB] إلى :
×			
4,2	3,6	2,8	في الرسم التالي: (IJ)//(BC) ، إذا x يساوي:
	×		

تمرين عدد 2

- (1)
(2) عدد الإمكانيات المتاحة حسب هذا الجدول هو 7.




تمرين عدد 3

$$3^{2n} - 2^n = 9^n - 2^n = (9-2)(9^{n-1} + 9^{n-2} \cdot 2 + 9^{n-3} \cdot 2^2 + \dots + 2^{n-1}) = 7 \cdot (9^{n-1} + 9^{n-2} \cdot 2 + \dots + 2^{n-1})$$

اذن : $3^{2n} - 2^n$ من مضاعفات 7 مهما يكن n في NI

ABCD مستطيل حيث $BA = 5\text{mc}$ و $DA = 3\text{mc}$.

$$\frac{CD}{CF} = \frac{3}{2} \text{ يعني } 2CD = 3CF \quad \text{و} \quad \frac{AB}{AE} = \frac{3}{2} \text{ يعني } 2AB = 3AE \quad (1)$$



$$(2) \text{ بما أن: } \frac{CD}{CF} = \frac{AB}{AE} = \frac{3}{2} \text{ و } BA = DC$$

فإن: $FC = EA$

$$EA = \frac{2}{3} BA \text{ يعني } 2AB = 3AE \quad (3)$$

$$\text{و } FD = \frac{1}{3} BA \text{ يعني } FC = \frac{2}{3} DC = \frac{2}{3} BA \text{ يعني } 2CD = 3CF$$

$$\text{و بالتالي: } \frac{AE}{DF} = \frac{\frac{2}{3}BA}{\frac{1}{3}BA} = 2$$

$$(4) \text{ حسب نظرية طالس في المثلث EIA نحصل على: } \frac{AE}{DF} = \frac{AI}{AD} = 2 \text{ أو } \frac{ID}{IA} = \frac{DF}{DE} = \frac{1}{2}$$

و بالتالي: $AI = 2 \times AD$


التاريخ:	فرض تألّيفي عدد 1-2 في الرياضيات	جبر: التعداد والحساب- مجموعة. إحصائية
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرنة طالس - العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

11	1	0	a و b متقابلان إذن $a + 11 + b$ يساوي
×			

عشري	صحيح	أصم	$\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}}$ هو عدد
		×	

$\frac{AI}{A'I'} = \frac{BI}{B'I'}$	$\frac{AI}{AB} = \frac{AI}{A'I'}$	$\frac{AI}{AB} = \frac{AI}{\Pi'}$	(BB') // (II') // (AA') ينتج عنه :
×			
$2\sqrt{x}$	$2x$	$x\sqrt{2}$	إذا كان x هو طول ضلع مربع فإن طول قطره يساوي:
		×	

تمرين عدد 2

(1) أ) اختصار العبارة: W

$$W = -\left(\frac{3}{2} - x\right) + \left[\frac{5}{4} + (1 + x)\right] - \left(x - \frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2} + x + \left[\frac{5}{4} + 1 + x\right] - x + \frac{3}{2}$$

$$= -\frac{3}{2} + x + \frac{5}{4} + 1 + x - x + \frac{3}{2} = x + \frac{5}{4} + 1 = x + \frac{5}{4} + \frac{4}{4} = x + \frac{9}{4}$$

ب) الحالة الأولى: $x = -\frac{9}{4}$ فان $W = x + \frac{9}{4} = \left(-\frac{9}{4}\right) + \frac{9}{4} = 0$

الحالة الثانية: $x = \frac{5}{2}$ فان $W = x + \frac{9}{4} = \frac{5}{2} + \frac{9}{4} = \frac{10}{4} + \frac{9}{4} = \frac{19}{4}$

أ) البحث عن x حيث $W = \frac{11}{2}$

$$x = \frac{11}{2} - \frac{9}{4} = \frac{22}{4} - \frac{9}{4} = \frac{13}{4}$$

يعني $W = \frac{11}{2}$ يعني $x + \frac{9}{4} = \frac{11}{2}$ يعني $x = \frac{13}{4}$


تمرين عدد 3

جدّ كتابة مقامها عدد صحيح لكلّ عدد من الأعداد التّالية :

$$m = \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5}$$

$$n = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{2(\sqrt{5} - 1)}{(\sqrt{5} - 1)(1 + \sqrt{5})} = \frac{2(\sqrt{5} - 1)}{5 - 1} = \frac{2(\sqrt{5} - 1)}{4}$$

$$p = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2}{2 - 3} = -(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$



حسب نظرية بيتاغور في المثلث CBA القائم في A نتحصل على : $BC^2 = AB^2 + AC^2$

$$AB^2 = BC^2 - AC^2 = 8^2 - 6^2 = 84 - 36 = 48 \quad \text{إذا :}$$

$$BA = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \quad \text{إذا}$$

$$HA = \frac{BA \times CA}{CB} = \frac{4\sqrt{3} \times 6}{8} = 3\sqrt{3} \quad \text{إذا } CB \times HA = CA \times BA: \text{ وبما أن}$$

حسب نظرية بيتاغور في المثلث HBA القائم في H نتحصل على : $AB^2 = AH^2 + BH^2$

$$BH^2 = AB^2 - AH^2 = (4\sqrt{3})^2 - (3\sqrt{3})^2 = 48 - 27 = 21 \quad \text{إذا :}$$

$$BH = \sqrt{21} \quad \text{إذا}$$

$$HC = CB - BH = 8 - \sqrt{21} \quad \text{و بالتالي :}$$

تمرين عدد 2

$$\frac{1}{HA} = \frac{CB}{CA \times BA} \quad \text{إذا } HA = \frac{BA \times CA}{CB} \quad \text{يعني } CB \times HA = CA \times BA: \text{ بما أن}$$

$$\frac{1}{HA^2} = \frac{CB^2}{CA^2 \times AB^2} = \frac{CA^2 + AB^2}{CA^2 \times AB^2} = \frac{AB^2}{CA^2 \times AB^2} + \frac{CA^2}{CA^2 \times AB^2} = \frac{1}{CA^2} + \frac{1}{AB^2} \quad \text{إذا :}$$

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-3 في الرياضيات	جبر: العمليات على الأعداد الحقيقية
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	CB مثلث حيث BA = 6 و CA = 4 و I ∈ (BA) حيث IA = 2 و (JI) // (CB) إذا $\frac{AJ}{AC}$ يساوي
	x		
5	6	7	CBA مثلث قائم حيث BA = 3 و CA = 4 إذا CB يساوي
x			

- 2	$\sqrt{2}$	0,5	مقلوب 2 هو
		x	
$2 - \sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$	$\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$	مقلوب $\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$
	x		يساوي
2	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	القيمة المطلقة ل:
	x		$(-\sqrt{2})$ تساوي
$\sqrt{2} - \sqrt{3}$	$\sqrt{2} + \sqrt{3}$	$\sqrt{3} - \sqrt{2}$	القيمة المطلقة ل:
		x	$\sqrt{2} - \sqrt{3}$ تساوي

تمرين عدد 2

$$E = \sqrt{\frac{1}{7}} \times \sqrt{63} = \sqrt{\frac{1}{7}} \times \sqrt{9 \times 7} = \sqrt{\frac{9 \times 7}{7}} = \sqrt{9} = 3 \quad (1)$$

$$D = \sqrt{2} \times \sqrt{0,02} = \sqrt{0,04} = 0,02$$

$$* \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3} \quad (2)$$

$$* \frac{5}{1-\sqrt{2}} = \frac{5(1+\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \frac{5(1+\sqrt{2})}{-1} = \frac{-5(1+\sqrt{2})}{1}$$

$$* \frac{-5}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})} = \frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{3-2} = \frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{1}$$

$$* \frac{1}{2\sqrt{2}+\sqrt{7}} = \frac{5(2\sqrt{2}-\sqrt{7})}{(2\sqrt{2}+\sqrt{7})(2\sqrt{2}-\sqrt{7})} = \frac{5(2\sqrt{2}-\sqrt{7})}{8-7} = \frac{5(2\sqrt{2}-\sqrt{7})}{1}$$


$$* \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}(1-\sqrt{2})}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}(1-\sqrt{2})}{5}$$

$$\sqrt{7-3\sqrt{5}} \times \sqrt{7+3\sqrt{5}} = \sqrt{(7+3\sqrt{5})(7-3\sqrt{5})} = \sqrt{7^2 - (3\sqrt{5})^2} \quad (3)$$

$$= \sqrt{49 - 45} = \sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{\frac{3\sqrt{64}+1}{4\sqrt{49}-\sqrt{9}}} = \sqrt{\frac{3 \times 8 + 1}{4 \times 7 - 3}} = \sqrt{\frac{25}{25}} = 1$$

تمرين عدد 1



(1) في المثلث القائم CBA لدينا حسب نظرية بيتاغور:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

يعني: $CB = a\sqrt{2}$


(2) في المثلث القائم CBA لدينا حسب نظرية بيتاغور:

$$AH^2 = AB^2 - HB^2 \text{ يعني } AB^2 = AH^2 + HB^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

$$AH^2 = a^2 - \left(\frac{a^2}{2}\right) = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4} \text{ يعني}$$

$$HA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

تمرين عدد 2



(2) لدينا:

$$\frac{EM}{2} = \frac{MN}{1} = \frac{NF}{4}$$

نرسم نصف مستقيم $[E x]$ و نعين عليه 7 أبعاد متقايسة ثم نصل النقطة السابعة بالطرف F

و نعين النقطتين M و N كما هو مبين في الرسم و حسب مبرهنة طالس

التاريخ:	فرض مراقبة عدد3-2 في الرياضيات	جبر: العمليات على الأعداد الحقيقية
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد1

(1) إذا كان ABC مثلث قائم في A ؛

CB	CA	BA
10	6	8
$2\sqrt{5}$	4	2
10	$5\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$

(2)

EFG قائم	*	K منتصف [FE] و GK = FK = EK
EFG الأضلاع متقايس	*	
K مركز ثقل الثلث GFE	*	

(3) ضع علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$-1 - \sqrt{2}$	$\sqrt{2} - 1$	$1 - \sqrt{2}$	$ 1 - \sqrt{2} $ يساوي
	x		
$-3 + \sqrt{7}$	$3 + \sqrt{7}$	$3 - \sqrt{7}$	$ 3 - \sqrt{7} $ يساوي
		x	

تمرين عدد2

(1)

$$* \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) = 3 - \sqrt{3}$$

$$* \sqrt{5}(1 + \sqrt{2} - \sqrt{5}) = \sqrt{5} \times 1 + \sqrt{5} \times \sqrt{2} - \sqrt{5} \times \sqrt{5} = \sqrt{5} + \sqrt{10} - 5$$

$$* (\sqrt{2} - 3)(\sqrt{2} + 3) = \sqrt{2} \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 3 - 3 \times \sqrt{2} - 3 \times 3 = 2 - 9 = -7$$

$$* (2\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - 3\sqrt{3}) = 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} - 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} + \sqrt{3} \times \sqrt{2} - 3 \times 3$$

$$= 4 - 6\sqrt{6} + \sqrt{6} - 9 = -5 - 5\sqrt{6}$$

(2)

$$* 25c + 10b - 5a = 5(5c + 2b - a)$$


$$* 2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)$$

$$* \sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{25} = \sqrt{5}(1 + \sqrt{2} - \sqrt{5})$$

$$* x + 1 + \sqrt{2}(x + 1) = (x + 1)(1 + \sqrt{2})$$

$$* (2x - \sqrt{5})(1 - x) + \sqrt{5}(x - 1) = (\sqrt{5} - 2x)(x - 1) + \sqrt{5}(x - 1)$$

$$= (x - 1)(\sqrt{5} - 2x + \sqrt{5}) = -2x(x - 1)$$



(2 - أ) بما أن $HD = BA$ فإن $HC = CD - BA$

$$HC = 9 - 4 = 5 \text{ سم}$$

(ب) في المثلث القائم HCB لدينا حسب نظرية

$$\text{بيتاغور: } BC^2 = BH^2 + CH^2$$

$$BC^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$$

$$\text{يعني } BC = \sqrt{169} = 13$$

(3 - أ) في المثلث القائم HCB لدينا حسب نظرية بيتاغور: $BE^2 = AB^2 + AE^2$

$$\text{إذا } BE^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52 = 4 \times 13$$

حسب نظرية بيتاغور في المثلث CDE نتحصل على:

$$\text{إذا } EC^2 = 6^2 + 9^2 = 36 + 81 = 117 = 9 \times 13$$

(ب) بما أن $BC^2 = 169$ و $BE^2 = 52$ و $EC^2 = 117$ فإن:

$$BC^2 = EC^2 + BE^2 \text{ يعني أن المثلث } CEB \text{ قائم في } E$$

(4 - أ) في المثلث القائم CEB لدينا العلاقة القياسية: $CE \times EB = CB \times KE$ إذا $KE = \frac{EC \times BE}{BC}$

$$\text{يعني: } KE = \frac{3\sqrt{13} \times 2\sqrt{13}}{13} = 6$$

و في المثلث القائم KEB لدينا حسب بيتاغور: $BE^2 = EK^2 + BK^2$

$$\text{يعني } BK^2 = BE^2 - EK^2 = 52 - 36 = 16 \text{ يعني } BK^2 = 52 - 6^2$$

$$\text{يعني } KB = 4$$

(ب) لدينا في المثلث DAK : $AE = DE = KE$ إذا E متقايسة البعد عن رؤوس المثلث DAK

(فهي منتصف وتره) يعني أن المثلث DAK قائم في K

(ج) (EB) هو الوسط العمودي لـ $[KA]$ لأن $AE = KE$ و $AB = KB$

(5) أ) الرباعي $LKFE$ مستطيل لأنه رباعي له 3 زوايا قائمة وهي: \widehat{CEB} و \widehat{DKA} و \widehat{EFK}

(ب) لدينا في المثلث القائم LEK : $EL^2 = EK^2 - LK^2$ يعني $EK^2 = EL^2 + LK^2$

$$DK^2 = AD^2 - AK^2 \text{ حيث } EL^2 = 36 - \left(\frac{KD}{2}\right)^2 \text{ يعني } EL^2 = 36 - \left(\frac{KD}{2}\right)^2$$

(ج) في المثلث CEB لدينا $(EB) \parallel (LK)$ إذا حسب نظرية طالس: $\frac{KL}{2\sqrt{13}} = \frac{CK}{CB} = \frac{KL}{EB}$ يعني

$$\text{يعني } LK = \frac{9 \times 2\sqrt{13}}{13} = \frac{9 \times 2}{\sqrt{13}}$$

$$\text{و يعني } EL^2 = EK^2 - KL^2 \text{ يعني } EL^2 = 52 - \left(\frac{9 \times 2}{\sqrt{13}}\right)^2 \text{ يعني } EL^2 = 9 \times 4 \times \frac{13}{13} - \frac{9 \times 9 \times 4}{13}$$

$$LE = \frac{3 \times 4}{\sqrt{13}} = 12 \frac{\sqrt{13}}{13} \text{ يعني } EL^2 = \frac{9 \times 4}{13} (13 - 9) = \frac{9 \times 4 \times 4}{13}$$

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 1-4 في الرياضيات	جبر: العمليات - قوى و مقارنة
وأساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

ضع علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة

إذا كان ABC مثلث قائم في A و H المسقط العمودي لـ A على (CB).

BA×CA = CB×HA	BA×HA = CB×CA	CA×HA = CB×BA
×		
مثلث متقايس الأضلاع	مثلث قائم	C دائرة قطرها [FE] و إذا H ∈ C
		×

2	1	0	a و b متقابلان إذا a + b
		×	يساوي
2	1	0	a و b مقلوبان إذا a × b
	×		يساوي

تمرين عدد 2

(1) n و m عدنان حقيقيان حيث : $n\sqrt{3} = m\sqrt{2}$ إذا $\frac{n}{m} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

(2)

(أ) $\sqrt{3}x = 0$ يعني $x = 0$

(ب) $\sqrt{5}(x-1) = \sqrt{5}$ يعني $x\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$ يعني $x\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$ يعني $x = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2$

(ج) $\sqrt{(-x)^2} = 2$ يعني $(-x)^2 = 4$ يعني $x^2 = 4$ يعني $x = 2$ أو $x = -2$

تمرين عدد 3 (1)

$$A = \frac{a^4 \times b^{-2} \times c^5}{a^6 \times b^{-2} \times c^3} = \frac{c^2}{a^2} = a^{-2} \times c^2$$

$$B = \frac{(a^{-3} \times b^3)^2 \times a^5}{a^{-4} \times b^6} = \frac{a^{-6} \times b^6 \times a^5}{a^{-4} \times b^6} = a^{-2} \times a^5$$


$$x = \frac{(7 \times 8^3)^4 \times 8^{10}}{(7 \times 8^5)^4 \times 8^2} = \frac{7^4 \times 8^{12} \times 8^{10}}{7^4 \times 8^{20} \times 8^2} = \frac{7^4 \times 8^{22}}{7^4 \times 8^{22}} = 1$$

(2)

$$y = \frac{3^4 \times 11^5}{(-66)^4} = \frac{3^4 \times 11^5}{(-3)^4 \times 11^4 \times 2^4} = \frac{11}{2^4} = \frac{11}{16}$$

تمرين عددي 1 (وحدة قياس الطول هي الصنتمتر)

(1) انظر الرسم



(أ) بما أن A و B و C على استقامة واحدة

و A و E و F على استقامة واحدة حيث $(FC) \parallel (EB)$

إذا حسب نظرية طالس نتحصل على :

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AF} = \frac{BE}{EC} = \frac{2}{3}$$


(ب) يعني $\frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AF}$ يعني $CA \times EA = FA \times BA$ يعني $FA = \frac{AC \times AE}{AB} = \frac{5 \times 3}{2} = \frac{15}{2}$

(ج) و $\frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AF}$ يعني $\frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AE+EF}$ يعني $\frac{AC}{AB} = \frac{AE+EF}{AE}$ يعني $\frac{AC}{AB} = 1 + \frac{EF}{AE}$ إذا $\frac{AC}{AB} - 1 = \frac{EF}{AE}$

إذا $\frac{AC}{AB} - \frac{AB}{AB} = \frac{EF}{AE}$ إذا $\frac{BC}{AE} = \frac{BC}{EF} = \frac{2}{3}$ يعني $\frac{BC}{AB} = \frac{EF}{AE}$

و بالتالي : $2 \times FE = 3 \times CB$ يعني $FE = \frac{CB \times 3}{2} = \frac{3 \times 3}{2} = \frac{9}{2}$

تمرين عددي 2



لتكن I المسقط العمودي لـ M على (CB) و J المسقط العمودي لـ M على (DA)

إذا حسب نظرية بيتاغور نتحصل على :

$$MB^2 = MI^2 + IB^2 \text{ و } CM^2 = CI^2 + IM^2$$

$$MA^2 = MJ^2 + JA^2 \text{ و } DM^2 = DJ^2 + JM^2$$

$$\text{إذا : } BM^2 + DM^2 = CM^2 + AM^2$$

التاريخ:	فرض مراقبة عدد4-2 في الرياضيات	جبر: العمليات - قوى و مقارنة
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس و العلاقات القياسية

تمرين عدد1

-1

$$\left(\frac{3}{5}\right)^7 \times \left(\frac{3}{5}\right)^5 = \left(\frac{3}{5}\right)^{12} \quad ; \quad \left[\left(-\frac{11}{5}\right)^{17}\right]^0 = 1$$

$$\frac{3 \times 10^{-2}}{3 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^1 = 10 \quad ; \quad \frac{\left(-\frac{3}{4}\right)^2}{\left(-\frac{3}{4}\right)^5} = \left(-\frac{3}{4}\right)^{-3} \quad ; \quad \left[\left(-\frac{11}{3}\right)^5\right]^4 = \left(-\frac{11}{3}\right)^{20}$$

(2)

متقايس الضلعين	متقايس الأضلاع	قائم	CBA مثلث حيث : $BA = 2\sqrt{5}$ و $CA = \sqrt{7}$ و $CB = \sqrt{13}$ إذا CBA
		×	
متقايس الضلعين	متقايس الأضلاع	قائم	I تنتمي إلى [BA] و $C \notin [BA]$ حيث : $CI = BI = AI$ إذا CBA
		×	

تمرين عدد2

$$\sqrt{3}^2 > 1^2 \quad \text{لأن } \sqrt{3} > 1 \quad (1)$$

$$\sqrt{3}^2 < 4 \quad \text{لأن } \sqrt{3} < 2 \quad (2)$$

$$2 > \sqrt{3} > 1 \quad (3)$$

$$-1 > -\sqrt{3} > -2 \quad (4)$$

$$A = |2 - \sqrt{3}| + |1 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3} + \sqrt{3} - 1 = 1 \quad (أ- 5)$$

$$|2 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3} \quad \text{لأن } 2 - \sqrt{3} \text{ موجب وبالتالي}$$

$$|1 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1 \quad \text{و } 1 - \sqrt{3} \text{ سالب وبالتالي}$$

$$B = 2|\sqrt{3} - 2| + 3(-2 + \sqrt{3}) = 2(2 - \sqrt{3}) + 3(-2 + \sqrt{3})$$

$$= -2 + \sqrt{3}$$

(لأن $(2 - \sqrt{3})$ و $(-2 + \sqrt{3})$ متقابلان فمجموعهما صفر)

(ب) بما أن $A = 1$ و $B = -2 + \sqrt{3}$ إذا $B < A$

هندسة

تمرين عدد 1

ليكون المثلث CBA قائم الزاوية في A يجب أن يحقق مساواة بيتاغور التالية :


$$CB^2 = CA^2 + BA^2 \text{ يعني } x^2 = (x - 2)^2 + 8 \text{ حيث } x > 2$$

$$x^2 - x^2 + 4x - 12 = 0 \text{ يعني } x^2 = x^2 - 2 \times 2 \times x + 4 + 8$$

$$x = 3 \text{ يعني } 4x = 12 \text{ يعني } 4x - 12 = 0$$

تمرين عدد 2

(1)



$$DB^2 = 5^2 = 25 \text{ و } CB^2 = 2^2 = 4 \text{ و } DC^2 = \sqrt{21}^2 = 21 \quad (2)$$

إذا حسب عكس نظرية بيتاغور فإن المثلث DCB قائم في C

(3) حسب العلاقة القياسية في المثلث القائم : $DC \times BC = BD \times CA$

$$CA = \frac{CD \times CB}{DB} = \frac{2\sqrt{21}}{5} \text{ إذا}$$

تمرين عدد 1

علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

2	1	0	يساوي $(\frac{\sqrt{2}}{2})^0$
	×		

8	6	4	يساوي $\sqrt{33 + \sqrt{8 + \sqrt{1}}}$
	×		

A(0,0)	A(1,0)	A(1,1)	إحداثيات النقطة A في المعين (A,B,C) هي :
×			
1	2	$\sqrt{2}$	B(1,0) و A(0,1) إذا البعد BA يساوي
		×	

تمرين عدد 2

(1)

$$\left(\frac{-\sqrt{7}}{2}\right)^2 = \frac{7}{4} \quad ; \quad \sqrt{10^{-6}} = 10^{-3} \quad ; \quad \sqrt{144} = 12 \quad ; \quad \sqrt{81} = 9$$

(2)

$$E = (3\sqrt{2} - 2)^2 = (3\sqrt{2})^2 + 2^2 - 2 \times 2 \times 3\sqrt{2} = 18 + 4 - 12\sqrt{2} = 22 - 12\sqrt{2}$$

$$F = (\sqrt{15} + \sqrt{30})(\sqrt{15} - \sqrt{30}) = (\sqrt{15})^2 - (\sqrt{30})^2 = 15 - 30 = -15$$

$$2\sqrt{3} + 4 = (1 + \sqrt{3})^2 \quad ; \quad a \in \mathbb{N} \text{ حيث } a + 4\sqrt{a} + 4 = (\sqrt{a} + 2)^2 \quad (3)$$

$$(5\sqrt{2})^2 = 50 > (4\sqrt{3})^2 = 48 : \text{ لأن } 5\sqrt{2} > 4\sqrt{3} \quad (4)$$

$$-6\sqrt{3} < -3\sqrt{7} \text{ لأن } (-6\sqrt{3})^2 = 108 > (-3\sqrt{7})^2 = 63 : \text{ مع الملاحظ } (-6\sqrt{3} \text{ و } -3\sqrt{7}) \text{ سالب}$$

$$\frac{1}{3\sqrt{2}} < \frac{1}{2\sqrt{3}} : \text{ إذا } (3\sqrt{2})^2 = 18 > (2\sqrt{3})^2 = 12 : \text{ لأن } 3\sqrt{2} > 2\sqrt{3}$$

$$(لأن كل عدد موجب أكبر من أي عدد سالب) \quad 3\sqrt{5} > -17\sqrt{5}$$

$$\sqrt{6} < \sqrt{7} : \text{ لأن } 5 + \sqrt{6} < 5 + \sqrt{7}$$

التاريخ:	فرض تألّيفي عدد 2-2 في الرياضيات	جبر: قوى - مقارنة - جذاءات معتبرة
أساسي 9	الإسم و اللقب	هندسة: مبرهنة طالس - العلاقات القياسية

تمرين عدد 1

علامة (×) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$\frac{n}{n(n+1)}$	$\frac{2}{n(n+1)}$	$\frac{1}{n(n+1)}$	$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ يساوي
		×	
$\frac{9}{2}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{4}{9}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^{-2}$ يساوي
×			

تمرين عدد 2

$$\frac{25^{n+1}+25^n}{5^{2n+1}-5^{2n}} = \frac{5^{2n+2}+5^{2n}}{5^{2n+1}-5^{2n}} = \frac{5^{2n}(5^2+1)}{5^{2n}(5^1-1)} = \frac{(5^2+1)}{(5^1-1)} = \frac{26}{4} = \frac{13}{2} \quad (1)$$

$$K = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \text{ و } L = \sqrt{2 - \sqrt{2}} \quad (2)$$

$$(K + L)^2 = \left(\sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 + \sqrt{2}}\right)^2 \quad (أ)$$

$$= \left(\sqrt{2 - \sqrt{2}}\right)^2 + \left(\sqrt{2 + \sqrt{2}}\right)^2 + 2\sqrt{2 - \sqrt{2}} \times \sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

$$= 2 - \sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} + 2(\sqrt{4 - 2}) = 4 + 2\sqrt{2}$$

$$K + L = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} \quad \text{إذا}$$

$$\frac{1}{L} + \frac{1}{K} = \frac{K+L}{K \times L} = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \quad (\text{ب})$$

$$M = \frac{a^4 b^{-2} (ab)^0 a}{a^{-3} b^2 a^5 b} = a^{4+1+3+5} b^{-2-2-1} = a^{13} b^{-5} \quad (3)$$

$$(2\sqrt{5})^2 = 20 < (3\sqrt{7})^2 = 63 : \text{ لأن } 2\sqrt{5} < 3\sqrt{7} \quad (أ-4)$$

$$2\sqrt{5} > \sqrt{5} - \sqrt{7} : \text{ موجب إذا } \sqrt{5} - \sqrt{7} \text{ سالب و } 2\sqrt{5} \text{ موجب إذا}$$

$$\left(\frac{5}{\sqrt{8}}\right)^2 = \frac{25}{8} > \left(\frac{\sqrt{8}}{5}\right)^2 = \frac{8}{25} : \text{ لأن } \frac{5}{\sqrt{8}} > \frac{\sqrt{8}}{5} \quad (\text{ج})$$


$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{3}+1} - \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{5}+1} = \frac{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{3}+1)} - \frac{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{5-1-(3-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{2}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{5}+1)} > 0 \quad (\text{د})$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{3}+1} - \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{5}+1} > 0 : \text{ إذا}$$

(1) في المثلث القائم EDA لدينا و حسب نظرية بيتاغور:

$$DE^2 = AD^2 + AE^2 = 16 + 9 = 25$$

يعني $ED = 5$



(3 - أ) بما أن I منتصف [ED] و $(IJ) \parallel (AB)$ إذا حسب نظرية طالس في شبه المنحرف DCBE فإن J منتصف [BC]

$$JI = \frac{2+8}{2} = 5 \text{ (ب)}$$

(ج) بما أن $(IJ) \parallel (AB)$ و $JI = AB = 5$ فإن ABJI متوازي أضلاع (4) $CB = 2JB$ و $IA = JB$ و في المثلث القائم EDA منتصف الوتر I متقايسة البعد عن رؤوسه

الثلاث ، يعني : $IE = ID = IA = \frac{DE}{2} = \frac{5}{2}$ وبالتالي : $CB = 2JB = 2 \times \frac{5}{2} = 5$

إذا DCBE هو شبه منحرف متقايس الضلعين

التاريخ:	فرض مراقبة عدد 5-1 في الرياضيات	جبر: قوى و مقارنة و جذاءات معتبرة
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: علاقات قياسية و رباعيات أضلاع

تمرين عدد 1

$4x^2 - 4x + 1$	$4x^2 + 1$	$4x^2 - 1$	$(2x - 1)^2$ يساوي
×			
$2x(2x - 1)$	$(2x + 1)(2x - 1)$	$4x^2 + 4x$	$(2x + 1)^2 - 1$ يساوي
		×	
$4x^2 - 6x$	$4x^2 - 3$	$2x^2 - 6$	$2x(2x - 3)$ يساوي :
×			

$2x$	$4x$	x^2	مساحة مربع طول ضلعه x تساوي
		×	
60^0	50^0	140^0	ABCD متوازي أضلاع حيث
		×	$\widehat{DAB} = 40^0$ إذا \widehat{ABC} يساوي

تمرين عدد 2

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = a^2 + b^2 + 2ba - a^2 - b^2 + 2ba = 4ba \quad (1)$$

$$\left(\frac{1}{a} + a\right)^2 = \frac{1}{a^2} + a^2 + 2 \times \frac{1}{a} \times a = \frac{1}{a^2} + a^2 + 2 \quad (2)$$

(3) اكتب في صيغة مربع ، كلا من العبارتين التاليتين :

$$A = \frac{1}{a^2} + a^2 - 2 = \left(\frac{1}{a} - a\right)^2$$

$$B = \frac{1}{a^2} + \frac{2}{a} + 1 = \frac{1}{a^2} + 2 \times \frac{1}{a} \times 1 + 1^2 = \left(\frac{1}{a} + 1\right)^2$$

(أ) - انظر الرسم

$$GE^2 = FE^2 + HE^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$$

(ب)

$$GE = \sqrt{100} = 10$$

إذا

$$IG^2 = IF^2 + GF^2 = 6^2 + 6^2 = 36 + 36 = 72$$

(أ) - (2)


$$IG = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

(أ) - (3) بما أن $JG = IE$ و $(JG) \parallel (IE)$ إذا الرباعي $JGIE$ متوازي أضلاع.

(أ) - (4)

$$KF = \frac{FE \times GF}{GE} = \frac{8 \times 6}{10} = 5,6 \text{ إذا } GF \times FE = KF \times GE$$

(أ) - (5)



(ب) K منتصف $[MF]$ و $(GE) \perp (MF)$

إذا (GE) هو المتوسط العمودي لـ $[MF]$ و بالتالي $MG = GF = 6$ و $EG = EF = 8$

جبر: قوى و مقارنة و جذاءات معتبرة	فرض مراقبة عدد5-2 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: علاقات قياسية و رباعيات اضلاع	الإسم و اللقب	9 أساسي

تمرين عدد1

علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

-2	4	2	$(\sqrt{7}-3)(\sqrt{7}+3)$ يساوي
x			
$4 + 2\sqrt{3}$	4	$4 - 2\sqrt{3}$	$(1 + \sqrt{3})^2$ يساوي
x			
$(4 + x)^2$	$(2 + x)^2$	$(2 - x)^2$	$x^2 + 4x + 4$ يساوي :
	x		

$2x$	$4x$	x^2	محيط مربع طول ضلعه x هو
	x		
مربع	شبه منحرف	متوازي اضلاع	ABCD رباعي حيث [AC] و [BD] يتقاطعان في منتصفهما يعني ABCD
		x	

تمرين عدد2

نعتبر العبارة : $E(x) = 4x^2 + 5x + 1$

$$(1) \quad E(a) = 4a^2 + 5a + 1 \quad \text{و} \quad E(b) = 4b^2 + 5b + 1 \quad \text{إذا :}$$


$$\begin{aligned} E(a) - E(b) &= 4a^2 + 5a + 1 - 4b^2 - 5b - 1 = 4(a^2 - b^2) + 5(a - b) \\ &= 4(a - b)(a + b) + 5(a - b) = (a - b)[4(a + b) + 5] \end{aligned}$$

(2) إذا كان $0 \leq a \leq b$ يعني $a - b < 0$ و $E(a) < E(b)$ إذا $E(a) - E(b) < 0$ يعني :

$$(a - b)[4(a + b) + 5] < 0 \quad \text{إذا} \quad 4(a + b) + 5 > 0 \quad \text{يعني} \quad 4a + 4b > -5$$

$$(3) \quad \text{بين أن :} \quad E(x) = \left(2x + \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{16} = 4x^2 + \frac{25}{16} + \frac{4x \times 5}{4} - \frac{9}{16} = 4x^2 + 1 + 5x$$

$$\begin{aligned} (4) \quad E(x) &= \left(2x + \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{9}{16} = \left(2x + \frac{5}{4} + \frac{3}{4}\right) \left(2x + \frac{5}{4} - \frac{3}{4}\right) \\ &= (2x + 2) \left(2x + \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$



(1 و 2) (أنظر الرسم)

(3) في المثلث القائم ADC لدينا و حسب نظرية بيتاغور:

$$DC^2 = AC^2 + DA^2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 12 + 4$$

$$DC = 4 \quad \text{إذا} \quad CD^2 = 16$$

في المثلث القائم ABC لدينا و حسب نظرية بيتاغور:

$$CB^2 = AC^2 + BA^2 = (2\sqrt{3})^2 + 6^2 = 12 + 36 = 48$$

$$CB = 4\sqrt{3} \quad \text{إذا}$$

المثلث BCD متقايس الضلعين لأن: $DC = BD = 4 \text{ cm}$

(4) في المثلث BCE لدينا : $BE^2 = 8^2 = 64$ و $BC^2 = 48$ و $DC^2 = EC^2 = 16$

إذا حسب عكس نظرية بيتاغور فإن المثلث BCE قائم الزاوية في C

(5) - أ) لدينا في المثلث ACE حيث : A و E و D على استقامة واحدة و A و F و C على استقامة واحدة

و (EC) // (FD) (لأنهما يتعامدان على نفس المستقيم (BC))

إذا حسب نظرية طالس في المثلث ACE :

$$\frac{CE}{DF} = \frac{AC}{AF} = \frac{AE}{AD} = 1$$

و نستنتج أن : $FA = AC = 2\sqrt{3}$

ب) بما أن DFE مثلث متقايس الضلعين في F فإن $FE = FD$ إذا : $FE = FD = CE$

و (CE) // (FD) و بالتالي EFDC (متوازي أضلاع له ضلعين متتاليين و متقايسين) فهو معين

ج) الرباعي FHCE هو شبه منحرف قائم الزاوية.

جبر: معادلات - متراجحات و إحصاء	فرض مراقبة عدد 6-1 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: رباعيات أضلاع وتعامد في الفضاء	الإسم و اللقب	9 أساسي

تمرين عدد 1

علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$\frac{3}{2}$	1	$\frac{2}{3}$	حل المعادلة $2n - 3 = 0$ في IR هو
x			
0,001	0,01	0,1	$1,73 < \sqrt{3} < 1,74$ هو حصر ل $\sqrt{3}$ مداه
	x		
$(t+1) = 0$	$(t-1) = 0$ أو $(t+1) = 0$	$(t-1) = 0$	$(t+1)(t-1) = 0$ يعني
	x		

شكل الأوجه الجانبية لهرم رباعي منتظم	مثث	مستطيل	شبه منحرف
	x		
حجم هرم مساحة قاعدته 5cm^2 وارتفاعه 3 cm هو	5cm^3	15cm^3	9cm^3
		x	

تمرين عدد 2

$$53 + = 26 + 2 \text{ يعني } 53 + = 2(13 +) \quad (1)$$

$$= 53 - 26 = 27$$


$$13 + 27 = 40 : \text{ المبلغ الذي أصبح لدى أحمد : } \quad (2)$$

$$53 + 27 = 80 : \text{ المبلغ الذي أصبح لدى أحمد :}$$

تمرين عدد 3

$$\frac{15+9+2 \times 11}{4} = \frac{46}{4} = 11,5 \text{ معدل أحمد : } \quad (1)$$

$$a = 15,5 \text{ يعني : } 2a = 31 \text{ يعني } 8 + 9 + 2 \times a = 48 \text{ إذا } \frac{8+9+2 \times a}{4} = 12 = \frac{48}{4} \quad (2)$$



(1) في المثلث SAB :

المستقيم (JI) يمر من منتصف ضلعيه [SA] و [BS]
إذا $(AB) // (IJ)$

و بما أن $(DC) // (AB)$ (لأن DCBA متوازي الأضلاع)

إذا $(CD) // (JI)$

(2) بما أن $(DC) // (IJ)$ فإن (DC) محتو في المستوي (CIJ)

(3) لدينا (DC) محتو في المستوي (CIJ) و (DC) محتو في المستوي (ABCD) يعني :

(DC) محتو في المستويين (CIJ) و (ABCD) و بما أن A هي نقطة من (ABCD) و لا تنتمي إلى

(CIJ) فإن المستويين (CIJ) و (ABCD) مختلفان و بالتالي فهما متقاطعان في المستقيم (DC)

و نكتب : $(ABCD) = (CIJ) \cap (DC)$.

(4) لدينا I منتصف [SA] و [SA] محتو في (SAD) إذا I تنتمي إلى المستوي (DAS) و بالتالي

(ID) محتو في المستوي (DAS).

و بما أن (DC) محتو في المستوي (CIJ) (حسب السؤال 2) إذا (ID) محتو في المستوي (JIC).

و بالتالي : (ID) محتو في المستوي (SAD) و (ID) محتو في المستوي (JIC).

يعني : (ID) محتو في المستويين المختلفين (SAD) و (JIC).

يعني : $(DAS) \cap (JIC) = (DI)$.

جبر: معادلات - مترجمات و إحصاء	فرض مراقبة عدد 6-2 في الرياضيات	التاريخ:
هندسة: رباعيات اضلاع وتعادم في الفضاء	الإسم و اللقب	أساسي

تمرين عدد 1

علامة (x) تحت الإجابة الصحيحة في الجدول التالي :

$]a,b[$	$]a,b]$	$[a,b[$	$\{ a \in \mathbb{R} \text{ و } b \}$
		x	هي مجموعة تساوي
$n - \sqrt{2} = 0$	$n + \sqrt{2} = 0$	$n - 2 = 0$	$\sqrt{2}$ هو حل للمعادلة
x			
$y \in]1, 3]$	$y \in]1, 3[$	$y \in]1, 3]$	يعني $1 \leq y < 3$
	x		

شبه منحرف	مربع	مثلث	شكل قاعدة هرم رباعي منتظم هو
	x		
27 cm^3	24 cm^3	9 cm^3	حجم مكعب طول حرفه 3cm يساوي
x			

تمرين عدد 2

يمثل الجدول التالي عدد الأهداف التي سجلها فريق كرة القدم خلال 25 مقابلة.

6	5	4	3	2	1	عدد الأهداف المسجلة (قيمة الميزة)
y	2		3	8	5	عدد المقابلات (التكرار)

(1) التواتر التراكمي الموافق للقيمة 4 هو 0,88 يعني $0,88 =$ = يعني


$$22 = \text{يعني} - 6 = 22$$

(2) عدد المقابلات التي سجلت فيها 6 أهداف يعني + : $y = 25 - (2 + 6 + 3 + 8 + 5) = 1$

(3) المتوسط هو : 8 (الموافق للمقابلة عدد 13)

والمعدل الحسابي لهذه السلسلة الإحصائية هو : $2,8 =$

HFGABCDEF متوازي المستطيلات حيث $AB = 7$ صم و $AD = 4$ صم و $AE = 3$ صم



- (1) - أ) حجم هذا الموشور : $V = 7 \times 4 \times 3 = 84 \text{ cm}^3$
- (2) - ب) المستقيمان (GM) و (DK) في نفس المستوي لأنهما متقاطعان في النقطة K
- (ج) (AD) و (HG) ليسا في نفس المستوي لأنهما غير متقاطعين ولا متوازيين.
- (د) (AD) و (FG) هما في نفس المستوي لأنهما متوازيان.
- (3) $\phi = (AB) \cap (DCH)$ إذا الوضعية النسبية لهما : $(DCH) \parallel (AB)$
- متقاطعان : $\{M\} = (FM) \cap (DCH)$ إذا الوضعية النسبية لهما
- متقاطعان : $(BA) = (ADC) \cap (ABF)$ إذا الوضعية النسبية لهما

التاريخ:	فرض تأليفي عدد 3-1 في الرياضيات	جبر: حصر و مجالات - معادلات و متراجحات - إحصاء احتمالات
9 أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: رباعيات أضلاع و تعامد في الفضاء

تمرين عدد 1

أكمل الجدول التالي :

القيمة المطلقة	التمثيل على مستقيم	المتراجحة الموافقة	المجال أو اتحاد مجالات
$ x < 2$		$-2 < x < 2$	$] -2, 2[$
$ x - 4 > 1$		$x < 3$ أو $x > 5$	$] -\infty, 3[\cup] 5, +\infty[$

تمرين عدد 2

(أ) $2(x + 3) > 5x - 3$ يعني $2x + 6 > 5x - 3$ يعني $9 > 3x$ يعني $x > 3$

و بالتالي : $S_{\mathbb{R}} =] -\infty, 3[$

(ب) $\frac{2x+5}{2} \leq \frac{-5x-8}{4}$ يعني $\frac{4x+10}{4} \leq \frac{-5x-8}{4}$ يعني $4x + 10 \leq -5x - 8$

يعني $9x \leq -18$ يعني $x \leq -2$ و بالتالي : $S_{\mathbb{R}} =] -\infty, -2[$

تمرين عدد 3

(1) مدى هذه السلسلة الإحصائية هو : 4 و منوالها هو : 1

و التكرار الجملي هو : $14 + 4 + 10 + 2 = 30$

(2) المعدل الحسابي لهذه السلسلة الإحصائية هو : $2 = \frac{2 \times 4 + 3 \times 10 + 2 \times 4 + 1 \times 14}{30} = \frac{60}{30}$

(3) جدول التكرارات التراكمية الصاعدة .

قيمة الميزة	1	2	3	4
التكرار	14	4	10	2
التكرارات التراكمية الصاعدة	14	18	28	30

(4) متوسط هذه السلسلة الإحصائية هو : 2


تمرين عدد 4

$$AE^2 = AB^2 + AD^2 = 4^2 + 10^2 = 16 + 100 = 116$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$$

$$CE^2 = CF^2 + FE^2 = 10^2 + 52 = 152$$

(2) المثلث ECA قائم في A لأن : $CE^2 = AC^2 + AE^2 = 6^2 + 116 = 152$



(1) - (ب) $DB = 10$: إذا $BD^2 = AB^2 + AD^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$

و بما أن : $DA \times BA = HA \times BD$: إذا $HA = \frac{BA \times DA}{BD} = \frac{8 \times 6}{10} = 4,8$

(ج) و بما أن : $AO^2 = AH^2 + OH^2$

إذا : $HO = \sqrt{2}$: إذا $OH^2 = AO^2 - AH^2 = 5^2 - (4,8)^2 = 25 - 23 = 2$

و $HB = \sqrt{41}$: إذا $BH^2 = AB^2 - AH^2 = 8^2 - (4,8)^2 = 41$

(2) - (أ) في المثلث KCA لدينا : $(KC) // (HO)$ و O منتصف [CA] إذا حسب طالس H منتصف [KA]

(ب) و نستنتج أن : $CK = 2HO = 2\sqrt{2}$

و بما أن : O منتصف الوتر [CA] في المثلث القائم KCA إذا O متقايسة البعد عن رؤوس المثلث

الثلاث و بالتالي : $KO = CO = AO = 5$

(3) - (أ) G هي مركز ثقل المثلث KCA لأنها تقاطع موسطيه [KO] و [HC]

(ب) و بالتالي : $GO = \frac{OK}{3} = \frac{5}{3}$

(4) في المثلث HBN لدينا حسب نظرية طالس : $\frac{NC}{NB} = \frac{CK}{BH}$

و في المثلث NBA لدينا حسب نظرية طالس : $\frac{NC}{NB} = \frac{MC}{AB}$ و بالتالي : $\frac{CK}{BH} = \frac{MC}{AB}$


التاريخ:	فرض تأليفي عدد 3-2 في الرياضيات	جبر: حصر و مجالات - معادلات و مراجعات - إحصاء احتمالات
أساسي	الإسم و اللقب	هندسة: رباعيات أضلاع و تعامد في الفضاء

تمرين عدد 1

$x + \frac{3}{7} = \frac{3}{7}$	$x - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$	$x \times \frac{3}{7} = 1$	$x + \frac{3}{7} = 0$	المعادلة
0	1	$\frac{7}{3}$	$-\frac{3}{7}$	الحل

(1)

(2)



(أ) (CA) و (CD) هما مستقيمان متقاطعان

(ب) (BA) و (CD) هما مستقيمان متوازيان

(ج) (FA) و (CD) هما مستقيمان ليسا في نفس المستوي

(د) (FE) و (HD) هما مستقيمان ليسا في نفس المستوي

تمرين عدد 2

(1) a و b و c أعدادا حقيقية حيث: $-5 \leq a \leq -2$ * و $1 \leq b \leq 3$ إذا: $-4 \leq a + b \leq 1$

* و $2 \leq -a \leq 5$ وبالتالي $2 \leq -a \times b \leq 15$ إذا: $-15 \leq a \times b \leq -2$

* و $1 \leq \frac{1}{c^2 - 3} \leq 1$ إذا: $1 \leq c^2 - 3 \leq 6$

(2) $4 \leq c^2 \leq 9$ إذا: $2 \leq c \leq 3$ (إذا كان c موجب)

تمرين عدد 3

(1) احتمال استخراج كويرة لونها أصفر هو: يعني 5

(2) احتمال استخراج كويرة لونها أبيض هو: يعني 50

(3) احتمال استخراج كويرة لونها أزرق هو: يعني 25

(4) احتمال استخراج كويرة لونها أبيض أو أزرق هو: = + = + يعني 75

$$DB = a\sqrt{2} \text{ إذا } BD^2 = AB^2 + AD^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \quad (1) - (أ)$$

(ب) (DB) و (HA) هما مستقيمان ليسا في نفس المستوي

(2) - (أ) : طريقة 1

HDB قائم الزاوية في D لأن المستقيم (HD) عمودي على المستوي (DBA) في النقطة D

طريقة 2

$$BH^2 = BC^2 + CG^2 + GH^2 = a^2 + a^2 + a^2 = 3a^2$$

و $BD^2 = 2a^2$ و $DH^2 = a^2$ و بالتالي $BH^2 = DH^2 + DB^2$ إذا المثلث HDB قائم الزاوية في D

(ب) بما أن : $BH^2 = 3a^2$ إذا $HB = a\sqrt{3}$ و $HB = 7\sqrt{3}$ يعني $a = 7$

(3) - (أ) في المثلث HDA لدينا $(A'D') // (AD)$ إذا حسب نظرية طالس نحصل على :

$$\frac{HD'}{HD} = \frac{A'D'}{AD} = \frac{3}{7}$$

(ب) $\frac{A'D'}{AD} = \frac{3}{7}$ إذا $A'D' = 3$ و بنفس الطريقة : $A'B' = 3$ و $\frac{B'D'}{BD} = \frac{3}{7}$ يعني $B'D' = 3\sqrt{2}$

يعني المثلث H'B'D' قائم الزاوية في A'

(ج) حجم الهرم AH'B'D' و نرمز له ب: V

$$V = \frac{1}{3} \left(\frac{A'B' \times A'D'}{2} \right) \times 3 = \frac{A'B' \times A'D'}{2} = \frac{3 \times 3}{2} = 4,5 \text{ cm}^3$$

الإختبار : الرياضيات الحصّة: ساعتان الضارب: 2:	الجمهورية التونسية وزارة التربية و التكوين *** امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام * دورة 2009 *
---	--

التمرين الأول: (4 نقاط)

يلي كلّ سؤال من هذا التمرين ثلاث إجابات ؛ إحداهما صحيحة .
أكتب على ورقة تحريرك؛ في كلّ مرّة ؛ رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له .
(1) في معين متعامد (O,I,J) من المستوي ؛ النقطتان A(-2,√2-1) و B(2,1-√2) متناظرتان
بالنسبة إلى:


أ- النقطة O ب- المستقيم (OI) ج- المستقيم (OJ)
(2) إذا كان x عددا حقيقيا بحيث $\frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ فإنّ :

أ- $x = \frac{1}{2}$ ؛ ب- $x = \sqrt{2}$ ؛ ج- $x = 1$
(3) العدد 11133557796 قابل للقسمة على :

أ- 9 ؛ ب- 12 ؛ ج- 15
(4) يمثّل الشكل المقابل مكعبا RQPSDCBA ؛

المستقيم (DB) عمودي على المستوي :

أ- (QCB) ب- (SAB) ج- (QCA)



التمرين الثاني: (4 نقاط)

(1) نعتبر العدد الحقيقي $a = 5\sqrt{2} - 7$

أ- قارن بين العددين 7 و $5\sqrt{2}$

ب- استنتج علامة العدد a

(2) ليكن العدد الحقيقي $b = \sqrt{200} - \sqrt{50} + \sqrt{49}$

أ- بين أن $b = 5\sqrt{2} + 7$

ب- بين أن b هو مقلوب العدد a

ج- بين أن العددين b و $b(a-1) - 1$ متقابلان.

التمرين الثالث: (4 نقاط)

نعتبر العبارة $A = 3x^2 + 2$ حيث x عدد حقيقي.

(1) أحسب القيمة العددية للعبارة A في كل من الحالتين التاليتين : $x = 0$ و $x = -\sqrt{2}$

(2) أ) بين أن : $A - 1202 = 3(x - 20)(x + 20)$

ب) استنتج العدد الصحيح الطبيعي x حيث $A = 1202$

(3) أ) بين أن : $A = (x - 1)^2 + x^2 + (x + 1)^2$

ب) استنتج ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية متتالية مجموع مربعاتها يساوي العدد 1202.

التمرين الرابع: (4 نقاط)

يقدم الجدول التالي إحصاء لعدد الهواتف المحمولة لدى 100 عائلة بأحد الأحياء السكنية :

عدد الهواتف	0	1	2	3	4	5
عدد العائلات	2	8	12	30	33	15

(1) أ- ما هو منوال هذه السلسلة الإحصائية ؟

ب- حدد متوسط هذه السلسلة الإحصائية.

(2) كون جدول التكرارات التراكمية الصاعدة و مثل هذا الجدول بمضلع.

(3) إذا اخترنا ، بصفة عشوائية ، عائلة من بين هذه العائلات .

فما هو احتمال أن يكون لها أكثر من ثلاثة هواتف محمولة؟

التمرين الخامس: (4 نقاط) : (وحدة قياس الطول هي الصنمتر)

لتكن [CB] قطعة مستقيم منتصفها O و قيس طولها 6 ، و C الدائرة التي قطرها [CB] .

(1)- أ) ارسم نقطة A من الدائرة حيث $AB = OB$

ب) بين أن المثلث BAO متقايس الأضلاع.

(2) المماس للدائرة C في النقطة B يقطع (AO) في نقطة E

أ) بين أن المثلث EBA متقايس الضلعين.

ب) استنتج أن A منتصف [EO].

ج) بين أن $BE = 3\sqrt{3}$

(3) لتكن D منازرة A بالنسبة للنقطة O ؛ المتوسط العمودي لـ : [CB] يقطع (DB) في نقطة I

و يقطع (CA) في نقطة J

أ) احسب IO

ب) بين أن الرباعي BICJ معين ثم احسب مساحته.

إصلاح إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي - 2009

التمرين الأول: (4 نقاط)

في معين متعامد (O,I,J) من المستوي ؛ النقطتان A(-2,√2-1) و B(2,1-√2) متناظرتان بالنسبة إلى: أ- النقطة O

إذا كان x عددا حقيقيا بحيث $\frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ فإن: ج- $x = 1$

(3) العدد 11133557796 قابل للقسمة على: ب- 12

(4) يمثل الشكل المقابل مكعبا ABCDSPQR ؛

المستقيم (BD) عمودي على المستوي: ج- (QCA)

التمرين الثاني: (4 نقاط)

(1) نعتبر العدد الحقيقي $a = 5\sqrt{2} - 7$

أ- $7^2 = 49$ و $(5\sqrt{2})^2 = 50$ إذا $5\sqrt{2} > 7$

ب- $5\sqrt{2} > 7$ يعني $5\sqrt{2} - 7 > 0$ يعني العدد a موجب

(2) أ- $b = \sqrt{200} - \sqrt{50} + \sqrt{49} = 10\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 7 = 5\sqrt{2} + 7$

ب $b \times a = (5\sqrt{2} - 7)(5\sqrt{2} + 7) = (5\sqrt{2})^2 - 49 = 1$ إذا b هو مقلوب العدد a

ج- $b(a-1) - 1 + b - 1 = (5\sqrt{2} + 7)(5\sqrt{2} - 7 - 1) + (5\sqrt{2} + 7) - 1$

$$= (5\sqrt{2} + 7)(5\sqrt{2} - 8) + (5\sqrt{2} + 7) - 1$$

$$= 5\sqrt{2} \times 5\sqrt{2} - 40\sqrt{2} + 35\sqrt{2} - 56 + 5\sqrt{2} + 7 - 1 = 50 - 0 - 49 - 1 = 0$$

إذا a و b متقابلان.

التمرين الثالث: (4 نقاط)

(1) إذا $x = 0$ $A = 3x^2 + 2 = 3 \times 0 + 2 = 2$

إذا $x = -\sqrt{2}$ $A = 3(-\sqrt{2})^2 + 2 = 3 \times 2 + 2 = 8$

(2) أ- $A - 1202 = 3x^2 + 2 - 1202 = 3x^2 - 1200 = 3x^2 - 3 \times 400 = 3(x^2 - 400)$

$$= 3(x^2 - 20^2) = 3(x - 20)(x + 20)$$

ب) $A = 1202$ يعني $A - 1202 = 0$ يعني $3(x - 20)(x + 20) = 0$

يعني $(x + 20) = 0$ أو $(x - 20) = 0$ يعني $x = 20$

(نحذف الحل: $x = -20$ لأن x صحيح طبيعي)

(3) أ) $(x - 1)^2 + x^2 + (x + 1)^2 = x^2 + 1 - 2x + x^2 + x^2 + 1 + 2x = 3x^2 + 2 = A$

ب) لدينا $A = (x - 1)^2 + x^2 + (x + 1)^2$ و $A - 1202 = 0$ حيث $x = 20$

يعني $A = 1202 = (x - 1)^2 + x^2 + (x + 1)^2$ حيث $x = 20$

إذا الأعداد هي: $(x + 1)$ و x و $x - 1$ حيث $x = 20$ يعني: 21 و 20 و 19

$$(19)^2 + 20^2 + (21)^2 = 361 + 400 + 441 = 1202$$

التمرين الرابع: (4 نقاط)


- (1) أ- منوال هذه السلسلة الإحصائية هو قيمة الميزة الموافقة لأكبر تكرار وهو إذا : 4
 ب- موصل هذه السلسلة الإحصائية هو 3

(المعدل الحسابي للقيمة الموافقة للرتبة 50 و 51 وهي : $\frac{3+3}{2} = 3$)

(2) جدول التكرارات التراكمية الصاعدة

عدد الهواتف	5	4	3	2	1	0
عدد العائلات	15	33	30	12	8	2
التكرارات التراكمية الصاعدة	100	85	52	22	10	2

التكرارات التراكمية الصاعدة



- (3) إذا اخترنا ، بصفة عشوائية ، عائلة من بين هذه العائلات فإن: احتمال أن يكون لها أكثر من ثلاثة

هواتف محمولة هو : $\frac{15+33}{100} = 0,48$

التمرين الخامس: (5 نقاط) :

(1)- أ) انظر الرسم


ب) المثلث OAB متقايس الأضلاع لأن :

$AB = OB = AO$ (يساوي شعاع الدائرة)

(2)- أ)

بما أن المماس للدائرة يكون عموديا على الشعاع في نقطة التماس فإن المثلث EBO قائم في B

إذا : $\widehat{EBA} = \widehat{OBE} - \widehat{OBA} = 90^0 - 60^0 = 30^0$



و $\widehat{BEA} = \widehat{OBE} - \widehat{BOA} = 90^0 - 60^0 = 30^0$ و بالتالي المثلث ABE متقايس الضلعين في A (لأنه متقايس الزاويتين)

(ب) بما أن المثلث ABE متقايس الضلعين في A فإن : $BA = EA$ ($OA =$) إذا A منتصف [OE].
(ج) حسب نظرية بيتاغور في المثلث EBO لدينا:

$$BE = 3\sqrt{3} \text{ يعني } EB^2 = OE^2 - OB^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27 = 9 \times 3$$

(3 - أ) حسب نظرية طالس في المثلث BDE حيث $(IO) \parallel (BE)$ نتحصل على :

$$IO = \frac{BE}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \text{ إذا } \frac{DO}{DE} = \frac{OI}{BE} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

(ب) الرباعي JCIB قطراه [JI] و [BC] متعامدان في منتصفهما إذا فهو معين

$$S = \frac{6 \times 2\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \text{ cm}^2 \text{ : مساحته هي}$$

إصلاح مناظرة ختم 9 أساسى - رياضيات - 2013

تمرين ع1 عدد

رقم السؤال	1	2	3
الإجابة الصحيحة	(ب) $a=2$ و $b=0$	(أ) 39	(ج) 40%

تمرين ع2 عدد

$$a + b = \frac{\sqrt{5}+1}{2} + \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{\sqrt{5}+1+\sqrt{5}-1}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5} \quad (\text{أ})$$

$$a \times b = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \times \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{\sqrt{5}^2 - 1^2}{4} = \frac{4}{4} = 1 \quad (\text{ب})$$

$a \times b = 1$ يعني a و b مقلوبان

(2 - أ) CBI مثلث قائم الزاوية في B إذن حسب نظرية بيتاغور لدينا:

$$BC = 1 \text{ لأن } ABCD \text{ مربع و } BI = \frac{AB}{2} = \frac{1}{2} \text{ (لأن I منتصف [AB])}$$

$$IC^2 = BI^2 + BC^2 = \frac{1}{4} + 1^2 = \frac{1}{4} + \frac{4}{4} = \frac{5}{4}$$

$$IC = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{و بالتالي :}$$

(ب) بما أن : $IE = IC = \frac{\sqrt{5}}{2}$ فإن :

$$AE = AI + IE = \frac{AB}{2} + IC = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$BE = IE - IB = \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

تمرين ع3 عدد

(1 - أ)

$$A = \frac{1}{3}(3x - 2) + 2x - \frac{7}{3} = x - \frac{2}{3} + 2x - \frac{7}{3} = 3x - \frac{9}{3} = 3x - 3$$

$$3x - 3 \geq 0 \text{ يعني } 3x \geq 3 \text{ يعني } x \geq 1$$

$$S_{\mathbb{R}} = [1, +\infty[\text{ يعني}$$

(2 - أ)

$$B = \sqrt{2}^2 - (1 + \sqrt{2})\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2} - 2 + \sqrt{2} = 0$$

$$B = x^2 - x - \sqrt{2}x + \sqrt{2} = x(x-1) - \sqrt{2}(x-1) \quad (\text{ب})$$

$$= (x-1)(x-\sqrt{2})$$

$$B - A = (x-1)(x-\sqrt{2}) - (3x-3) \quad (\text{أ} - (3))$$

$$= (x-1)(x-\sqrt{2}) - 3(x-1) = (x-1)(x-\sqrt{2}-3)$$

$$(x-1)(x-\sqrt{2}-3) = 0 \quad \text{يعني } B = A = \text{يعني } B - A = 0 \quad (\text{ب})$$

$$(x-1) = 0 \quad \text{أو} \quad (x-\sqrt{2}-3) = 0 \quad \text{يعني}$$

$$x = 1 \quad \text{أو} \quad x = \sqrt{2} + 3 \quad \text{يعني}$$

تمرين 4-د

(1) بما أن : [CB] المتوسط الصادر من B في المثلث ABD لأن C منتصف [AD] و [DO] المتوسط الصادر من D في المثلث ABD لأن O منتصف [AB] و [CB] ∩ [DO] = G إذن G مركز ثقل المثلث ABD

(2 - أ) بما أن G مركز ثقل المثلث ABD فإن (AG) هو المستقيم الحامل للمتوسط الصادر من A إذن E منتصف [BD]

(ب) في المثلث ABD لدينا : C منتصف [AD] و CA = CD = CB (لأن C نقطة من المتوسط العمودي لـ : [AB]) إذن المثلث ABD قائم الزاوية في B و بالتالي (BD) ⊥ (AB).

و بما أن : O منتصف [AB] و (OC) // (BD) إذن حسب نظرية طالس في المثلث ABD : BD = 2 × OC = 2 × 3 = 6

(ج) في المثلث القائم ABE لدينا حسب نظرية بيتاغور:

$$AE^2 = AB^2 + BE^2 = 6^2 + 3^2 = 36 + 9 = 45$$

$$AE = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \quad \text{و بالتالي :}$$

و بما أن G مركز ثقل المثلث ABD فإن :

$$AG = \frac{2}{3} AE = \frac{2}{3} 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

(3 - أ) في المثلث ABD لدينا : O منتصف [AB] و C منتصف [AD] إذن حسب نظرية طالس : (المستقيم الذي يمر من منتصفين ضلعين في

مثث يكون موازيا للضلع الثالث و طول القطعة التي تربط بين المنتصفين هي نصف طول الضلع الثالث) يعني : $(BD) // (OC)$ و $OC = \frac{BD}{2} = ED$

إذن الرباعي OECD متوازي أضلاع


و بما أن الرباعي OECD متوازي أضلاع فإن قطريه $[OD]$ و $[EC]$ يتقاطعان في منتصفهما يعني (OD) يمرّ من منتصف $[EC]$ يعني (OG) يمرّ من منتصف $[EC]$ و B التالي (OG) حامل للموسط الصادر من O في المثلث OEC

ب) و بما أن الرباعي OECD متوازي أضلاع فإن:

$$AC = CD = OE \text{ و } OE = DC \text{ و } (CD) // (OE)$$

فإن الرباعي OECA متوازي أضلاع.

و بما أن الرباعي OECA متوازي أضلاع فإن قطريه $[OC]$ و $[EA]$ يتقاطعان في منتصفهما و بالتالي (EG) هو المستقيم الحامل للموسط الصادر من E في المثلث OEC



ج) و بما أن الرباعي OBEC متوازي أضلاع فإن قطريه $[BC]$ و $[EO]$ يتقاطعان في منتصفهما و بالتالي (CG) هو المستقيم الحامل للموسط الصادر من C في المثلث OEC؛

إذن G هي نقطة تقاطع المستقيمين الحاملين للموسطين الصادرين من E و C في المثلث OEC يعني G هي مركز ثقل المثلث OEC

تمرين 5-د

(1) - أ) بما أن : $(SA) \perp (AB)$ و $(SA) \perp (AD)$ حيث : $(AB) \cap (AD) = \{A\}$ و $(AD) \subset (ABD)$ و $(AB) \subset (ABD)$ إذن : $(SA) \perp (ABD)$

ب) بما أن $(SA) \perp (ABD)$ إذن $(SA) \perp (AC)$ يعني المثلث SAC قائم الزاوية في A والمستوي (ABD) المارة من A و بالتالي $(SA) \perp (AC)$ يعني المثلث


(2 - أ) في المثلث SAC القائم الزاوية في A لدينا حسب نظرية
 بيتاغور: $SC^2 = AS^2 + AC^2 = (2\sqrt{5})^2 + AC^2$ حيث :

$$AC = \sqrt{16} = 4 : \text{ إذن } AC^2 = 2 \times AB^2 = 2 \times (2\sqrt{2})^2 = 2 \times 8 = 16$$

$$SC^2 = (2\sqrt{5})^2 + AC^2 = 20 + 16 = 36 : \text{ وبالتالي :}$$

$$SC = \sqrt{36} = 6 : \text{ إذن}$$

(3) بما أن المثلث SAC القائم الزاوية في A فإن منتصف وتره $[SC]$ هي
 نقطة متقايسة البعد عن رؤوس المثلث الثلاث يعني: $EC = SE = AE = 3$



الاختبار : الرياضيات

الجلسة : ساعتان

الضارب : 2

الجمهورية التونسية

وزارة التربية

امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام
دورة جوان 2014

التعويض الأول (3 نقاط) :

يُطلب كل سؤال ثلاث إجابات، إحداهما فقط صحيحة.

انقل، في كل مرة، على ورقة تعويض رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له.

(1) عدد الأعداد الصحيحة الطبيعية الزوجية ذات ثلاثة أرقام مختلفة من بين 4 و 5 و 6 و 7 هو :

(أ) 6 (ب) 12 (ج) 24

(2) x عدد حقيقي حيث $|x-3| < 4$. مدى حصر العدد x هو :


(أ) 4 (ب) 7 (ج) 8

(3) في الرسم المقابل، لدينا $ABCDEFGH$ مكعب حيث I منتصف $[EG]$

و J منتصف $[AC]$.

المستقيم (FH) عمودي على المستوي :

(أ) (ADH) (ب) (EGC) (ج) (HIJ)



التعويض الثاني (4 نقاط) :

نعتبر العددين الحقيقيين : $a = 4 - 3\sqrt{12} + \sqrt{48}$ و $b = (1 + \sqrt{3})^2$

(1) بين أن $a = 4 - 2\sqrt{3}$ و $b = 4 + 2\sqrt{3}$

(2) قارن بين $2\sqrt{3}$ و 4 ثم استنتج علامة العدد a

(3) (أ) بين أن $a \times b = 4$

(ب) استنتج أن $\sqrt{\frac{a}{b}} = 2 - \sqrt{3}$

(4) ليكن العدد الحقيقي $c = \sqrt{a} - \sqrt{b}$

(أ) بين أن العدد c سالب.

(ب) أحسب c^2 ثم استنتج c .

التعويض الثالث (3.5 نقاط) :

(وحدة قياس الطول هي الصنتمتر)

في الرسم المقابل لدينا :

• ABC مثلث قائم في A و I منتصف $[BC]$


• H المسقط العمودي للنقطة A على (BC)

• $BC = 6$ و $AH = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ و $CH = x$ حيث x عدد حقيقي موجب.

(1) بين أن $AH^2 = x(6-x)$ ثم استنتج أن العدد الحقيقي x يحقق المساواة : $x^2 - 6x + \frac{27}{4} = 0$

(2) بين أن $x^2 - 6x + \frac{27}{4} = \left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{9}{2}\right)$

(3) استنتج CH ثم احسب AB .



التمرين الرابع: (5.5 نقاط) (وحدة قياس الطول هي الصنتمتن)

(1) أُرسم معيّنًا متعامداً في المستوى (O, I, J) حيث $OI = OJ = 1$ و عيّن النقاط $A(4, 0)$ و $B(0, 2)$.

(ب) بيّن أنّ $AB = 2\sqrt{5}$

(2) أُرسم النقطة $M(-2, 0)$ ثمّ إيّن النقطة C مناظرة B بالنسبة إلى M .

(ب) بيّن أنّ إحداثيات النقطة C في المعين (O, I, J) هي $(-4, -2)$.

(3) أُرسم تحقق من أنّ $\frac{AO}{AM} = \frac{2}{3}$

(ب) لتكن G مركز ثقل المثلث ABC .

بيّن أنّ $\frac{AG}{AM} = \frac{2}{3}$ ثمّ استنتج أنّ النقطتين O و G متطابقتان.

(4) المستقيم (CO) يقطع الضلع $[AB]$ في النقطة N .

(أ) بيّن أنّ N منتصف $[AB]$ ثمّ استنتج أنّ $ON = \frac{AB}{2}$.

(ب) استنتج البعد CN .


(5) المستقيم المارّ من O والموازي لـ (AB) يقطع الضلع $[BC]$ في E ويقطع الضلع $[AC]$ في F .

(أ) بيّن أنّ $\frac{CO}{CN} = \frac{OF}{NA}$ و $\frac{CO}{CN} = \frac{OE}{NB}$

(ب) استنتج أنّ O منتصف $[EF]$.

التمرين الخامس: (4 نقاط):

تقدّم من خلال الخطّ التالي توزيعاً لـ 150 عاملاً بإحدى المؤسسات الصناعيّة حسب أعمارهم.



(1) أنقل الجدول التالي ثمّ أكمله بما يناسب:

العمر بالسنة	[24 ; 28[[28 ; 32[[32 ; 36[[36 ; 40[[40 ; 44[
مركز الفئة	26				
التكرار (عدد العمال)			36		
التواتر التراكمي الصاعد بالنسبة المئوية			56 %		

(2) أحسب معدّل أعمار العمال بهذه المؤسسة الصناعيّة.

(3) أُرسم مصلّح التواترات التراكمية الصاعدة بالنسبة المئوية.

(ب) استنتج قيمة تقريبية لموسّط هذه السلسلة.

(4) تُصَرّف إدارة هذه المؤسسة منحةً خصوصيّة للعمال الذين تجاوز سنّهم 36 سنة.

إذا اخترنا بصفة عشوائيّة عاملاً من هذه المؤسسة، فما هو احتمال أنّ تشمله هذه المنحة ؟

اصلاح مناظرة ختم التعليم الأساسي - 2014

التصحيح الأول: (3 نقاط)

3- (EGC) أو (ب)

2- 8 أو (ج)

1- 12 أو (ب)

التصحيح الثاني: (4 نقاط)

$$a = 4 - 3\sqrt{12} + \sqrt{48} = 4 - 3\sqrt{4 \times 3} + \sqrt{16 \times 3} = 4 - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 4 - 2\sqrt{3} \quad 1-$$

$$b = (1 + \sqrt{3})^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{3} = 1 + 3 + 2\sqrt{3} = 4 + 2\sqrt{3}$$

2- لدينا $12 = (2\sqrt{3})^2$ و $16 = 4^2$ إذن $4^2 > (2\sqrt{3})^2$ يعني $4 > 2\sqrt{3}$ لأنهما موجبان
 $4 > 2\sqrt{3}$ إذن $4 - 2\sqrt{3} > 0$ أي $a > 0$ يعني علامة a موجبة

$$a \times b = (4 - 2\sqrt{3})(4 + 2\sqrt{3}) = 4^2 - (2\sqrt{3})^2 = 16 - 12 = 4 \quad 1-3$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{\frac{a \times a}{a \times b}} = \sqrt{\frac{a^2}{a \times b}} = \frac{|a|}{\sqrt{4}} = \frac{a}{2} = \frac{2 \times (2 - \sqrt{3})}{2} = 2 - \sqrt{3} \quad \text{ب) لذا:}$$

$$c = \sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{b} \times \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} - 1 \right) = \sqrt{b} \times \left(\sqrt{\frac{a}{b}} - 1 \right) = \sqrt{b} \times (2 - \sqrt{3} - 1) = \sqrt{b} \times (1 - \sqrt{3}) < 0 \quad 1-4$$

لأن $\sqrt{b} > 0$ و $(1 - \sqrt{3}) < 0$ وبالتالي $c < 0$ يعني علامتها سالبة
 طريقة ثالثة: بما أن $a < b$ فإن $a - b = 4 - 2\sqrt{3} - 4 - 2\sqrt{3} = -4\sqrt{3} < 0$
 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ وبالتالي $c = \sqrt{a} - \sqrt{b} < 0$ يعني علامتها سالبة

ب) لذا:

$$c^2 = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{a} \times \sqrt{b} = a + b - 2\sqrt{a \times b} = 4 - 2\sqrt{3} + 4 + 2\sqrt{3} - 2 \times 2 = 8 - 4 = 4$$

يعني $c^2 = 4$ إذن $|c| = 2$ و c عدد سالب إذن $c = -2$

2-ب) بما أن C مناظرة B بالنسبة إلى النقطة M فإن: $x_M = \frac{x_C + x_B}{2}$ يعني $x_C = 2x_M - x_B$ أي $x_C = 2 \times (-2) - 0 = -4$

كذلك بنفس الطريقة نحصل على: $y_C = 2y_M - y_B$ أي $y_C = 2 \times 0 - 2 = -2$ وبالتالي إحداثيات C هي: $C(-4, -2)$

3-أ) لدينا: $OA = 2$ و $OM = |x_M - x_A| = |-2 - 4| = 6$ إذن: $\frac{AO}{AM} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

ب) G هي مركز ثقل المثلث ABC و M منتصف الضلع $[BC]$ يعني $[AM]$ يمثل المتوسط الصادر من A وبالتالي يحقق: $AM = \frac{2}{3}AG$ يعني: $\frac{AM}{AG} = \frac{2}{3}$ وحيث $\frac{AO}{AG} = \frac{2}{3}$ فإن $\frac{AO}{AM} = \frac{AG}{AM}$ ومنه فإن: $AO = AG$ و $G \in [AM]$ و $O \in [AM]$ إذن O و G متطابقتان

4-أ) في المثلث ABC المستقيم (CO) يصل بين الرأس C و يمر من مركز الثقل O إذن فهو حامل للمتوسط الصادر من C وبالتالي يقطع الضلع المقابل $[AB]$ في منتصفه N .

في المثلث ABO الفقم في O لدينا $[ON]$ هو المتوسط الصادر من رأس O لزاوية القائمة إذن: $ON = \frac{AB}{2}$


ب) لدينا: $ON = \frac{1}{3}CN$ يعني $CN = 3ON = 3 \times \frac{AB}{2} = 3 \times \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$

5-أ) بتطبيق نظرية طالس في المثلث CNB حيث $(OE) \parallel (NB)$ ، نحصل على $\frac{CO}{CN} = \frac{OE}{NB}$

و بتطبيق نظرية طالس في المثلث CNA حيث $(OF) \parallel (NA)$ ، نحصل على $\frac{CO}{CN} = \frac{OF}{NA}$

ب) حسب النتيجة السابقتين نحصل على: $\frac{OE}{NB} = \frac{OF}{NA}$ و بما أن $NA = NB$ فإن $[AB]$ منتصف N

منه فإن: $OE = OF$ و O و E و F على استقامة واحدة إذن: O منتصف $[EF]$



ABC مثلث قائم في A و I منتصف $[BC]$

H المسقط العمودي للنقطة A على (BC)

$BC = 6$ و $AH = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ و $CH = x$ حيث x عدد حقيقي

موجب

1- باستعمل علاقة بيناغور في المثلث ABC القم في A نتحصل على :

$$AH^2 = CH \times HB = x \times (BC - CH) = x(6 - x) \text{ يعني } x(6 - x) = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$6x - x^2 = \frac{27}{4} \text{ وبالتالي المدد الحقيقي } x \text{ يحقق المساواة : } x^2 - 6x + \frac{27}{4} = 0$$

$$2- \text{لنا : } \left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{9}{2}\right) = x^2 - \frac{9}{2}x - \frac{3}{2}x + \frac{27}{4} = x^2 - \frac{12}{2}x + \frac{27}{4} = x^2 - 6x + \frac{27}{4}$$

3- لدينا : $CH = x$ و هي تحقق المساواة $\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{9}{2}\right) = 0$ يعني $x = \frac{3}{2}$ أو $x = \frac{9}{2}$ وبما أن


$$BH = 6 - \frac{3}{2} = \frac{12}{2} - \frac{3}{2} = \frac{9}{2} \text{ ومنه } CH = x = \frac{3}{2} \text{ وبالتالي } x < 3 \text{ يعني } CH = x < CI = \frac{BC}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

بتطبيق نظرية بيناغور في المثلث ABH القم في H نتحصل على :

$$AB = \sqrt{\frac{108}{4}} = \frac{\sqrt{36 \times 3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ وبالتالي } AB^2 = AH^2 + HB^2 = \frac{27}{4} + \frac{81}{4} = \frac{108}{4}$$

1- رسم النقاط $B(0,2)$; $A(4,0)$

2- تحيين النقطة $M(-2,0)$ وبناء



النقطة $C = S_M(B)$

ب) لنا $(OB) \parallel (OJ)$ و $(OA) \parallel (OI)$ وحيث $(OI) \perp (OJ)$ فإن $(OA) \perp (OB)$

و بتطبيق نظرية بيناغور في المثلث OAB القائم في O نتحصل على :

$$AB = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5} \text{ إذن } AB^2 = OB^2 + OA^2 = 4 + 16 = 20$$


1- تعبیر الجداول :

العمر بالسنة	تكرار الفئة	التكرار (عدد العمال)	التكرار التراكمي للصاعد	التواتر التراكمي للصاعد %
[40;44[42	38	150	100%
[36;40[30	36	120	80%
[32;36[34	45	84	56%
[28;32[30	24	39	26%
[24;28[26	15	15	10%

2- معدل اعمار العمال بهذه المؤسسة لصناعية :

$$\bar{X} = \frac{26 \times 15 + 30 \times 24 + 34 \times 45 + 38 \times 36 + 42 \times 30}{150} = \frac{5268}{150} = 35,12$$

3- (ا) مطبق للتواترات التراكمية للصاعدة بالنسبة المئوية :



(ب) القيمة التقريبية لموسط هذه السلسلة هي : $M_e = 35$

4- احتمال أن تشمل العامل الذي وقع اختياره بصفة عشوائية هذه الفئة هو :

$$\frac{36 + 30}{150} = \frac{66}{150} = 0,44 = 44\%$$

الفهرس

رقم الدرس	عنوان الدرس	الصفحة	الفروض	الصفحة
1	علم التعداد والحساب	1	فروض الثلاثي الأول	104
2	مجموعة الأعداد الحقيقية	6		
3	الحساب في IR	9	فروض الثلاثي الثاني	116
4	قوى الأعداد الحقيقية	14		
5	الترتيب و المقارنة	17	فروض الثلاثي الثالث	128
6	الجزاءات المعتبرة	23		
7	المعادلات و المترجمات	30	إصلاح ف - ث - الأول	140
8	الإحصاء و الإحتمالات	37		
9	التعيين في المستوي	45	إصلاح ف - ث - الثاني	153
10	مبرهنة طالس و تطبيقاتها	54		
11	العلاقات القياسية في المثلث القائم	67	إصلاح ف - ث - الثالث	164
12	رباعيات الأضلاع	79		
13	التعامد في الفضاء	90	امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي للسنوات : 2009 و 2013 و 2014	176

